圖書集成醫部全錄

第十七册

頭門

通俗圖書刊行社刊行
會文堂新記書局發行

欽定古今圖書集成醫部全錄第十七册目錄

卷一百二十二彙考一百二十二

頭門一　按傷寒頭痛六經皆有而頭額汗一證亦載汗門故俱不復贅……一

黃帝素問……一

㊀金匱眞言論—一　㊁五臟生成篇—一　㊂脈要精微論—二　㊃平人氣象論—二　㊄臟氣法時論—三　㊅宣明五氣論—三　㊆通評虛實論—三　㊇刺熱篇—四　㊈腹中論—五　㊉風論—五　⑪厥論—六　⑫奇病論—六　⑬脈解論—六　⑭四時刺逆從論—六　⑮標本病傳論—七　⑯氣交變大論—七　⑰五常政大論—七　⑱六元正紀大論—八　⑲至眞要大論—八　⑳著至教論—一〇　㉑示從容論—一〇　㉒方盛衰論—一一

靈樞經……一二

㊀終始篇—一二　㊁經脈篇—一三　㊂海論—一三　㊃五亂篇—一三　㊄大惑論—一三

扁鵲難經……一三

㊀頭痛—一三　㊁厥頭痛—一三　㊂眞頭痛—一三

張機金匱要略……一三

中国科学院　图书室藏　研究所

6513131

㈠頭痛—一〇
朱肱活人書……一〇
㈠頭痛屬外感傷寒者多—一〇
楊士瀛直指方……一〇
㈠頭部外證論—一〇
劉完素六書……一〇
㈠腦風—一〇 ㈡雷頭風—一一 ㈢頭風—一一 ㈣腎虛犯寒頭疼—一一 ㈤頭眩—一一
張從政儒門事親……一一
㈠頭證吐法—一三 ㈡頭痛—一三 ㈢頭眩—一三 ㈣雷頭—一三

卷一百二十三彙考一百二十三

頭門二……一五
李杲十書……一五
㈠辨頭痛證治大法—一五 ㈡大頭痛—一七
朱震亨心法……一八
㈠各種頭痛證治—一八 ㈡頭痛脈法—一九 ㈢頭眩—一九 ㈣頭眩脈法—二一 ㈤大頭病—

㈠頭痛—一三　㈡頭眩—一四　㈢頭搖—一四　㈣額黑—一四

華佗中藏經……一五

㈠頭痛—一五　㈡腦痛—一五　㈢頭眩頭腫—一五　㈣額汗—一五　㈤脈色—一五

王叔和脈經……一六

㈠頭痛—一六　㈡頭眩—一六

脈訣……一六

㈠頭痛—一六

孫思邈千金方……一六

㈠風眩—一六

嚴用和濟生方……一七

㈠眩運之證當分內外所因—一七　㈡頭病評治—一七　㈢頭痛論治—一七

竇漢卿瘡瘍全書……一八

㈠發腦—一八　㈡頭後蜂窠散注—一八　㈢枕疽—一八　㈣腦疽—一八　㈤對口瘡—一八　㈥髮際發—一九　㈦頂門癰—一九　㈧發鬢毒—一九　㈨鬢疽—一九

崔紫虛脈訣……一九

㈠頭痛之脈—一九

許叔微本事方……二〇

李梴醫學入門……四二
㈠頭痛—四二 ㈡頭風證—四二 ㈢頭眩—四二 ㈣頭重—四三 ㈤頭搖—四三 ㈥頭生白屑—四三 ㈦眩運定脈—四三 ㈧腦疽—四三
李中梓醫宗必讀……四三
㈠頭痛—四三 ㈡雷頭風—四五 ㈢大頭風—四五 ㈣頭痛脈法—四五
龔信古今醫鑑……四五
㈠頭痛諸診—四五
薛己醫案……四五
㈠頭痛—四五 ㈡頭眩—四六 ㈢腦疽—四六 ㈣腦疽灸法—四六 ㈤鬢疽—四七
方賢奇效良方……四七
㈠頭眩—四七 ㈡頭痛頭風大頭風—四八
張三錫醫學準繩六要……五〇
㈠頭痛—五〇 ㈡頭搖—五二 ㈢頭眩—五二 ㈣雷頭風—五四
陶華六書……五四
㈠頭痛—五四 ㈡頭眩—五五

卷一百二十四彙考一百二十四

三一

羅謙甫衛生寶鑑……三一
㈠頭痛—三一　㈡頭風—三一　㈢頭腫—三一
危亦林得效方……三二
㈠頭痛—三二　㈡脈法—三二
徐春甫古今醫統……三三
㈠頭痛—三三　㈡頭痛大法分內外之因—三三　㈢分經用藥治頭痛法—三三　㈣眩運宜審三虛—三五　㈤眩運宜審四氣—三五　㈥鎮墜藥治眩運須分標本—三五　㈦頭重—三六　㈧大頭瘟—三六　㈨腦疽—三六　㈩頭面赤腫—三七　㈪癰發有不可治—三八
虞摶醫學正傳……三八
㈠眩運—三八　㈡偏頭痛—三八　㈢温病頭痛死脈候—三八
戴思恭證治要訣……三九
㈠頭痛—三九　㈡眩運—三九
樓英醫學綱目……四〇
㈠頭重痛—四〇　㈡頭搖—四〇　㈢頭眩—四〇　㈣頭痛脈法—四〇　㈤腦額癰疽—四〇
王綸明醫雜著……四一
㈠頭痛—四一

卷一百二十五彙考一百二十五

頭門四……………………………………七九

方一……………………………………七九

(一)古鄉古敗散—七九 (二)二烏丸—七九 (三)鵰頭丸—七九 (四)松花酒—七九 (五)桂枝芍藥知母湯—八〇 (六)甘草乾薑湯—八〇 (七)苓桂朮甘湯—八〇 (八)半夏加茯苓湯—八〇 (九)文蛤散—八〇 (十)茵陳蒿湯—八〇 (十一)硝石礬石散—八〇 (十二)小柴胡湯—八〇 (十三)茯苓桂枝白朮甘草湯—八〇 (十四)小芎辛湯—八一 (十五)川芎散—八一 (十六)玉眞丸—八一 (十七)川芎石膏湯—八一 (十八)喝起散—八一 (十九)川芎茶調散—八一 (二十)一字輕金散—八一 (二一)白附子散—八二 (二二)上淸白附子丸—八二 (二三)定風餅子—八二 (二四)加味調中益氣湯—八二 (二五)安神湯—八二 (二六)羌活附子湯—八二 (二七)淸空膏—八三 (二八)小淸空膏—八三 (二九)不臥散—八三 (三十)如聖餅子—八三 (三一)三生丸—八三 (三二)防風散—八三 (三三)太陽丹—八三 (三四)芎烏散—八四 (三五)又方—八四 (三六)一粒金嗃鼻法—八四 (三七)當歸補血湯—八四 (三八)七生丸—八四 (三九)黃芪益氣湯—八四 (四十)加味四物湯—八四 (四一)六聖散—八五 (四二)四神散—八五 (四三)芎辛導痰湯—八五 (四四)芎藭酒—八五 (四五)人參湯—八五 (四六)防風湯—八五 (四七)又方—八六 (四八)茵芋湯—八六 (四九)鵰頭酒—八六 (五十)大三五七散—八六 (五一)小三五七散—八六 (五二)茯神湯—八六 (五三)防風散—八七 (五四)又方—八七 (五五)又方—八七 (五六)又方—八七 (五七)又方—八七 (五八)摩頭散—八七 (五九)入頂散—八八 (六十)杏仁膏—八八 (六一)大豆酒—八八 (六二)又方

頭門三……………………………………………五七

王肯堂證治準繩……………………………………五七

㈠頭痛總論—五七　㈡雷頭風—六〇　㈢眞頭痛—六一　㈣大頭病—六一　㈤頭風屑—六一　㈥頭重—六二　㈦頭搖—六二　㈧頭痛脈法—六二　㈨眩運—六二　㈩百會疽—六五　⑪頂門癰—六五　⑫額疽—六六　⑬太陽疽—六六　⑭鬢毛瘡廣瘡—六六　⑮赤色疽—六六　⑯癰疽頭痛頭眩用托裏消毒散加減法—六六

陳實功外科正宗……………………………………六七

㈠頭痛—六七　㈡腦疽論—六七　㈢腦疽看法—六八　㈣腦疽治法—六八　㈤鬢疽論—六九　㈥鬢疽看法—六九　㈦鬢疽治法—六九　㈧蟮拱頭—七〇　㈨透腦疽—七〇　㈩玉枕疽—七〇　⑪白禿瘡—七〇

喻昌醫門法律……………………………………七〇

㈠濕熱上干於頭宜審下法—七〇　㈡頭眩—七一　㈢額黑—七一

張介賓景岳全書……………………………………七二

㈠頭痛—七三　㈡頭眩—七三　㈢論治—七五

陳士鐸石室祕籙……………………………………七六

㈠頭痛治法—七六　㈡腦痛治法—七七　㈢頭面腫—七八　㈣癩頭瘡—七八　㈤頭角生瘡—

一〇三　(一五四)葛花解醒湯—一〇三

卷一百二十六彙考一百二十六

頭門五……一〇三
方二……一〇三
(一五五)沉香降氣散—一〇三　(一五六)蘇子降氣湯—一〇三　(一五七)養正丹—一〇三　(一五八)既濟解毒湯—一〇四　(一五九)白芷散—一〇四　(一六〇)川芎散—一〇四　(一六一)瘦人搐鼻藥—一〇四　(一六二)如聖散—一〇四　(一六三)又方—一〇四　(一六四)瓜蔕神妙散—一〇四　(一六五)火筒散—一〇五　(一六六)一滴金丸—一〇五　(一六七)治八般頭風—一〇五　(一六八)斗門方—一〇五　(一六九)又方—一〇五　(一七〇)治頭風餅子—一〇五　(一七一)沖和膏—一〇五　(一七二)祕方茶調散—一〇五　(一七三)茶調散—一〇六　(一七四)川芎散—一〇六　(一七五)菊花散—一〇六　(一七六)大追風散—一〇六　(一七七)止痛太陽丹—一〇六　(一七八)點頭散—一〇六　(一七九)芎犀丸—一〇六　(一八〇)葫蘆巴丸—一〇七　(一八一)細辛散—一〇七　(一八二)仙靈脾浸酒方—一〇七　(一八三)清震湯—一〇七　(一八四)茶調散—一〇七　(一八五)神芎丸—一〇七　(一八六)烏荊丸—一〇八　(一八七)愈風餅子—一〇八　(一八八)涼膈散—一〇八　(一八九)黑錫丹—一〇八　(一九〇)普濟消毒飲子—一〇九　(一九一)黑白散—一〇九　(一九二)青州白丸子—一〇九　(一九三)天麻半夏湯—一〇九　(一九四)人參前胡湯—一〇九　(一九五)補虛飲—一〇九　(一九六)香橘飲—一一〇　(一九七)滋陰健脾湯—一一〇　(一九八)芎朮湯—一一〇　(一九九)川芎丸—一一〇　(二〇〇)防風散—一一〇　(二〇一)清神養榮湯—一一〇　(二〇二)沃雪湯—一一〇　(二〇三)川芎散—一一一　(二〇四)川芎散—一一一　(二〇五)芎藭散—一一一　(二〇六)防風飲子—一一一　(二〇七)羌活湯—一一一　(二〇八)仙朮芎散—一一一

—八八
（六三）薯蕷散—八八
（六四）又方—八八
（六五）菊花散—八九
（六六）又方—八九
（六七）頭風散—八九
（六八）沐頭湯—八九
（六九）又方—八九
（七〇）又方—八九
（七一）犀角湯—八九
（七二）防風散—九〇
（七三）續命湯—九〇
（七四）小續命湯—九〇
（七五）薯蕷湯—九〇
（七六）防風湯—九〇
（七七）薯蕷圓—九一
（七八）天雄散—九一
（七九）菊花酒—九一
（八〇）紫石煮散—九一
（八一）升麻湯—九一
（八二）白花蛇散—九一
（八三）芎黃湯—九二
（八四）香芎丸—九二
（八五）搜風丸—九二
（八六）藏用丸—九二
（八七）獨聖散—九二
（八八）大頭病方—九二
（八九）大頭時氣方—九二
（九〇）頭運方—九二
（九一）加味六君子湯—九三
（九二）補中益氣湯—九三
（九三）荊黃湯—九三
（九四）羌活勝濕湯—九三
（九五）荊防敗毒散—九三
（九六）通聖消毒散—九三
（九七）清涼救苦散—九四
（九八）莘芎散—九四
（九九）溫中化痰丸—九四
（一〇〇）急風散—九四
（一〇一）都梁丸—九四
（一〇二）九龍丸—九四
（一〇三）牙皂散—九五
（一〇四）飛虎散—九五
（一〇五）通天散—九五
（一〇六）靈砂丹—九五
（一〇七）青火金針—九五
（一〇八）赤火金針—九五
（一〇九）升氣和中湯—九五
（一一〇）加味調中益氣湯—九六
（一一一）人參順氣散—九六
（一一二）葱附丸—九六
（一一三）當歸酒—九六
（一一四）珍珠散—九六
（一一五）本事方—九六
（一一六）延胡餅—九六
（一一七）丁香散—九六
（一一八）乳香餅—九七
（一一九）決明散—九七
（一二〇）烏麥餅子—九七
（一二一）天麻羌活丸—九七
（一二二）白朮飲—九七
（一二三）滾痰丸—九七
（一二四）加味二陳湯—九七
（一二五）十全大補湯—九八
（一二六）茯神湯—九八
（一二七）麻黃附子細莘湯—九八
（一二八）吳茱萸湯—九八
（一二九）白虎湯—九八
（一三〇）安神散—九八
（一三一）清上瀉火湯—九九
（一三二）補氣湯—九九
（一三三）川芎散—九九
（一三四）石膏散—九九
（一三五）石膏散—九九
（一三六）荊芥散—九九
（一三七）又方—九九
（一三八）麻黃吳茱萸湯—九九
（一三九）透頂散—一〇〇
（一四〇）大川芎丸—一〇〇
（一四一）神聖散—一〇〇
（一四二）乳香盞落散—一〇〇
（一四三）順氣和中湯—一〇〇
（一四四）玉壺丸—一〇〇
（一四五）水煮金花丸—一〇一
（一四六）調中益氣湯—一〇一
（一四七）半夏白朮天麻湯—一〇一
（一四八）正元散—一〇一
（一四九）來復丹—一〇一
（一五〇）茸硃丹—一〇二
（一五一）鉤藤散—一〇二
（一五二）治中湯—一〇二
（一五三）紅丸子—

(二四八)養血祛風湯—一二三
(二四九)清運化痰湯—一二三
(二五〇)黑將軍散—一二三
(二五一)仙朮通神散—一二三
(二五二)碧雲散—一二四
(二五三)六合湯—一二四
(二五四)天香散—一二四
(二五五)麝香天麻丸—一二四
(二五六)吳茱萸湯—一二四
(二五七)通頂烟—一二四
(二五八)石膏鼠黏子散—一二四
(二五九)麝香茶芽散—一二五
(二六〇)烏爨散—一二五
(二六一)韭根丸—一二五
(二六二)烏香散—一二五
(二六三)玉女煎—一二五
(二六四)雙玉散—一二五
(二六五)吹鼻六神散—一二六
(二六六)六味地黃丸—一二六
(二六七)四物湯—一二六
(二六八)三聖散—一二六
(二六九)人黃散—一二六
(二七〇)三陰煎—一二六
(二七一)左歸飲—一二七
(二七二)五福飲—一二七
(二七三)加減一陰煎—一二七
(二七四)金水六君煎—一二七
(二七五)六安煎—一二七
(二七六)和胃飲—一二八
(二七七)清膈煎—一二八
(二七八)滋陰八味煎—一二八
(二七九)理陰煎—一二八
(二八〇)五君子煎—一二九
(二八一)內疏黃連湯—一二九
(二八二)內托復煎散—一三〇
(二八三)當歸黃芪湯—一三〇
(二八四)升麻牛蒡子散—一三〇
(二八五)二神丸—一三〇
(二八六)隔蒜灸法—一三〇
(二八七)十宣散—一三一
(二八八)槐花酒—一三一
(二八九)清涼飲—一三一
(二九〇)仙方活命飲—一三一
(二九一)人參敗毒散—一三一
(二九二)五香連翹湯—一三二
(二九三)托裏散—一三二
(二九四)加減八味丸—一三二
(二九五)參苓白朮散—一三二
(二九六)托裏消毒散—一三二
(二九七)八珍湯—一三二
(二九八)葛根牛蒡子湯—一三三
(二九九)梔子仁湯—一三三
(三〇〇)五利大黃湯—一三三
(三〇一)國老膏—一三三
(三〇二)黃連清熱消毒散—一三三
(三〇三)羌活當歸湯—一三三
(三〇四)檳榔散—一三四
(三〇五)松脂膏—一三四
(三〇六)貝母膏—一三四
(三〇七)加味平胃散—一三四
(三〇八)螵蛸散—一三四
(三〇九)漏蘆湯—一三四
(三一〇)防風通聖散—一三四
(三一一)萬應鍼頭丸—一三五
(三一二)黃連救苦湯—一三五
(三一三)解毒天漿散—一三五
(三一四)內托千金散—一三五
(三一五)迴毒銀花散—一三五
(三一六)梅花五氣丹—一三六
(三一七)小保安湯—一三六
(三一八)大保安湯—一三六
(三一九)陽春酒—一三六
(三二〇)桑木灸法—一三七
(三二一)神妙拔根方—一三七
(三二二)三品一條鎗—一三七
(三二三)上品—一三七
(三二四)中品—一三七
(三二五)下品—一三七
(三二六)玉紅膏—一三八
(三二七)敗銅散—一三八
(三二八)太乙膏—一三八
(三二九)天麻餅子—一三九
(三三〇)保安萬靈丹—

(十九)蔓荊子散—一二三 (二〇)羌活湯—一二三 (二一)芎朮除眩湯—一二三 (二二)益氣補腎湯—一二三 (二三)補肝養榮湯—一二三 (二四)芎歸湯—一二三 (二五)守中丸—一二三 (二六)旋覆花湯—一二三 (二七)柴胡半夏湯—一二三 (二八)玉液湯—一二三 (二九)漢防己散—一二三 (三〇)羚犀湯—一二三 (三一)人參丸—一二四 (三二)祛痰丸—一二四 (三三)天南星丸—一二四 (三四)青黛散—一二四 (三五)神芎散—一二四 (三六)鬱金散—一二四 (三七)防風通聖散—一二五 (三八)搜風丸—一二五 (三九)白朮附子湯—一二五 (四〇)沉香磁石丸—一二五 (四一)控涎丹—一二五 (四二)選奇湯—一二五 (四三)上清散—一二五 (四四)胃風湯—一二六 (四五)九味羌活湯—一二六 (四六)麻黃湯—一二六 (四七)桂枝湯—一二六 (四八)桂枝麻黃各半湯—一二六 (四九)十味香薷飲—一二六 (五〇)人參半夏丸—一二七 (五一)芎芷香蘇散—一二七 (五二)新法半夏湯—一二七 (五三)川芎散—一二七 (五四)萬全散—一二七 (五五)七神散—一二八 (五六)瀉青丸—一二八 (五七)人參消風散—一二八 (五八)紅豆散—一二八 (五九)四君子湯—一二八 (六〇)六君子湯—一二八 (六一)五苓散—一二八 (六二)逍遙散—一二九 (六三)二陳湯—一二九 (六四)香薷散—一二九 (六五)升麻湯—一二九 (六六)芎星湯—一二九 (六七)導痰丸—一二九 (六八)一字散—一三〇 (六九)芎附飲—一三〇 (七〇)十四友丸—一三〇 (七一)羚羊角散—一三〇 (七二)消風散—一三〇 (七三)澤瀉白朮湯—一三〇 (七四)黃連香薷飲—一三〇 (七五)祖傳經驗方—一三一 (七六)加減芎辛湯—一三一 (七七)菊花茶調散—一三一

卷一百二十七彙考一百二十七

頭門六……………………………………一三三
方三……………………………………一三四

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考一百二十二

頭門一 按傷寒頭痛六經皆有而頭頷汗一證亦載汗門故俱不復贅

黃帝素問

㊀金匱眞言論

春氣者病在頭。

註所謂氣者，言四時五臟之氣而爲病者也。肝兪在頸項，而春氣在頭者，春氣生升，陽氣在上也，故病在氣者病在頭。

㊁五臟生成篇

診病之始，五決爲紀，欲知其始，先建其母。所謂五決者，五脈也，是以頭痛巓疾，下虛上實，過在足少陰巨陽，甚則入腎。

註始者，邪始在三陰三陽之氣分也。五決者，審別五臟陰陽之經氣以決其病也。欲知其病之始在某經，先分立五臟爲根本，審其邪病某經之氣，某臟之經也。少陰巨陽相爲表裏，陽氣生於水臟水腑之中，而上出於巓頂，實者邪實，虛者正虛，是以頭痛巓疾，乃邪氣實於上而使正氣虛於下也。蓋邪之中人始於皮毛氣分，留而不去則

一三九　㉛柴胡清肝湯—一四〇　㉜鼠黏子湯—一四〇　㉝加味逍遙散—一四〇　㉞梔子清肝湯—一四〇　㉟清肝解鬱湯—一四一　㊱茯苓內托散—一四一　㊲升陽益胃散—一四一　㊳定痛消毒飲—一四一　㊴三香內托散—一四一　㊵圍藥—一四二　㊶救苦拔毒膏—一四二　㊷敗毒流氣飲—一四二　㊸內托流氣飲—一四二　㊹清心流氣飲—一四二　㊺敗毒流氣飲—一四二　㊻清肝流氣飲—一四二　㊼麥錢散—一四三　㊽諸瘡一掃光—一四三　㊾潤肌膏—一四三

卷一百二十八彙考一百二十八

頭門七……一四五

單方……一四五

卷一百二十九彙考一百二十九

頭門八……一六〇

鍼灸……一六三

導引……一七二

醫案……一七二

寸口之脈中手短者曰頭痛

註此以寸口而候外因之病也。夫寸爲陽，尺爲陰，寸口之脈中手短者，此惟在寸之陽部，故主頭痛。

㈤藏氣法時論

肝病者，兩脅下痛引少腹，令人善怒虛則目䀮䀮無所見，耳無所聞，善恐，如人將捕之，氣逆則頭痛、耳聾、不聰、頰腫。

註病者邪氣實也。肝脈布脇肋，抵少腹，故兩脅下痛引少腹。靈樞經曰：『肝氣實則怒，』肝藏血而開竅於目，肝虛故䀮䀮無所見。少陽經脈入耳中，故無所聞。膽病者心下澹澹，如人將捕之。厥陰與督脈會於巔，肝氣逆故頭痛，少陽氣逆故耳不聰而頰腫也。

㈥宣明五氣論

五邪所亂，邪入於陽則狂，邪入於陰則痺，搏陽則爲巔疾，搏陰則爲瘖。

註邪入於陽則陽盛，陰不勝其陽，則脈流薄疾，并乃狂。邪入於陰，閉而不行，則留著而爲痺痛之證。邪氣與陽氣搏擊於上，則爲頭痛巔頂之疾，足之少陰上繫於舌，絡於橫骨，終於會厭，邪搏於陰，則厭不能發，發不能下，故不能開闔而爲瘖。

㈦通評虛實論

帝曰：『脈實滿手足寒頭熱何如？』岐伯曰：『春秋則生，冬夏則死。脈浮而濇，濇而身有熱者死。』帝曰：『其形盡滿何如？』岐伯曰：『其形盡滿者，脈急大堅，尺濇而不應也。如是者故從則生，逆則死。』帝曰：『何謂從則生逆則死？』岐伯曰：『所謂從者，手足溫也，所謂逆者，手足寒也。』

註腎主生氣之原，膀胱爲太陽之腑，脈實滿者，少陰之寒氣充於外也。手足寒者，少陰之生氣虛於內也。頭熱者，太陽之氣發越於上也。腎與膀胱陰陽並交，咸主生氣，若盛於外則反虛於內矣。春時陽氣微上，陰氣微下，秋時陰氣微上，陽氣微下，陰陽二氣交相資生，故主生。冬時陰氣盡出於外。夏時陽氣盡虛於內故主死。言陰陽之根

轉入於經，是以過在巨陽少陰之經，而甚則入腎。蓋經絡受邪，則內干臟腑矣。

心煩頭痛，病在膈中，過在手巨陽少陰。

註心部於表君火之氣，外受於邪，則心煩於內矣。太陽之氣受邪，則頭痛於上矣。手太陽之脈，循咽下膈，手少陰之脈出屬心系下膈絡小腸，病在膈中，是過在手太陽少陰之經矣。

青脈之至也長而左右彈，有積氣在心下支胠，名曰肝痹，得之寒濕與疝同法。腰痛，足清，頭痛。

註脈長而彈弦而急也。弦則爲減，諸急爲寒，此得之寒濕，而陽氣受傷，故弦急也。心下爲膈，脇下爲胠，內膈下連於兩胠，邪在心下支胠間，故脈左右彈也。清濕地氣之中人也，必從足始，足厥陰之脈，從足上膕入毛中，過陰器，抵小腹，布脇肋，故病證與疝痛相同，而腰痛足冷也。厥陰與督脈會於巔，故頭痛也。

㊂脈要精微論

頭者精明之腑，頭傾視深，精神將奪矣。得強則生，失強則死。

註諸陽之神氣，上會於頭，諸髓之精，上聚於腦，故頭爲精髓神明之腑，髓海不足，則頭爲之傾，神氣衰微，則視深目陷也。得腑氣之強則生，失強則腑壞而臟將絕矣。

推而外之，內而不外，有心腹積也。推而內之，外而不內，身有熱也。推而上之，上而不下，腰足清也。推而下之，下而不上，頭項痛也。

註推詳其脈之偏於外內上下也。推而外之者，以左右三指向外以按之，脈偏盛向內而不外者，此邪在心腹間而成積也。推而內之者以左右三指向內以候之，脈偏盛於外而不內者，邪在外而身有熱也。推而上之者，以三指平按而審之，上而不下者，其氣上盛下虛，當主腰足清冷也。推而下之，下而不上者，其氣下盛上虛，當主頭項痛也。

干於臟，則不能外出而汗解矣。

肺熱病者，先淅然厥起毫毛，惡風寒，舌上黃，身熱，熱爭則喘咳，痛走胸膺背，不得太息，頭痛不堪，汗出而寒。丙丁甚，庚辛大汗，氣逆則丙丁死。

註 皮毛者，肺之合，臟氣熱於內，故淅然寒慄於外而惡風寒，蓋熱甚則寒也。肺上連於喉嚨，故舌黃。臟眞高於肺，主行榮衞陰陽，故身熱也。內因之熱與外感之熱交爭，干於肺臟，故喘咳不得太息。肺主胸中之氣，氣傷故痛走胸背也。五臟之應天者肺，而手陽明之脈上循於頭，故頭痛不堪。熱爭於內，故汗出而身寒也。肺金病丙丁火剋之，丙丁不死，起於庚辛大汗者，正勝邪而外出也。如氣逆則遇勝剋之日卽死矣。

㈨腹中論

帝曰：『病熱而有所痛者，何也？』岐伯曰：『病熱者，陽脈也，以三陽之動也。人迎一盛少陽，二盛太陽，三盛陽明，入陰也。夫陽入於陰，故病在頭與腹，乃䐜脹而頭痛也。』

註 病熱者，陽脈盛也。陽脈盛者，三陽之氣動之也。三陽俱盛，當主病熱頭痛。腹爲陰，陰中之至陰，脾也。如陽入於陰，又病在頭與腹，故腹䐜脹而頭痛。蓋陽入於陰，是三陽之氣，而非三陽之經脈，若病在經脈，而隨經下入於裏陰者，則痛而不脹。此病在氣分，而陽氣下入於腹中，故脹而不痛也。

㈩風論

風氣循風府而上，則爲腦風，風入係頭，則爲目風，眼寒。

註 風府，穴名，在項後中行，乃督脈陽維之會，上循於腦戶，故風氣客於風府，循脈而上，則爲腦風。足太陽有通頂入於腦者，正屬目本，名曰眼系。風入於頭，干太陽之目系，則爲目風。足太陽寒水主氣，故爲眼寒也。

新沐中風，則爲首風。首風之狀，頭面多汗，惡風，當先風一日則病甚，頭痛不可以出內。至其風日，則病少愈。

註 以水灌首曰沐。新沐則首毛腠開，中風則風入於首之皮膚而爲首風矣。頭乃諸陽之會，因沐中風，則頭首之

氣，不可虛脫者也。

⑻刺熱篇

肝熱病者，小便先黃，腹痛、多臥、身熱，熱爭則狂言及驚，脇滿痛，手足躁，不得安臥，庚辛甚，甲乙大汗，氣逆則庚辛死，其逆則頭痛員員，脈引衝頭也。

註　此言內因之熱，先者，謂先有此內因之熱而先見是證也。肝主疏泄，故小便赤黃。肝脈環陰器，抵少腹而上，故腹痛也。肝藏魂，魂傷故多臥，木火主氣，故身熱也。此言內因之病，始在氣分，先下而上，由內而外，又感外淫之邪，內干五臟，與內因之熱交爭，則魂傷而狂言，肝藏魂也。東方肝木，其病發驚駭。肝脈布脅肋，故脅滿痛。風木之熱甚，故淫於四末也。人臥則血歸於肝，肝氣傷而不能納血，故不得臥也。庚辛金剋肝木，故甚。庚辛不死，起於甲乙大汗者，正勝邪而外出也。氣逆者，熱淫而反內逆也。員員，周轉也。肝臟之熱發於外而與形熱相應，熱甚而上逆於頭，故頭痛而員轉也，蓋三陽之脈，上循於頭，肝熱與少陽交爭，因脈引而上衝於頭也。

心熱病者，先不樂數日乃熱，熱爭則卒心痛、煩悶、善嘔、頭痛、面赤無汗，壬癸甚，丙丁大汗，氣逆則壬癸死。

註　心志喜，恐勝之，先不樂者，為恐所傷也。此言內因之熱，又感外因之邪，外內交爭，熱干神臟，故卒然煩痛也。少陰病者，欲吐不吐，故善嘔。心為陽中之太陽，故頭痛。心之華在面，故面赤。心主血，故無汗也。壬癸水剋心火，故甚。壬癸不死，起於丙丁大汗者，正勝邪而外出也，逆則死矣。

脾熱病者先頭重、頰痛、煩心、顏青、欲嘔、身熱，熱爭則腰痛不可用俛仰，腹滿泄，兩頷痛，甲乙甚，戊己大汗，氣逆則甲乙死。

註　陰氣從足上行至頭，故先頭重。陽明之脈循頰，故頰痛也。脾脈絡於心，故心煩而顏青。熱邪干胃，故欲嘔，脾主肌肉，故身熱也。陽病者，腰反折不能俯，陰病者不能仰。陰陽內外交爭，故腰痛不可用俛仰也。腹者，脾土之郛郭，故腹滿泄，胃之悍氣上衝頭者，循牙車，下人迎，故頷下痛也。脾病者，加於甲乙，甲乙不死，起於戊己，如反逆而內

㈣四時刺逆從論

太陽濇則病積善時巔疾

註 濇者多血少氣，微有寒，血病之謂。積血多而凝泣，故成積也。

㈤標本病傳論

肝病，頭目眩，脇支滿，三日體重身痛，五日而脹，三日腰脊少腹痛脛痠，三日不已死。冬日入，夏早食。

註 病先發於肝，則頭目眩脅支滿，三日而之脾，則體重身痛，五日而之胃，則脹，三日而之腎，則腰脊少腹痛，三日不已死。夏早食乃寅卯時木氣絕而不生也。冬日入乃申酉時金氣旺而木氣絕也。

㈥氣交變大論

歲木太過，風氣流行，脾土受邪，民病飧泄食減，體重煩寃，腸鳴腹支滿，上應歲星，甚則忽忽善怒，眩冒巔疾。

註 歲木太過，則制勝其土氣，故民應之而爲脾病也。飧泄食減腸鳴腹滿，皆脾土之病，脾主肌肉四支，故體重煩寃者，土傷而不能制水，水氣上乘於心也。歲星木星也。木運太過諸壬歲也。淫勝太甚，則反自傷善怒，肝志之病也。厥陰與督脈會於巔，故眩冒巔疾。

歲金不及，炎火迺行，復則陰厥且格，陽反上行，頭腦戶痛，延及腦頂發熱，民病口瘡，甚則心痛。

註 六乙之歲，金運不及，則所勝之火氣乃行。金弱火亢，水乃復之，秋冬之時，陽氣應收藏於陰臟，因寒氣厥逆，且格陽於外，致陽反上行，而頭腦戶痛，延及腦頂發熱，水寒之氣，上乘迫其心火外炎，故民病口瘡，甚則心痛。

㈦五常政大論

木太過曰發生，發生之紀，是謂啓敕。土疎泄，蒼氣達，陽和布化，陰氣迺隨，生氣淳化，萬物以榮，其化生，其氣美，其政散，其令條舒，其動掉眩巔疾，其經足厥陰少陽，其臟肝脾，其病怒，太角與上商同，上徵則其氣逆，其病吐利。

註 敕，布也。啓布陽和，發生萬物之象也。土得其制化，故主疎泄。蒼氣，木氣也。厥陰之上，風木治之，是以陽和布化於上，而陰氣乃隨於下也。掉眩巔疾，風氣淫於上也。怒，肝氣盛也。如壬子壬午壬寅壬申四歲木運有餘，而上臨

皮腠疎而陽氣弛，故多汗惡風也。風者天之陽氣，人之陽氣，以應天之風氣，諸陽之氣上出於頭，故先一日則病甚頭痛不可以出戶內蓋風將發而氣先病也至其風發之日氣隨風散故其病少愈。

㈡厥論

巨陽之厥則腫首頭重，足不能行，發爲眴仆。

註巨陽太陽也。足太陽脈，起於目內眥上額交巔，從巔入絡腦，還出別下項，循背俠脊，抵腰中下貫臀，入膕中循腦內出外踝之後，是以厥逆於上，則爲首腫頭痛，厥逆於下則爲足不能行，神氣昏亂，則爲眴仆，太陽爲諸陽主氣，此病在經而轉及於氣分故曰發。

㈢奇病論

帝曰：『人有病頭痛，以數歲不已，此安得之名爲何病？』岐伯曰：『當有所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦爲主，腦逆故令頭痛，齒亦痛，病名曰厥逆。』

此論腦骨髓之爲病也。夫在地爲水，在天爲寒，寒生水，水生鹹，鹹生腎，腎生骨髓，故所犯大寒之氣而內至骨髓也。諸髓皆屬於腦，故以腦爲主。髓邪上逆，則入於腦，是以頭痛數歲不已。齒乃骨之餘，故齒亦痛也。此下受之寒，上逆於巔頂故名曰厥逆。

㈢脈解論

陽明所謂客孫脈，則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者，則其孫絡太陰也，故頭痛鼻鼽腹腫也。

註此明陰陽之氣上下升降內外出入，行於脈外之氣分也。氣分者皮膚肌腠之間。上謂皮膚之上也。夫諸脈之浮而常見者皆絡脈也。足太陰之脈亦見於皮膚之上而無所隱，是以陽明之氣并於上，則迫於陽明之孫絡，與太陰之經脈也。迫於陽明之孫絡，則頭痛鼻鼽，迫於太陰之經脈，則腹腫也。

㈣四時刺逆從論

註少陽司天寅申歲也少陽之火在天爲暑故民病頭痛寒熱而瘧也

太陽司天，寒淫所勝血變於中發爲癰瘍，民病厥心痛、嘔血血泄、鼽衄善悲，時眩仆。

註太陽司天辰戌歲也。心痛眩仆乃寒凌心火，逼其火熱上炎，水火寒熱交爭也。

帝曰：『六氣相勝奈何？』岐伯曰『厥陰之勝耳鳴頭眩，憒憒欲吐，胃鬲如寒，大風數舉。』

註三陰三陽主歲之氣，淫勝而爲民病者宜以所勝之氣味平之。耳鳴頭眩木淫於上也。憒憒欲吐，胃氣如寒，胃土病也。大風數舉淫於下而上也。

太陰之勝，火氣內鬱，瘡瘍於中，流散於外，病在胠脅，甚則心痛熱 ，頭痛喉痺，項強，獨勝則濕氣內鬱，寒迫下焦，痛留頂互引眉間胃滿，足下溫，頭重，足脛胕腫，飲發於中，胕腫於上，太陰之復濕變乃舉，體重中滿，飲食不化，陰氣上厥，胷中不便，飲發於中，欬喘有聲，頭項痛重，而掉瘈尤甚。

註陰濕之氣淫於外，則火氣內鬱而瘡瘍於中，濕熱之氣流散於外，則及於風木，而病在胠脅。甚則心痛者，木甚而傳於火也。熱格頭痛，喉痺項強者，風火之氣與濕氣相雜，從頸項而上於巔頂也。獨盛者，陰濕之氣復盛於歲半以後也。濕氣在中，故內鬱而迫於下焦，痛留頂而互引眉間者，風火之氣留於巔頂，傳於陽明之經，而下及於胃滿也。足下溫頭重者，風火之氣流於下也。飲發於中，胕腫於上者，水從下而中，中而上也。復謂三陰三陽之氣，受所勝之氣，勝制鬱極而復發也。頭項痛重而掉瘈尤甚，所謂因於濕首如裹，濕熱不攘，大筋緛短，小筋弛長，緛短爲拘，弛長爲痿也。

太陽之勝，凝凓且至，熱反上行，頭項囟頂，腦戶中痛。太陽之復，厥氣上行，心胃生寒，胷膈不利，心痛痞滿，頭痛善悲，時眩仆。

註太陽寒水氣勝，故凝凓且至，熱反上行者，太陽之氣，隨經上入腦，還出別下項也。厥氣上行者，鬱逆之氣上行，而欲復歲半以前之氣也。心胃生寒，胷膈不利，心痛痞滿，頭痛善悲時眩仆者，厥氣上行，從下而中，中而上也。

火氣，子居母上，則其氣逆，逆於上則吐，逆於下則利也。

⑱六元正紀大論

帝曰：『五運之化，太陽之政何如？』岐伯曰：『辰戌之紀也，初之氣，地氣遷，氣乃大溫，草乃早榮，民乃厲，溫病乃作，身熱、頭痛、嘔吐、肌腠瘡瘍。

註　五運謂五行之化運，辰戌歲主太陽司天加臨之間氣，初氣始於少陽，地氣遷者，謂上年在泉之終氣，而交於今歲司天之初氣也。歲前之終氣，乃少陰君火，今歲之初氣，乃少陽相火，二火相交，故氣大溫，草乃早榮者，長氣盛也。春始交而大溫，故民病厲溫病乃作，爲身熱頭痛嘔吐瘡瘍。

少陽之政，寅申之紀也。初之氣，地氣遷，風勝乃搖，寒乃去，候乃太溫，草木早榮，寒來不殺，溫病乃起。其病氣怫於上，血溢目赤，欬逆頭痛，血崩脇滿，膚腠中瘡。

註　初之間氣，乃少陰君火，主氣乃厥陰風木，故風搖候溫，草木得生長之氣而早榮也。少陽司天，而又値君火主氣，故雖有時氣之寒來，而不能殺二火之溫熱也。血溢、目赤、欬逆、頭痛、膚瘡等證，皆風火之爲病也。

⑲至眞要大論

歲太陰在泉，草乃早榮，濕淫所勝，則埃昏巖谷，黃反見黑，至陰之交，民病衝頭痛。

註　太陰在泉，辰戌歲也。土爲草木之所資生，故草乃早榮。黃乃土色，黑乃水色，土勝濕淫，故黃反見黑。至陰之交，乃三氣四氣之交，土司令也。民病衝頭痛，乃膀胱經病。蓋膀胱乃水津之腑，土氣淫勝而水臟水腑皆爲病也。

太陰司天，濕淫所勝，胕腫骨痛陰痹。陰痹者，按之不得，腰脊頭項痛，時眩，大便難。

註　太陰司天，丑未歲也。胕腫陰痹，感寒濕之氣。病在陰者，名曰痹，故按之不得也。腎主骨而膀胱爲之腑，故腰脊頭項骨痛。腎開竅於二陰，故大便難也。

註厥陰根起於大敦，經氣與督脈上會於巔頂而主筋，頭痛筋攣，厥陰經氣之爲病也。少陰根起於湧泉，爲生氣之原而主骨，骨重少氣，少陰經氣之爲病也。太陰根起於隱白，與胃以膜相連，噦噫腹滿，時驚不嗜臥，太陰經氣之爲病也。其脈浮者，開脈也。弦者，樞脈也。石堅者，闔脈也。雷公不解其因，復問以三臟之脈證，以知其比類於杳冥焉。從容者，氣之謂也，言經脈當求之於氣也。三陰者，長女中女少女也。太陰爲長女，故當求之於腑，腑陽而主開也。少陰爲少女，故當求之於經，經氣內連臟腑，外絡形身，主外內出入之樞也。厥陰處於兩陰中之交盡，故爲中女，是以求之於臟，臟陰而主闔也。此因三陰之氣，而見於證之頭痛筋攣，脈之浮弦而石，故當求之於三陰氣之開闔樞，若止論其脈證，非從容之謂也。八風菀熱，人之陽氣行於上下四旁也。五臟消鑠，傳邪相受，謂五行之氣，運於天地之中，有相生而有勝剋也。夫浮而弦者，此腎氣之出於肝脾而腎不足也。沉而石者，是肝脾之氣下歸於腎，主腎氣內著也。夫在泉之水，隨氣而運行於天表，是以怯然少氣者，乃水道不行，故使形氣之消索也。欬嗽煩寃者，是腎氣之上逆於心肺也。此五臟之三陰，總歸於一氣，一氣而復貫通於五臟者也。知天道之氣交陰陽之離合，而後能從容中道。若言肝脾腎三臟俱行，不在陰陽離合之法也。

㈢方盛衰論

氣上不下，頭痛巔疾。

註氣者，一陽之氣也。氣上不下，頭痛巔疾，陽氣自下而直上於巔頂也。

靈樞經

㈠終始篇

病生於頭者頭重。

註天地四方之氣，各有所生之本位，故生於頭者頭重也。

陽明之復，淸氣大舉，病生胠脇，氣歸於左，善太息，甚則心痛痞滿，腹脹而泄、嘔苦、欬噦、煩心、病在鬲中，頭痛。

註　陽明之復發於本位主令之時，是以病生胠脇，氣歸於左者金乘木也。心痛痞滿腹脹而泄，乘火土也。膽病者善太息。嘔苦木受金刑，腑亦病也。欬噦，肺氣逆也。欬噦煩心，病在鬲中者，陽明之氣上逆也。頭痛，厥陰病也。

厥陰司天，客勝則耳鳴掉眩。

註　風木之客氣勝於上，是以耳鳴掉眩。

少陰司天，客勝則鼽嚏，頸項強，肩背瞀熱，頭痛。

註　少陰司天，初之氣乃太陽寒水，二之氣乃厥陰風木，三之氣乃少陰君火。鼽嚏，耳聾目瞑，厥陰之氣勝也。頸項強，肩背瞀熱，頭痛，太陽之氣勝也。

少陽司天，客勝則丹胗外發，及爲丹熛，瘡瘍、嘔逆、喉痹、頭痛。

註　少陽司天，初氣三氣乃君相二火，二之氣乃太陰濕土，丹胗卽斑疹，因火熱而發於外者也。丹熛卽赤遊發於外而欲遊於內者也。瘡瘍嗌腫頭痛諸證，亦皆感濕熱而生，蓋亦自上而下，從外而內也。

㊁著至教論

三陽獨至者，是三陽幷至，幷至如風雨，上爲巓疾，下爲漏泄。

註　獨至者，三陽合幷而爲一陽也。三陽幷至，則陽氣上行而爲巓疾，下行而爲漏泄。

㊂示從容論

雷公曰：『於此有人頭痛，筋攣骨重，怯然少氣，噦噫，腹滿，時驚，不嗜臥，此何臟之發也？脈浮而弦，切之石堅，不知其解，復問所以三臟者，以知其比類也。』帝曰：『夫從容之謂也。夫年長則求之於腑，年少則求之於經，年壯則求之於臟。今子所言皆失，八風菀熱，五臟消爍，傳邪相受。夫浮而弦者，是腎不足也。沉而石者，是腎氣內著也。怯然少氣者，是水道不行，形氣消索也。欬嗽煩寃者，是腎氣之逆也。一人之氣，病在一臟也。若言三臟俱行，不在法也。

目而得之精，裹擷筋骨血氣之精，而與脈并爲系，上屬於腦，後出於項中，故邪中於項，因逢其身之虛，其入深，則隨
眼系以入於腦，入於腦則腦轉，腦轉則引目系急，目系急則目眩以轉矣。

扁鵲難經

㊀頭痛

脈來一呼再至，一吸再至，不大不小，曰平。一呼三至，一吸三至爲適得病。前大後小，卽頭痛目眩，前小後大，卽胸滿短氣。

註　一息四至，是爲平脈。一呼三至，一吸三至，是一息之間脈六至，比之平人多二至，故曰適得病，未甚也。前後非言尺寸，猶十五難前曲後居之前後，以始末言也。

㊁厥頭痛

手三陽之脈，受風寒伏留而不去，則名厥頭痛。

㊂眞頭痛

入連在腦者，則名眞頭痛。

註　眞頭痛，其痛甚，腦盡痛，手足青至節。死不治。蓋腦爲髓海，眞氣之所聚，卒不受邪，受邪則死。

漢張機金匱要略

㊀頭痛

師曰：病人語聲啾啾然細而長者，頭中痛。

陽病十八，頭痛，項腰脊臂脚掣痛。

㈡經脈篇

膀胱足太陽之脈，起於目內眥，上額交巔，其支者從巔至耳上角，其直者從巔入絡腦，還出別下項，循肩髆，內挾脊，抵腰中，入循膂絡腎屬膀胱，是動則病衝頭痛，目似脫，項如拔，是主筋所生病者，痔瘧狂癲疾，頭顖項痛。

膽足少陽之脈，起於目銳眥，上抵頭角，下耳後，循頸行手少陽之前，至肩上，却交出手少陽之後，入缺盆，其支者，從耳後入耳中，出走耳前，至目銳眥後，是主骨所生病者，頭痛頷痛，目銳眥痛，缺盆中腫痛。

㈢海論

腦爲髓之海，其輸上在於其蓋，下在風府，髓海有餘，則輕勁多力，自過其度，髓海不足，則腦轉耳鳴，脛痠眩冒，目無所見，怠惰安臥。

註 腦爲髓之海，氣在頭者，止之於腦，故其輸上在於其蓋，下在督脈之風府，是髓海之上通於天，而下通於經水也。精液補益腦髓而下流陰股，故髓海有餘，則足脛輕健而多力，度骨度也。髓從骨空循度而上通於腦，故有餘則自過其度矣。髓海不足，則津液竭，精液者所以濡空竅者也。是以耳爲之鳴，目無所見，液脫者骨屬屈伸不利，故脛痠而懈怠安臥。

㈣五亂篇

黃帝曰：『經脈十二者，別爲五行，分爲四時，何失而亂？何得而治？』岐伯曰：『五行有序，四時有分，相順則治，相逆則亂，故氣亂於心，則煩心密默，俛首靜伏，亂於肺，則俯仰喘喝，接手以呼，亂於腸胃，則爲霍亂，亂於臂脛，則爲四厥，亂於頭，則爲厥逆，頭重眩仆。』

㈤大惑論

黃帝問於岐伯曰：『余嘗上淸冷之臺，中階而顧，匍匐而前，則惑，余私異之，竊內怪之，獨瞑獨視，安心定氣，久而不解，獨博獨眩，披髮長跪，俛而視之，後久之不已也，卒然自上，何氣使然？』岐伯對曰：『五臟六腑之精氣，皆上注於

黃家日晡所發熱而反惡寒此爲女勞得之膀胱急少腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸其腹脹如水狀大便必黑，時溏，此女勞之病，非水也。腹滿者難治。硝石礬石散主之。

華佗中藏經

㈠頭痛

肝氣逆，則頭痛耳聾頰赤，其脈沉而急，浮而急亦然。主脇肢滿，小便難，頭痛眼眩。

頭目久痛，卒視不明者死。

熱病三五日，頭痛身熱，食如故。脈直而疾者八日死。

㈡腦痛

病腦痛，其脈緩而大者死。

㈢頭眩頭腫

膽虛則傷寒，寒則恐畏，頭眩不能獨臥，膽有水，則從頭腫至足也。

上焦虛則不能制下，遺便溺，頭面腫。

㈣額汗

上焦實熱則額汗出，能食而氣不利，舌乾口焦咽閉之類，腹脹，脇肋痛。

㈤脈色

病頭目痛，其脈澀短者死。

赤色見於耳目額者，五日死。

脈緊頭痛風寒，腹中有宿食不化也。

乾嘔，吐涎沫，頭痛者，茱萸湯主之。

吐後渴飲，得水而貪飲者，文蛤湯主之，兼主微風脈緊頭痛。

(二)頭眩

諸肢節疼痛，身體尫羸，脚腫如脫，頭眩短氣，溫溫欲吐，桂枝芍藥知母湯主之。

肺痿吐涎沫而不欬者，其人不渴，必遺尿，小便數，所以然者，以上虛不能制下故也。此爲肺中冷，必眩多涎唾，甘草乾薑湯以溫之。若服湯已渴者，屬消渴。

心下有痰飲，胷脇支滿，目眩，苓桂朮甘湯主之。

心下有支飲，其人苦冒眩，澤瀉湯主之。

卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，半夏加茯苓湯主之。

假令瘦人臍下有悸，吐涎沫而癲眩，此水也，五苓散主之。

趺陽脈緊爲傷脾，風寒相搏，食穀卽眩，穀氣不消，胃中苦濁，濁氣下流，小便不通，陰被其寒，熱流膀胱，身體盡黃，名曰穀疸。

陽明病，脈遲者，食難用飽，飽則發煩頭眩，小便必難，此欲作穀疸，雖下之，腹滿如故，所以然者，脈遲故也。穀疸之爲病，寒熱不食，食卽頭眩，心胷不安，久久發黃，爲穀疸，茵陳蒿湯主之。

(三)頭搖

病者身熱足寒，頸項強急，惡寒，時頭熱，面赤目赤，獨頭動搖，卒口噤，背反張者，痓病也。若發其汗者，寒濕相得，其表益虛，卽惡寒甚，發其汗已，其脈如蛇。

來三十餘年，所救活者數十百人，無不瘥矣，後人能曉此方，幸勿參以餘術焉。

宋嚴用和濟生方

㈠眩運之證當分內外所因

素問云：『諸風眩掉，皆屬於肝。』則知肝風上攻，必致眩運，所謂眩運者，眼花屋轉，起則眩倒是也。由此觀之，六淫外感，七情內傷，皆能致此，當以外證與脈別之。風則脈浮有汗，項強不仁，寒則脈緊無汗，筋攣掣痛，暑則脈虛煩悶，濕則脈細沉重吐逆。及其七情所感，遂使臟氣不平，鬱而生涎，結而為飲，隨氣上逆，令人眩運，眉稜骨痛，眼不可開，寸脈多沉，此為異耳。與夫疲勞過度，下虛上實，金瘡吐衄便利，及婦人崩中去血，皆令人眩運，當隨其所因治之，乃活血也。

㈡頭病評治

夫人頭者，諸陽之所聚，諸陰脈皆至頸而還，獨諸陽脈皆上至頭耳，則知頭面皆屬陽部也。且平居之人，陽順於上而不逆，則無頭痛之患，陽逆於上而不順，衝壅於頭，故頭痛也。風寒在腦，邪熱上攻，痰厥腎厥，氣虛氣攻，皆致頭痛，前方已有治法。但氣虛氣攻，頭痛愈而復作，延引歲月者多有之矣。偏正頭風，婦人氣盛血虛，產後失血過多，氣無所主，皆致頭痛，惟蝎附丸治氣虛氣攻頭疼，尤合造化之妙，其間所用附子，取其助陽以扶虛，鍾乳取其補陽以鎮墜，全蝎取其鑽錐之義，葱涎則取通行其氣，湯使用以椒鹽，蓋椒能下達，鹽能引用，使虛氣歸於其下，對證用之，無不作效者矣。

㈢頭痛論治

夫頭者上配於天，諸陽脈之所聚，凡頭痛者血氣俱虛，風寒暑濕之邪，傷於陽經，伏留不去者，名曰厥頭痛，蓋厥者

晉王叔和脈經

㊀頭痛

小便難，苦目眩，頭痛，腰背痛。

足厥陰與少陽氣逆，則頭目痛，耳聾不聰，頰腫。

㊁頭眩

病先發於肝者，頭目眩脇痛，支滿。

肝脈沉之而急，浮之亦然，苦脇下痛，有氣支滿引少腹而痛。時肝中風者，頭目瞤，兩脇痛，行常傴，令人嗜甘如阻婦狀。

脈訣

㊀頭痛

頭痛短澀應須死，浮滑風痰必易除。

唐孫思邈千金方

㊀風眩

徐嗣伯曰：夫風眩之病，起於心氣不定，胷上蓄實，故有高風面熱之所為也。痰熱相感而動風，風心相亂則悶瞀，故謂之風眩。大人曰癲，小兒則為癇，其實則一。此方療治萬無不愈，但恐證候不審，或致差違。大都忌食十二屬肉，而

胡天花粉煎服先散其虛熱之氣然後用荊防敗毒散外貼金箍膏[illegible]
服蠟礬丸護心散

㈥髮際發

此證生頸後兩邊，左右鬢髮邊，發生急宜救之。如核硬而發者，急宜取去病根；如腦心發者，熱氣上攻於腦，四畔邊焮赤腫硬連於耳項寒熱疼痛若不急療毒入血肉腐壞爲膿水。頭中出血者氣喘及痰發者難治治法同前宜加減用引經藥。

㈦頂門癰

此癰受在六腑，與陰陽不調，氣上熱壅而成瘻，毒傷於腦，經於是毒證不可輕忽，先用敗毒流氣飲，後服內托流氣飲治之。

㈧發鬢毒

此毒受在手陽明經，氣虛風熱上壅，風毒成瘡，當用清心流氣飲，次用內托流氣飲治之。此證客於會合之前灌在關後，形如米粒，漸次赤腫遍身潮熱。

㈨鬢疽

此疽受在脾胃心肺熱氣結成，當用敗毒流氣飲，清肝流氣飲治之。或醫緩之，命亦難生矣，慎之慎之！

崔紫虛脈訣

㈠頭痛之脈

頭痛陽弦，浮風緊寒，風熱洪數，濕細而堅，氣虛頭痛，雖弦必濇，痰厥則滑，腎厥堅實，風寒暑濕氣鬱生涎，下虛上實，皆運而眩，風浮寒緊濕細暑虛涎弦而滑，虛脈則無。

逆也，逆壅而衝於頭也。痛引腦巔甚而手足冷者，名曰眞頭痛，非藥之能愈；又有風熱痰厥氣虛腎厥，新沐之後，露臥當風，皆令人頭痛，治法當推其所自而調之，無不切中者矣。

竇漢卿瘡瘍全書

㈠發腦

此發腦者伏陽結滯，邪毒上壅，或生玉枕之端，或在風池之穴，或多或少，大小不同，形如硬癤，漸至潰爛，遍生髮中，痛如刀㓾，赤腫無膿，逆則黃水出，順有白膿來。治法以當歸、川芎、人參、赤芍、連翹、桔梗、天花粉、升麻、酒炒黃芩、山梔、金銀花、黃芪、乾葛之類，以意消息治之，外用紫金錠水磨搽之，或大者以膏藥貼之，一日三次，宜服蠟礬丸。

㈡頭後蜂窠散注

此證發於頭後，如是蜂窠者，急宜救之。若焮赤腫痛，起者得療，痰發者必難治矣，急用調治之。若或流於兩肩者，決不可療也。治法與發腦者同。

㈢枕疽

此毒蓋因風熱上攻，入於內發此疽疾，量人年紀老少用藥。人年五十以上難治，少壯可治。更服內疎黃連湯十數貼，加羌活、金銀花、荆芥，或千金托裏散。又宜服黃礬丸，外貼金絲膏，治法與對口瘡同。

㈣腦疽

此毒受在腎臟，虛實熱，壅上腦戶，結伏成毒也。初起三日者，剃去髮，以艾炷如豆大者，灸五壯，外用圍藥，庶能消矣。當用三香內托散、定痛消毒飲治之。

㈤對口瘡

氣循風府而上，則爲腦風，項背怯寒，腦戶極冷，以此爲病[illegible]

㈡雷頭風

夫治雷頭風者，諸藥不效，爲與證不相對也。夫雷頭者，震卦主之，震仰盂，故予製藥內加荷葉，謂象其震之形，其色又青，乃述類象形也。當煎局方中升麻湯。

㈢頭風

頭風痛經云，若不吐涎，久則瞽目而不治，用瓜蔕散吐之，三吐而差。

頭風後有眼疾，眼有半明可救者，防風散吐之。

新沐中風爲首風，頭面多汗惡風，當先一日甚，至其風日則少愈，大川芎丸主之。

㈣腎虛犯寒頭疼

腎虛犯大寒，頭疼齒亦痛，痛之甚數不已者是也，以天南星丸主之。

㈤頭眩

諸風掉眩，皆屬肝木。

風氣甚而頭目眩運者，由風木旺，必是金衰不能制木，而木復生火，風火皆屬陽，多爲兼化，陽主乎動，兩動相搏，則爲之旋轉，如春分至小滿爲二之氣，乃君火之位，自大寒至春分七十三日爲初之氣，乃風木之位，故春分之後，風火相搏則多起飄風，俗謂之旋風是也。四時皆有之，由五運六氣，千變萬化，衝盪擊搏，推之無窮，安得失時而便謂之無也。但有微甚而已。人或乘車躍馬登舟環舞而眩運者，其動不正而左右紆曲，故經曰：『曲直動搖，風之用也。』眩運而嘔吐者風熱甚故也。

張從政儒門事親

許叔微本事方

㊀頭痛

腦逆故令頭痛，齒亦痛，乃厥逆頭痛也。邪氣逆上陽經而作痛，甚則發厥，頭痛齒亦痛，宜白附子散。

厥頭痛卽腎厥巔頂痛不可忍宜玉眞丸

朱肱活人書

㊀頭痛屬外感傷寒者多

頭痛者，陽證也。太陽證頭痛發熱惡寒，無汗麻黃湯，有汗桂枝湯。若已發汗未發汗頭痛如破者，連鬚葱白湯，不止者葛根葱白湯。陽明證頭痛，不惡寒反惡熱，胃實也，調胃承氣湯。少陽頭痛，小柴胡湯。太陰少陰並無頭痛，仲景只有厥陰證吳茱萸湯。

楊士瀛直指方

㊀頭部外證論

發於喉舌頭面腦項肩背胸腹四肢大節，女子妬乳數者爲險，他處爲緩。

五發皆令人頭痛惡心寒熱氣急拘攣，宜五香散五香湯。

金劉完素六書

㊀腦風

夫頭風眩運[illegible]辛涼之藥。凡眩運多年不已，胷膈痰涎壅塞，氣血頗實，吐之甚效。

夫婦人頭風眩運，登車乘船亦眩運，眼澀手痲，髮退，健忘喜怒，皆胷中有宿痰之使然也，可用瓜蔕散吐之。吐訖，可用長流水煎五苓散大人參半夏丸，兼常服愈風餅子則愈矣。

頭風眩運，可用獨聖散吐之，吐訖可用清上降火之劑，防風通聖散，加半夏南星。

㊃雷頭

夫雷頭懶于，乃俗之謬名也。此疾是胷中有寒痰多沐之致然也，可以茶調散吐之。吐訖，冷痰三二升，次用神芎丸下三五行，然後服愈風餅子則愈矣。雷頭者，是頭上赤腫結核，或如生薑片酸棗之狀，可用鈹鍼刺而出血，永除根本也。

又云：大凡人病雷頭懶于，俗呼之謬名也。頭痛昏眩，皆因沐髮而得之，即為首風，此因邪風在於胷中，熱甚化而為痰風之所致也，可以茶調散吐之。吐訖，次用藏用丸下之後，可服烏荊丸。若是雷頭者，上部多有赤腫結核，或面熱無汗。經云：『火鬱發之，開導之決之，可用鈹鍼出血則愈。』靈樞經云：『奪血者無汗，奪汗者無血，血汗俱蕩，豈不妙哉？衰老者，可用涼膈解毒，消風散熱為治；年壯者，可以蕩滌積熱，大黃牽牛，氣血宣通，便無壅滯而愈。』

頭風之甚者，久則目昏；偏頭痛者，屬少陽相火，久則自束，小大便祕澀，皆宜出血而用大承氣湯大下之。

㈠頭證吐法

仲景曰:大法春宜吐,蓋春時陽氣在上,人氣與邪氣亦在上,故宜吐也。涌吐之藥,或丸或散,中病則止,不必盡劑,過則傷人。然則四時有急吐者,不必直待春時也。如仲景傷寒論中以葱根白豆豉湯以吐頭痛萬全方,以鬱金散吐頭痛眩運頭風。余常用吐方,皆是仲景方,用瓜蔕散吐傷寒頭痛,用葱白豆豉湯以吐雜病頭痛。夫上涌之法,名曰撩痰,撩之一字,自有擒縱卷舒,一工吐陳下,一婦人半月不止,涎至數斗,命懸須臾,倉皇失計,求予解之,予使煎麝香湯下咽立止,蓋瓜苗聞麝香即死,吐者瓜蔕也,所以立解。如藜蘆吐者不止,以葱白湯解之,以石藥吐者不止,以甘草貫衆解之,諸草木吐者,可以麝香解之。余之撩痰者,以釵股雞羽探引,不出,以虀投之,投之不吐,再投之,且投且探,無不出者。吐至昏眩,愼勿驚疑,如發頭眩,可飲冰水立解,如無冰時,新汲水亦可,彊者可一吐而安,弱者可作三次吐之,庶無損也。

㈡頭痛

夫頭痛不止,乃三陽之受病也。三陽者,各分部分,頭與項痛者,是足太陽膀胱之經也,攢竹痛,俗呼爲眉稜痛者是也。額角上痛,俗呼爲偏頭痛者,是少陽經也;如痛久不已,則令人喪目,以三陽受病,皆胸膈有宿痰之致然也。先以茶調散吐之,後以香薷散白虎湯投之則愈。然頭痛不止,可將葱白鬚豆豉湯吐之,吐訖可服川芎薄荷辛涼淸上搜風丸香芎散之類。仲景曰:葱根豆豉,亦吐傷寒頭痛。叔和云:『寸脈急而頭痛』是也。

又一法治頭痛不愈者,可煎連鬚葱白豆豉湯,多服之後吐爲效,吐後可服川芎薄荷湯辛涼之劑,淸上之藥,疎風丸散之類。仲景云:『傷寒頭痛脈寸口急而頭痛』是也。

夫病亦目經年不愈者,是頭風所加之令人頭痛,可用獨聖散八正散之類。三陽熱鬱,頭痛不敢見日光,置冰頂上,宜汗吐下。

欽定古今圖書集成醫部全錄

醫部彙考一百二十三

頭門二

元李杲十書

㈠辨頭痛證治大法

內證頭痛有時而作，有時而止，外感頭痛，常常有之，直須傳入裏實方罷，此又內外證之不同者也。

金匱眞言篇曰：東風生於春，病在肝，俞在頭項，故春氣者病在頭。又諸陽會於頭面，如足太陽膀胱之脈，起於目內眥，上額交巓，直入絡腦，還出別下項，病衝頭痛，足少陽膽經之脈，起於目銳眥，上抵頭角，病頭角額痛。夫風從上受之，風寒傷上，邪從外入，客於經絡，令人振寒頭痛，身重惡寒，治在風池風府，調其陰陽，不足則補，有餘則瀉，汗之則愈，此傷寒頭痛也。頭痛耳鳴，九竅不利者，腸胃之所生，乃氣虛頭痛也。心煩頭痛者，病在膈中，過在手巨陽少陰，乃濕熱頭痛也。如氣上不下，頭痛巓疾者，下虛上實也，過在足少陰巨陽，甚則入腎，寒濕頭痛也。如頭半邊痛者，先取手少陽陽明，後取足少陽陽明，此偏頭痛也。有眞頭痛者，甚則腦盡痛，手足寒至節，死不治。有厥逆頭痛者，所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦爲主，腦逆故令頭痛，齒亦痛。凡頭痛皆以風藥治之者，總其大體而言之也。高巓之上，惟風可到，故味之薄者，陰中之陽，乃自地升天者也，然亦有三陰三陽之異。故太陽頭痛，惡風脈浮緊，川芎羌活獨活麻

㈡大頭痛

夫大頭痛者，雖爲在身之上，熱邪伏於內，又感天地四時，非節瘟疫之氣所著，所以成此疾，至於潰裂膿出，而又染他人，所以謂之疫癘也。大抵足陽明邪熱太甚，資實少陽相火爲之熾，多在少陽，或在陽明，甚則逆傳太陽，視其腫勢在何部分，隨其經而取之，濕熱爲腫，木盛爲痛，此邪發於首，多在兩耳前後，所先見出者爲主，爲根，治之宜早，藥不宜速，恐過其病。上熱未除，中寒已作，有傷人命矣。此疾是自內而之外也，是爲血病。況頭部受邪，見於無形之處，至高之分，當先緩而後急，先緩者謂邪氣在上，所著無形之分，既著無形，所傳無定，若用重劑大瀉之，則其邪不去反過其病矣，雖用緩藥，若急服之，或食前，或頓服，咸失緩之體，則藥不能升騰，徐潰無形之邪，或藥性味形狀擬象服餌，皆須不離緩體，及寒藥或炒或酒浸之類，皆是也。後急者，謂前緩劑已經高分，瀉邪氣入於中，是到陰部，入於中，染於內之有形質之所，若藥不速去，反損陰分，此中治卻爲客熱所當急也。治客以急，此之謂也。治主以緩，先緩謂也。謂陽邪在上，陰邪在下，各爲本家，病不從先後，錯其緩急，不惟不能解其紛，而復致其亂矣。此所以治主當緩，治客當急，謂陽分受陽邪，陰分受陰邪者，主也。陽分受陰邪，陰分受陽邪者，客也。凡所謂急者，當急去之，此治客以急也。假令少陽陽明之爲病，少陽者，謂邪出於耳前後也，陽明者，首面大腫也，先以黃芩黃連甘草通炒剉煎，少少不住服呷之。或一劑畢，再用大黃或酒浸或煨，又以鼠黏子新瓦上炒，㕮咀煎成，去柤，納芒硝各等分，亦時時呷之，當食後用，徐得微利，若邪氣已，只服前藥，如不已，再服後藥，依前次第用之，取利已，卻止。如陽明渴者，加石膏，少陽渴者，加栝蔞根，陽明行經，加升麻葛根芍藥之類，選而加之。太陽行經，加羌活荊芥防風之類，選而加之，並與上藥相合用之，不可獨用散者，散也。此一節亦見病機，氣宜大凡治雜病，先調其氣，次療諸疾，無損胃氣，是其要也。若血受病，亦先調氣，謂氣不調則血不行。又氣爲之綱，夫也，夫不唱，婦不隨也。如婦人病經，先柴胡以行經之表，次四物以行經之裏，亦先氣而後血也。不能飲而渴，不能食而小便黃或澀，皆因胃氣虛而生熱，有形之物不入，火炎上而

黃之類爲主。少陽經頭痛，脈弦細往來寒熱，柴胡爲主。陽明頭痛，自汗發熱惡寒脈浮緩長實者，升麻葛根石膏白芷爲主。太陰頭痛，必有痰體重或腹痛爲痰癖，其脈沉緩蒼朮半夏南星爲主。少陰經頭痛，三陰三陽經不流行而足寒氣逆爲寒厥，其脈沉細，麻黃附子細辛爲主。厥陰頭項痛，或吐痰沫厥冷，其脈浮緩，吳茱萸湯主之。血虛頭痛，當歸川芎爲主。氣虛頭痛人參黃芪爲主。氣血俱虛頭痛，調中益氣湯少加川芎蔓荊子細辛，其效如神。白朮半夏天麻湯治痰厥頭痛藥也。清空膏乃風濕熱頭痛藥也。羌活附子湯，治厥陰頭痛藥也。如濕氣在頭者以苦吐之，不可執方而治。先師嘗病頭痛，發時兩頰青黃，眩運目不欲開，懶言，身體沉重，兀兀欲吐。潔古曰：此厥陰太陰合病，名曰風痰，以局方玉壺丸治之，更灸俠谿穴即愈。是知方者體也，法者用也，徒執體而不知用者弊。體用不失，可謂上工矣。

三陽頭痛，羌活、防風、荊芥、升麻、葛根、白芷、柴胡、川芎、芍藥、細辛、葱白連鬚，分兩旋加。若陰證頭痛，只用溫中藥足矣，乃理中薑附之類也。

風寒傷上，邪從外入，客於經絡，令人振寒頭痛，或風寒之邪，伏留陽經，爲偏正頭痛，宜三五七散芎辛湯，芎芷香蘇散如聖餅子。

心煩頭痛者，病在膈中，乃濕熱頭痛也，宜清空膏，小清空膏，又用吐法。

厥逆頭痛，當有所犯大寒，內至骨髓，髓以腦爲主，腦逆故令頭痛齒亦痛，乃厥逆頭痛也，羌活附子湯。

厥者逆也，邪氣逆上陽經而作痛，甚則發厥，頭痛齒亦痛，宜白附子散。

氣血虛而邪氣逆上爲頭痛。

頭痛耳鳴九竅不利，兩太陽穴痛甚，乃氣虛頭痛也，宜順氣和中湯，黃芪益氣湯。

血虛頭痛，自魚尾上攻而爲痛，宜當歸補血湯加味四物湯。眉尖後近髮際曰魚尾。

如頭半寒痛者，亦偏頭痛也。
頭痛須用川芎，如不愈各加引經藥。
太陽川芎，陽明白芷，少陽柴胡，太陰蒼朮，少陰細辛，厥陰吳茱萸。
如感冒頭痛，宜防風羌活藁本白芷。
如氣虛頭痛，宜黃芪酒洗生地黃南星，祕藏安神湯。
如風熱在上頭痛，宜天麻蔓荊子川芎酒製黃芩。
如苦頭痛用細辛。
如形瘦蒼黑之人頭痛，乃血虛，宜當歸川芎酒芩。
如頂巔痛，宜藁本防風柴胡。東垣云「頂巔痛須用藁本，去川芎。」
頭風用熱藥者多，間有挾熱而不勝熱劑者，宜消風散茶調散服之。
頭風發動，頂後兩項筋緊弔起痛者，看其人挾寒挾虛，宜三五七散。
素問論頭風者，本於風寒入於腦髓也。本事方論婦人患頭風者，十居其半，或者婦人無巾以禦風寒焉耳。男子間有患者。若經年不愈者，宜灸顖會百會前頂上星等穴差。

㈡頭痛脈法

腎厥頭痛，其脈舉之則弦，按之則堅。
頭痛左手脈數，熱也。脈澀有死血也。右手脈實，有痰積也。脈大是久病。

㈢頭眩

頭眩，痰挾氣虛併火，治痰爲主，挾補氣藥及降火藥，無痰則不作眩。痰因火動，又有濕痰者，有火痰者，濕痰者多宜

渴，戊就癸而化，所以小便黃赤，或如棗汁，法當補胃，以錢仲陽白朮散，乾葛木香藿香等藥治之。

朱震亨心法

㈠各種頭痛證治

頭痛多主於痰，痛甚者火多，有可吐者，可下者。諸經氣滯，亦作頭痛。

清空膏治諸頭痛，除血虛頭痛不可治。

血虛頭痛，自魚尾上攻頭痛，用芎歸湯，古追涎藥。

頭風屬痰者多，有熱有風有血虛，在左屬風，荊芥薄荷，屬血虛川芎當歸，在右屬痰，蒼朮半夏，屬熱酒芩爲主，又屬濕痰，川芎南星蒼朮。

偏頭風在左而屬風者，用荊芥薄荷；此二味卽是治之主藥，有君臣佐使之分，凡主病者爲君而多，臣次之，佐又次之，須要察其兼見何證而佐使之。如有痰，卽以二陳湯治痰而佐之，他證皆倣此。又須察識病情，全在活法出入加減，不可執方。

頭痛多主於痰，痛甚者火多，宜清痰降火，用二陳湯，加白芷川芎爲主。

肥人多是濕痰，宜半夏蒼白朮。

瘦人是熱與血虛，宜四物湯，加酒芩防風。

勞役下虛之人，似傷寒發熱汗出，兩太陽穴痛甚，此相火自下衝上，宜補中益氣湯，加川芎當歸，甚者加知母黃蘗蔓荊子細辛。

頭痛如破，酒炒大黃半兩，茶煎服。

左手脈數熱多，脈濇有死血。
右手脈實有痰積，脈大是久病。
久病之人，氣血俱虛而脈大，痰濁不降也。

㈤大頭病

大頭病乃濕熱在高巓之上，用羌活及酒炒黃芩酒蒸大黃，隨病加減，切不可服降藥。

羅謙甫衛生寶鑑

㈠頭痛

太陽頭痛，惡風寒，幷諸血虛頭痛，川芎。
少陽頭痛，脈弦細寒熱，柴胡。
陽明頭痛，自汗發熱惡寒，白芷。
諸氣虛諸氣血俱虛頭痛，黃芪。
太陰頭痛必有痰，體重或腹痛爲痰癖，半夏。
厥陰頭痛項痛，其脈浮微緩，知欲入太陽病矣，必有痰。
少陰頭痛，手三部三陽經不流行，而足寒氣逆爲寒厥矣。

㈡頭風

頭風爲肝經，風盛木自搖動，故木剋脾土，金來剋之，是子能與母復讎也。使梳頭有雪皮，見肺之證也。肺主皮毛，大便實瀉青丸主之，虛者，人參消風散主之。

二陳湯，火者加酒芩。挾氣虛者相火也，治痰爲先，挾氣藥降火，如東垣半夏白朮天麻湯之類。眩運不可當者，以大黃酒炒爲末，茶湯調下即止。或用黑錫丹鎮墜之，皆急則治其標也。火動其痰，用二陳加黃芩蒼朮羌活散風行濕。

眩者，言其黑運轉旋，其狀目閉眼暗，身轉耳聾，如立舟船之上，起則欲倒，蓋虛極乘寒得之，亦不可一途而取軌也。

又風則有汗，寒則掣痛，暑則熱悶，濕則重滯，此四氣乘虛而眩運也。

又或七情鬱而生痰，動火隨氣上厥，此七情致虛而眩運也。淫慾過度，腎家不能納氣歸原，使諸氣逆奔而上，此氣虛眩運也。吐衄漏崩，肝家不能收攝榮氣，使諸血失道妄行，此血虛眩運也。

要尋致病之因，隨機應敵，其間以升降鎮墜行氣爲最，不可妄施汗下，識者將有採薪之憂。

有早起眩運，須臾自定，日以爲常者，正元飲下黑錫丹。

傷濕頭運，腎著湯加川芎，名除濕湯。

疎風，川芎茶調散。

有痰，青州白丸子。

眩運者，中風之漸也。如肥白人氣虛而挾痰者，四君子湯、倍蜜炙黃芪，加半夏橘紅，或少加川芎荊芥穗，以清利頭目也。黑瘦人二陳湯加片芩薄荷，入竹瀝薑汁童便服。

如痰盛而挾氣虛者，二陳湯加人參白朮黃芪，或少加炮附子，煎入竹瀝薑汁服。

如體瘦血虛而痰火兼盛者，二陳湯合四物加片芩薄荷，煎入竹瀝薑汁童便服。

如諸般眩運挾風，則加防風荊芥天麻秦艽等藥，挾熱加片芩黃連梔子之類，挾寒加乾薑官桂附子之屬，無有不安者也。

痰在上，火在下，火炎上而動其痰也。此證屬痰者多，蓋無痰不能作眩也。雖有因風者，亦必有痰。又曰：火動其痰，二

五分細辛三分，諸頭痛併用此四味，[illegible]

一日太陽受病，邪在皮膚，故頭項強痛腰脊強。

凡瘟病發於三陽者多，而三陰者少。脈浮頭痛發熱者，太陽也，宜人參羌活散，加葛根葱白生薑紫蘇汗之。自汗身痛者，九味羌活湯。大頭瘟爲天行邪氣，客於太陽陽明少陽之經，頭目俱腫而爲病也。太陽病發於頭上，幷腦後下項及目後赤腫者是也，治宜荆防敗毒散，羌活藁本行經。三陽經俱受邪，幷發於頭面耳鼻者，以普濟消毒飲，或通聖散消毒散，外用清涼救苦散敷之。

㈡頭痛大法分內外之因

頭痛自內而致者，氣血痰飲五臟氣鬱之病，東垣論氣虛血虛痰厥頭痛之類是也；自外而致者，風寒暑濕之病，仲景傷寒東垣六經之類是也。

風寒暑濕火熱，皆外邪，氣血痰飲五臟之證，皆內邪，宜隨其氣血痰飲。七情內火，分虛實寒熱，而調其內治其外也。然氣血而用補，宜用東垣之法，若三因等方，用附子以治氣虛，此則從陽虛立意，非人身平和之血氣也。若夫年久偏正頭風者，多因內挾痰涎，風火鬱遏經絡，氣血壅滯之證，然亦有血虛者，須宜分別以治之。

㈢分經用藥治頭痛法

太陽頭痛，惡風寒，川芎爲引導。

陽明頭痛，自汗發熱惡寒，白芷。

少陽頭痛，往來寒熱而脈浮弦者，柴胡。

太陰頭痛，體重痰實及腹痛，半夏。

少陰頭痛，三陰三陽經不流行，而足寒逆爲厥頭痛，細辛。

厥陰頭痛項痛，脈微浮緩，欲入太陽，其疾痊然，亦當用川芎。

㊂頭腫

頭大，此邪熱客心肺上攻頭目爲腫盛。俗云『大頭天行病，』其證頭面腫盛，目不能開，上喘，咽喉不利，舌乾口燥，治用試效方普濟消毒飲子，或加防風薄荷川芎當歸身㕮咀，或大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利之。如腫勢盛大，宜鍼刺之。

危亦林得効方

㊀頭痛

痰厥頭痛，宜上淸白附子丸，定風餅子芎莘導痰湯。眞頭痛者，其痛上穿風府，陷入泥丸宮，不可以藥愈。朝發夕死，夕發朝死，蓋頭中人之根，根氣先絕也。

㊁脈法

頭痛浮滑，易除。短濇不愈。

明徐春甫古今醫統

㊀頭痛

濕家病，身疼發熱，面黃而喘，頭痛鼻塞，其脈大，自能飲食，腹中和，病在頭中寒濕，故鼻塞內藥鼻中卽愈。有所勞倦，穀氣衰少，脾氣下陷，頭痛發熱，其或發熱惡寒，寒熱間作，或蒸蒸躁熱，發於肌肉之間，始得之氣高而喘，身熱而煩，其脈洪大而頭痛，或渴不止，皮膚不仁，風寒而生寒熱，亦與傷寒相似，此李明之主於內經勞倦形氣不足脾胃論之所由作也。自內而之外，熱者然也。

肥人眩運，氣虛有痰瘦人眩運血虛有火，傷寒吐汗下後，必是陽虛。故鍼經云：『上虛則眩，』此三者責其虛也。

㊄眩運宜審四氣

眩運挾風，則有汗寒則掣痛暑則熱悶，濕則重滯，此四氣乘虛而眩運也。七情鬱而生痰動火，氣因上厥，此七情致虛而眩運也。淫慾過度，腎家不能納氣歸元，使諸氣逆奔而上，此氣虛眩運也。吐血或崩漏，肝家不能收攝榮氣，使諸血失道，此血虛眩運也。要尋致病之因，隨機應變，其間以鎭墜下行爲最，不可妄施汗下。

玉機微義云：『眩運一證，皆稱爲上盛下虛所致，而不明言其所以然之故。』夫所謂虛者，氣血虛也，所謂盛者，痰涎風火也。原病之由，有氣虛者，乃淸氣不能上升，或汗多亡陽，當升陽補氣，有血虛者，乃因亡血過多，陽無所附，當益陰補血，此皆不足之證。有因痰涎鬱遏者，宜開痰導鬱，重則吐下。有因風火所動者，宜淸上降火。有因外感而得者，嚴氏雖分四氣之異，皆當散邪，此皆有餘之證也。

㊅鎭墜藥治眩運須分標本

世所謂氣不歸元，而用丹藥鎭墜沉香降氣之法。香燥散氣，其不歸之氣，豈能因此而復耶？凡用鎭墜，所謂急則治其標也。若謂使氣歸元，必無是理。旣曰歸元，豈肯復作？凡鎭墜少止又復眩者，此氣未歸元而未治其本也。要氣歸元，必求其本緩而治之。

經曰：『百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲變者。』岐伯歷舉病機一十九條，而屬火者五，此非相火爲病之出於臟腑者乎？考諸內經少陽病爲瘈瘲，太陽病時眩仆，少陰病瞀暴瘖鬱冒不知人，非諸熱瞀瘈之屬火者乎？少陰嘔逆，厥氣上行，膀胱病衝頭痛，太陽病厥氣上衝胷少腹，控睪引腰脊上衝心，少陰病氣上衝胷嘔逆，非諸逆衝上之屬火者乎？

頭目眩運，眼前黑暗，如坐舟車，兀兀欲吐者，痰也。

氣虛頭痛，用黃芪。

血虛頭痛用當歸。

氣血俱虛頭痛，黃芪當歸。

傷寒太陽頭痛，麻黃湯桂枝湯。

陽明頭痛，白虎湯。

少陽頭痛，小柴胡湯。

陽明頭痛大便多祕，或可下之。

太陰頭痛，脈浮，桂枝湯。脈沉，理中湯。

少陰頭痛脈浮微，麻黃附子細辛湯。

厥陰頭痛，外傷本經，桂枝麻黃各半湯。嘔而微吐清水，吳茱萸湯。

偏頭風諸家不分所屬，故藥多不效。

如因感冒而頭痛者，宜加防風羌活藁本葛根升麻柴胡之類。

風熱上攻，天麻蔓荊子川芎酒芩苦。頭痛，加細辛。

痰厥痛，甚者吐之；火者清之，散之；虛者補之。

壯實熱痛大便結燥者，大承氣湯。

頭面壅腫有熱，脈弦數者，涼膈散，去硝黃，加桔梗枳殼荊芥薄荷。如頂巔痛者，宜加藁本酒炒升柴。

面上紅腫因氣實連頭痛者，胃風湯。

嗃鼻之法，則吐法之義也。經云：『濕氣在上，以苦吐之，』故邪在胷中，服而吐之，邪在頭上，嗃而嚏之。張子和點目

㊂頭面赤腫

經云：『身半已上腫，天之氣也。身半已下腫，地之氣也。』乃邪客心肺之間，上攻頭目而為腫，此感四時不正之氣也，與膏粱積熱之證不同。硝黃之劑，非大便祕實不可用。若不審其因及辨其虛實表裏，槩用攻之，必致有誤。常見饑饉之時，芻蕘之人多患之，乃是胃氣有損，邪氣從之，不可不察。常治邪在表者，用葛根牛蒡子湯，人參敗毒散，或普濟消毒飲子。邪在裏者五利大黃湯，梔子仁湯。表裏俱不解者，防風通聖散。表裏俱解而腫不退者，犀角升麻湯。腫甚者砭患處出惡血，以泄其毒，十日外自愈。若嚏出膿血即愈。欲其作膿者，用托裏消毒散，欲其收斂者，用托裏散，此法最為穩當。五七日咽喉閉塞，言語不出，頭面不腫，食不知味者，不治。時毒者，為四邪毒之氣感之於人也。其候，發於鼻面耳項咽喉，赤腫無頭，或結核有根，令人增寒發熱頭痛，或肢體痛，恍惚不寧，咽喉閉塞。人不識者，將為傷寒，便服解藥一二日，腫氣益增，方悟，始求瘡醫。原夫此疾古無方論，世俗通為丹瘤，病家惡言時毒，切恐傳染。考之經曰：『人身忽經變赤，狀如塗丹，謂之丹毒。』此風熱惡毒所為，與時毒特不同耳。蓋時初狀如傷寒，五七日間，乃能殺人，治者宜精辨之。先論脈，滑數浮洪沉緊弦濇，皆其候。蓋浮數者邪在表也，沉濇者邪氣深也。氣實之人急服化毒丹以攻之，熱實不利，大黃湯下之。有表證者，解毒升麻湯以發之。年高氣弱者，五香連翹湯主之。又於鼻內嗃通氣散，取十餘嚏作效。若嗃藥不嚏者，不可治。如嚏出膿者，治之必愈。左右之人，每日用嚏藥嗃之，必不傳染。其病人亦每日用嚏藥三五次，以泄熱毒，此治時毒之良法也。經三四日不解者，不可大下，尤宜和之，犀角連翹散之類。至七八日，小大便通利，頭面腫起高赤者，可服托裏散，黃芪散，宜鍼鎌出血，泄其毒氣。十日外不治自愈也。此病若五日以前，精神昏亂，咽喉閉塞，語聲不出，頭面不腫，食不知味者，必死。殊不知病有陰有陽，有可汗有可下，有徵甚有逆從，不可不審也。如裏實而不利者下之，表實而不散者解之，表裏俱實而不解者，解表攻裏，表裏俱解而不消者和之。腫甚焮痛者，砭去惡血，更用消毒之劑。不作膿或不潰者，托之。饑年普患者，不宜用峻利，當審治之。

消渴數飲，其人必眩，背寒而嘔者，因利虛故也。

㈦頭重

玉機謂人稟中和之氣而生，有三，曰元精，曰元氣，曰元神。三者，本身中之眞精眞氣眞脈也。夫精乃臟腑之眞元，非營血之比，故曰天癸。人之精血常不足，加之數奪其眞，資化失，則營氣乃虛，虛則衞氣不固，精滑脫，腎氣竭而陰微不能與胃氣上升，以接清陽之氣。故病多頭重，或氣痛弱而食少元氣下陷脈卽微弱外散欲絕而虛洪或見損脈，此實元精不足之所致，非有外感賊邪之病也。經曰：『因於濕，首如裹，聲如從室中』，言濕熱不已，熏蒸於上，則頭重目黃而鼻塞也。故東垣云：『濕淫所勝，助風以平之』，爲濕邪之襲於上者也。

㈧大頭瘟

治大頭瘟，不宜速攻，則邪氣不伏，反攻其內而傷人也。且頭空虛之分，旣著空虛，則無所不至也。所以治法當先緩而後急，則邪伏也。緩治以清熱消毒，虛者兼益元氣，胃虛食少者兼助胃氣，內實熱盛者，大便祕結，以酒浸大黃下之，乃宜熱而泄其毒也。此爲先緩後急之法。若先從鼻腫，次腫於目，又次腫於耳，至頭上，絡腦後結塊，則止不散，必出膿而後愈。

㈨腦疽

腫痛未作膿者，宜除濕消毒，黃連消毒飲之類。

大痛或不痛或痲木者毒甚者，隔蒜灸之，更用解毒藥。

腫痛便祕者，邪在內也，宜泄之。

不甚痛，或不作膿者，虛也，托裏爲主。不作膿及不潰，俱宜托裏。

㈠頭痛

諸頭痛，有因氣因痰因虛及外感四氣，或酒食所傷，或作勞失力，以致頭痛，不問何證，疑似之際，並可與如聖餅子烏芎湯，外有臭毒頭痛，吃一味炒香附愈。荊公解痛字義云『宜通而塞則爲痛。』

有偏正夾腦風服川烏附不愈，用蓮子草烏而愈者，此乃以毒攻毒之意，不可不知。

有上焦熱，頭痛宜敗毒散去柴胡，加甘菊花。如其素有頭風眩運，不可謂其無痛而不以爲風，切宜詳審，未宜遽作虛治。若投補劑愈甚。別又無痰所失血等患，又非諸般病後，卒然得此，是風暈分曉，宜小續命湯，加全蝎三四箇。

偏正頭風作痛，痛連於腦，常如牽引之狀，發則目不可開，眩運不能擡舉，宜芎辛湯，每服加全蝎五箇，間進太陽丹，及如聖餅子，或用大茶調散，八生散，追風散，大三五七散。覺上膈有熱，大茶調散，並一字散。

痰作頭痛，其人嘔吐痰多者，宜芎辛湯，或芎辛湯，去茶芽，導痰湯，加芎半錢，八生散亦可用。有病此發作無時，俗名痰飲頭風，氣不順，停痰上攻頭痛，順氣爲上，二陳湯，導痰湯，並有加減法。

頭痛挾熱，項生磊塊作痛，宜都梁丸。

有爛頭風，痒而痛者，於服頭風藥外，用烏酢磨鐵銹塗，生薑汁亦可揩擦。

怒氣傷肝，及肺氣不順，上衝於腦，令人頭痛，宜沉香降氣湯，并蘇子降氣湯，下養正丹，或用芎附飲。

因虛頭痛，此爲腎厥頭痛，宜用正元散，或大三五七散，入鹽煎服。或於正元散，入炒椒十五粒，下來復丹，間進黑錫丹。有服諸藥不效，其痛愈甚，宜茸硃丹。緣鹿茸生於頭，頭病而治以鹿茸，蓋以類相從也。

㈡眩運

痰飲頭風，七氣失血中酒等病，皆能眩運，已各見本證，今獨舉不兼他病見眩運者，是皆虛損也。然有不時眩運者，

(二)癰發有不可治

腦上諸陽所會穴，則髓出右頤後一寸三分。毒銳者不治。鬌深及寸餘者不治。

虞摶醫學正傳

(一)眩運

內經曰：『諸風掉眩，皆屬肝木。』又曰：『歲木太過，風氣流行，脾土受邪，民病飧泄食減，甚則忽忽善怒，眩冒巔疾，』雖為氣化之所使然，未必不由氣體之虛衰耳。其為氣虛肥白之人，濕痰滯於上，陰火起於下，是以痰挾虛火，上衝頭目，正氣不能勝敵，故忽然眼黑生花，若坐舟車而旋運也。甚而至於卒倒無所知者有之。丹溪所謂無痰不能作眩者，正謂此也。若夫黑瘦之人，軀體薄弱，眞水虧欠，或勞役過度，相火上炎，亦有時時眩運，何濕痰之有哉？大抵人肥白而作眩者，治宜清痰降火為先，而兼補氣之藥。人黑瘦而作眩者，治宜滋陰降火為要，而帶抑肝之劑。抑考內經有曰：『風勝則地動，風木太過之歲，亦有因其氣化而為外感風邪而眩者。治法宜祛風順氣，伐肝降火，為良策焉。外有因墜損而眩運者，胷中有死血迷閉心竅而然，是宜行血清經，以散其瘀結，各類推而治之，無有不痊者也。

(二)偏頭痛

偏頭痛，在右，二陳湯加川芎、白芷、防風、荊芥、薄荷、升麻。在左，二陳湯合四物湯，加防風、荊芥、薄荷、細辛、蔓荊子、柴胡、酒芩。

(三)温病頭痛死脈候

温病二三日，體熱腹滿頭痛，食飲如故，脈直而疾，八日死。

之先難愈

左額右額發赤疽，不拘大小，狀如桃李，急宜藥貼破，見膿無害。右額角一處發毒疽及惡癤，爲近太陽穴，如腫滿太陽，即成虛損，爲近穴而難消不可破。如破後傷外風水，即能害人，亦宜用藥潰膿後速斂合瘡口。如經冬月即感冷瘡，緣此處近太陽穴，上至額角，都爲險處。

左右太陽穴或發疽癤及癰，五七日不潰，毒氣流入眼眶，攻眼眼合不開，用藥貼破，破後愼外風水，風水所入，即損其睛，痓損眼瞼而成大疾。

王綸明醫雜著

㈠頭痛

久頭痛病，略感風寒便發。寒月須重綿厚帕包裹者，此屬鬱熱本熱而標寒也。世人不識，率用辛溫解散之藥，暫時得效，誤認爲寒。殊不知因其本有鬱熱，毛竅常疎，故風寒易入，外寒束其內熱，閉逆而爲痛。辛熱之藥，雖能開通閉逆，散其標之寒邪，然以熱濟熱，病本益深，惡寒愈甚矣。惟當瀉火涼血爲主，而佐以辛溫散表之劑，以從法治之，則病可愈而根可除也。

註 前證多主於痰，痛甚者，乃風毒上攻，有血虛者，有諸經氣滯者，有氣虛者，有四氣外傷者，有勞役所傷者，有可吐者，有可下者，當分虛實寒熱兼變而治之。若夫偏正頭風，久而不愈，乃內挾痰涎風火，鬱遏經絡，氣血壅滯，甚則目昏緊小，二便祕澀，宜砭出其血以開鬱解表。余嘗治尚寶劉毅齋，但怒則兩太陽作痛，先用小柴胡加茯苓山梔，後用六味丸以生腎水而不再發。

有早起眩運，須臾自定，日以爲常者，正元飲下黑錫丹。

有因虛致運，雖運醒時面常欲近火，欲得煖手按之，蓋頭面乃諸陽之會，陽氣不足故耳。

有頭風證，耳內常鳴，頭上有如鳥雀啾啾之聲，切不可全謂耳鳴爲虛，此頭腦挾風所爲也。有眩運之甚，擡頭則屋轉，眼常觀見黑花，常如有物飛動，或見物爲兩，宜小三五七散，或芎附湯，生料正元飲加鹿茸一錢，下靈砂丹，或用正元飲，炒川椒十五粒，下茸砂丸。若不效，則獨用鹿茸一味，每服半兩，用無灰酒三盞，煎至一盞，去滓，入麝香少許服。曾有頭疼痛不愈，服茸硃丹而效者。

樓英醫學綱目

㈠頭重痛

脈動作，頭重痛，熱氣潮者，屬胃，宜調胃承氣湯下之即愈。

㈡頭搖

風頭旋者，別無疾痛，不自覺知，常常頭自搖者是也。肝風盛則搖頭，治法同頭風。

㈢頭眩

成無己云：眩者非眩而見其眩，謂眼黑眩也。運者，運爲運轉之運，世謂之頭旋是也。

㈣頭痛脈法

病若頭痛目痛，脈急短濇者死。

㈤腦額癰疽

[illegible]，[illegible]，[illegible]上，[illegible]主腦癰皮薄易得破穴，急破急出膿不害。腦疽皮厚，難

……眩運語僻多下利時自冒者最極難治

㊃頭重

傷寒頭重不能舉有二證：太陽病深，頭重不能舉；陰陽易病，亦頭重不能舉，皆危證也。

㊄頭搖

傷寒陽脈不和，則頭爲之搖。有心臟絕者亦搖頭，痓病風盛則搖頭，皆凶證也。有裏病而搖頭者亦重證也。

㊅頭生白屑

頭生白屑，肺之證也。肺主皮毛，故因風熱而頭皮燥癢，生白屑，消風散主之。

㊆眩運定脈

肝脈溢大必眩運，宜預防之。

㊇腦疽

五發證焮腫作痛，煩渴引冷，宜黃連消毒散，當歸羌活湯，清熱消毒飲。若腫痛口渴，好飲熱湯，爲腎虛陽火熾，宜托裏消毒散，托裏益氣湯，腎氣丸。

李中梓醫宗必讀

㊀頭痛

經之論頭痛，風也，寒也，虛也。運氣論頭痛十條，傷寒論太陽頭痛一條，皆六氣相侵與眞氣相薄，經氣逆上干於清道，不得運行，壅遏而痛也。頭爲天象，六腑淸陽之氣，五臟精華之血，皆會於此。故天氣六淫之邪，人氣五賊之變，皆

李梴醫學入門

㈠頭痛

腦者髓之海，諸髓皆屬於腦，故上至腦，下至尾骶，皆精髓升降之道路也。

頭沉痛，痛入泥丸。手足冷爪甲青者，謂之眞頭痛，其連齒痛甚者，屬少陰厥陰證，俱不治。

偏頭痛年久，大便燥目赤眩運者，此肺乘肝氣鬱血壅而然，宜大承氣湯下之。外用大黃芒硝爲末，井底泥調貼兩太陽穴，乃愈。

偏頭痛宜川芎茶調散，一字輕金散，川芎散，芎犀丸，嗃鼻法。

濕痰發則痛密無間，宜三生丸，或二陳湯加南星蒼朮川芎細辛。

如氣上不下，厥而爲痛，宜芎烏散。

冒雨傷濕頭重眩痛，遇陰雨則甚，宜芎辛湯，芎朮除眩湯，

㈡頭風證

頭風之證，素有痰飮，或櫛沐取涼，或久臥當風，以致賊風入腦入項，自頸以上，耳目口鼻眉稜之間，有痲痹不仁之處，或頭重，或頭運，或頭皮頑厚不自覺知，或口舌不仁不知食味，或耳聾，或目痛，或眉稜上下掣痛，或鼻中聞香極香，聞臭極臭，或只呵欠而作眩冒之狀，熱者消風散，冷者追風散，通用川芎茶調散，祛風通氣散。

頭風發時悶痛，必欲綿帕包裹者，熱鬱也。二陳湯加酒芩、荊芥、川芎、薄荷、石膏、細辛，或消風百解散。

頭風宜白芷散，天香散，加減芎辛湯，菊花茶調散。

婦人頭風，宜羗活去風湯。

眞頭痛手足青至節旦發夕死夕發旦死蓋腦爲髓海受邪則死灸百會穴猛進大劑參附亦有生者

㈡雷頭風

雷頭風頭痛而起核塊，或頭中如雷鳴，震爲雷震，仰盂用青荷葉者，象震之形與色也。淸震湯主之。有因痰火耳如雷鳴，熱半夏一兩，大黃煨二兩，天麻黃芩各六錢，薄荷葉三錢，甘草三錢，水泛丸菉豆大臨臥茶呑二錢，痰利爲度。

㈢大頭風

大頭痛，頭大如斗，此感天地非時之氣，甚而潰裂出膿，此邪客上焦，普濟消毒飲子主之。輕者名發頤腫，在兩耳前後，甘桔湯加薄荷、荊芥、鼠黏子、連翹、黃芩。

㈣頭痛脈法

寸口緊急，或短或弦或浮，皆頭痛。浮滑爲風痰，易治。短濇爲虛，難治。浮弦爲風，浮洪爲火，細或緩爲濕。

龔信古今醫鑑

㈠頭痛諸診

頭痛，陽強浮，風緊寒，風熱洪數，濕細而堅。氣虛頭痛，雖弦必濇。痰厥頭痛，腎厥堅實。又曰，寸口緊急，或短或浮或弦，皆主頭痛。

薛己醫案

㈠頭痛

久病頭痛，略感風寒便發，寒月，須重綿厚帕包裹者，此屬鬱熱本熱而標寒也。若用辛温解表之藥，暫時得效，誤認

能相害。或蔽覆其清明，或瘀塞其經絡，與氣相薄，鬱而成熱，脈滿而痛，若邪氣稽留，脈滿而氣血亂，則痛乃甚，此實痛也。寒濕所侵，眞氣虛弱，雖不相薄成熱，然邪客於脈，外則血泣脈寒，卷縮緊急，外引小絡而痛，得溫則痛止，此虛痛也。因風痛者，抽掣惡風，因熱痛者，煩心惡熱，因濕痛者，頭重而天陰轉甚，因痰痛者，昏重而欲吐不休，因寒痛者，絀急而惡寒戰慄，氣虛痛者，惡勞動，其脈大，血虛痛者，善驚惕，其脈芤。頭痛自有多因，而古方每用風藥，何也？高巔之上，惟風可到，味之薄者，陰中之陽，自地升天者也。在風寒濕者，固爲正用，卽虛與熱者，亦假引經。須知新而暴者，但名頭痛，深而久者，名爲頭風。頭風必害眼者，經〻所謂東風生於春，病在肝，目者，肝之竅，肝風動則邪害空竅也。察內外之因，分虛實之證，胸中洞然，則手到病去矣。

風濕挾熱頭痛，上壅損目及腦痛，偏正頭痛，年深不愈，並以淸空膏主之。痛甚，加細辛。

痰厥頭痛，太陰脈緩，淸空膏去羌活防風，加半夏天麻。

陽明頭痛，發熱惡熱而渴，白虎湯倍加白芷。

腎厥頭痛，卽經〻所謂下虛上實，其脈舉之則弦，按之則堅，玉眞丸，來復丹。

傷食頭痛，胸滿嚥酸，噫敗卵臭，惡食，雖發熱而身不痛，香砂枳朮丸。

傷酒頭痛，葛花解醒湯。

怒氣傷肝頭痛，沉香降氣散，蘇子降氣湯。

頭痛九竅不利，屬氣虛，補中益氣湯，加芍藥川芎細辛。

眉尖後近髮際曰魚尾，魚尾上攻頭痛，屬血虛，四物湯加薄荷。

凡勞役動作卽頭痛者，胃熱也，酒炒大黃五錢，濃茶煎服。

心頭頂痛，靑空膏加麥門冬丹參。

皆可選用。

註前證屬膀胱經，濕熱上壅，或陰火上炎，若因濕熱則病氣有餘，元氣不足，當用黃連消毒散，以除濕毒，補中益氣湯以滋化源。若因陰火則元氣病氣俱不足，當用補中益氣湯，及六味地黃丸，以滋腎水，若腎水乾涸中傳末證，急用加減八味丸，及補中益氣湯，以固根本，引火歸源。若色黯不潰，或潰而不斂，名曰腦爍，不治。大凡腫焮痛甚，宜活命飲，隔蒜灸之，解散瘀血，拔引鬱毒，但艾炷宜小而少。若欲其成膿腐潰，生肌收斂，並用托裏爲主。

㈤鬢疽

鬢疽屬肝膽二經，怒火或風熱血虛所致。若發熱作渴者，用柴胡淸肝散。腫焮痛甚者，用仙方活命飲。若大勢已退，餘毒未散，用參芪歸朮爲主，佐以川芎白芷金銀花，以速其膿，膿成仍用參芪之類托而潰之。若欲其生肌收斂，腎虛者六味丸，血虛者四物加參芪。或血燥或水不能生木者，用四物湯六味地黃丸。氣虛者，用補中益氣湯，皆當滋其化源爲善。

焮痛或發熱者，祛風淸熱。焮痛或發寒熱，或拘急者，發散表邪。作膿焮痛者，托裏消毒。膿已成作痛者，鍼之。不作膿或成膿而不潰者，並宜托裏，不斂或膿淸者，宜峻補。

方賢奇效良方

㈠頭眩

丹溪論曰：眩運分之爲二，皆由痰火爲病，以此分爲二也。眩運雖屬痰火，未嘗不由腎虛兼風邪所得，蓋痰者本流動之物，又因火動而助其愈盛，火性炎上，得風則愈熾，風火兩動，痰之愈作。經云『諸風掉眩，皆屬肝木』原病式

爲寒，殊不知因其本有鬱熱，毛竅常疎，故風寒易入，外寒束其內熱，閉逆而爲痛，辛熱之藥，雖能散其標之寒邪，然以熱濟熱，病本益深，惡寒愈甚矣。當瀉火涼血爲主，而佐以辛溫散表之劑，以從法治之，則可愈而根可除也。若有感冒發散之後，還宜調理正氣，則因其病機而補益之，庶無復作之患也。

㈡頭眩

頭目眩運，若右寸關脈浮而無力，脾肺氣虛也，用補中益氣湯。若左關尺脈數而無力，肝腎氣虛也，用六味地黃丸。若右寸尺脈浮大或微細，陽氣虛也，用八味地黃丸。血虛者四物湯加參苓白朮，氣虛者，四君子湯加當歸黃芪。肝經實熱者，柴胡清肝散。肝經虛熱者，六味地黃湯。脾氣虛弱者，補中益氣湯。脾虛有痰者，半夏白朮天麻湯。外證砭血過多者，芎歸湯。發熱惡寒者，聖愈湯。大凡發熱則眞氣傷矣，不可用苦寒藥，恐復傷脾胃也。

㈢腦疽

腫痛未作膿者，宜除濕消毒。大痛或不痛或痲木者，毒甚也，隔蒜灸之，更用解毒藥。腫痛便祕者，邪在內也，泄之。不甚痛或不作膿者，虛也，托裏爲主。膿成脹痛者，針之，更以托裏。上部脈數實而痛，宜降火。上部脈數虛而痛，宜滋陰降火爲主。尺部脈數而作渴，滋陰降火。不作膿或不潰者，托裏藥主之。膿清或不斂或多者，大補氣血。煩躁飲冷，脈實而痛者，宜瀉火。

腦疽屬膀胱經積熱，或濕毒上湧，或陰虛火熾，或腎水虧損，陰精消涸。初起腫痛甚，煩渴飲冷，脈洪數而有力，乃濕熱上湧，當用黃連消毒散，并隔蒜灸以除濕熱。漫腫微痛，渴不飲冷，脈洪數而無力，乃陰虛火熾，當用六味丸及補中益氣湯，以滋化源。若口舌乾燥，小便頻數，或淋漓作痛，乃腎水虧損，急用加減八味丸及前湯以固根本，引火歸經。若不成膿，不腐潰，陽氣虛也。四君加歸芪。不生肌，不收斂，脾氣虛也，十全大補湯。若色黯不潰，或潰而不斂，乃陰精消涸，名曰腦爍，爲不治。若攻補得宜，亦有可愈治者審焉。

陽少陰，乃濕熱頭痛也。如氣上而不下，頭痛巔疾者，下虛上實也過在足少陰巨陽甚則入腎寒濕，頭痛也如頭半寒痛者，先取手少陽陽明，後取足少陽陽明，此偏頭痛也。有眞頭痛者，甚則入連於腦，手足寒至節者，旦發夕死，夕發旦死。有厥逆頭痛者，所犯大寒，內至骨髓，髓者以腦爲主，腦逆故令頭痛齒亦痛。東垣云：「凡頭痛皆以風藥治之者，總其大體而言之也。高巔之上，惟風可到，緩藥之薄者，陰中之陽，乃自地升天者也，然亦有三陰三陽病證者。太陽頭痛，惡風，脈浮緊，川芎羌活獨活麻黃之類爲多。少陽頭痛，脈弦緩，往來寒熱，柴胡爲多。陽明頭痛，自汗發熱，惡寒，脈浮緩長實者，升麻葛根石膏白芷爲多。太陰頭痛，必有痰，體重腹痛爲痰癖，其脈沉緩，蒼朮半夏南星爲多。少陰頭痛，三陰三陽經，不流行，兩足寒氣，逆爲寒厥，其脈沉細，麻黃附子細辛爲多。厥陰頭痛，項痛吐痰，或吐涎沫，厥冷，其脈浮緩，吳茱萸湯主之。諸血虛頭痛，當歸川芎爲多。諸氣虛頭痛，人參黃芪爲多。爲多者，主治實藥也。兼見何證，以佐使藥治之，此立方大法也。氣血俱虛頭痛者，用調中益氣湯中少加川芎蔓荊子細辛，其效不可盡述。半夏白朮天麻湯，治痰厥頭痛藥也。清空膏，乃風濕熱頭痛藥也。羌活附子湯，治厥逆頭痛也。如濕氣在頭者，以苦吐之，不可執方而治。」所論頭痛大法，甚詳著矣，世之方論又言頭風病名，何以此不見發明，請言其略！凡邪令人頭痛者，其邪一也，但有新久去留之分耳。淺而近者名頭痛，其痛卒然而至，易於解散速安也。深而遠者爲頭風，其痛作止不常，愈後遇觸復發也。皆當驗其邪所從來而施治之。觀於試效方載潔古老人壯歲時，病頭痛，每發時兩頰青黃運眩，目不欲開，懶於言語，身體沉重，兀兀欲吐，食數日方過。乃曰，此太陰厥陰合而爲病，名曰風痰，以水煮金花丸，更灸俠谿二穴各二七壯，不旬日愈。以是觀之，豈非頭風乎？於此不言風者，是言經之本也，世言風者，是言經之標也，何不明少陽厥陰頭痛者，令人偏頭痛，其經肝膽風木爲邪也，後人遂以此而名頭風，可謂不求其本歟。潔古云：「夫大頭風證者，是陽明邪熱太甚，資實少陽相火而爲之也。多在少陽，或在陽明，或傳太陽，視其腫勢在何部分，隨經取之。濕熱爲腫，水盛爲痛，此邪見於頭風，在兩耳前後所主其病也。治之大不宜藥速，速則過其病，所謂上

云：『風火皆屬乎陽，多爲兼化。陽主乎動，而兩動相搏，則爲旋轉也。若人患此頭旋目眩，卒然惡心欲吐，眼花視物不的，如屋旋轉起則運倒，其病所苦何經所受而致此？曰：靜順清謐，水之化也。動亂撓擾，火之用也。腦者，地氣之所生，故藏陰於目爲瞳子，系腎水至陰所主，二者喜靜謐而惡動擾，靜謐則清明內持，動擾則掉搖散亂，故腦轉目眩，此之謂也。』靈樞經云：『五臟六腑之精氣，皆上注於目，爲之精也。筋骨氣血之精，與脈并系於目，上屬於腦，出於項中，故邪之中項者，乘其身形之虛，深則隨目系以入於腦，入於腦則腦轉，腦轉則目系急，目系急則目眩也。乃心腎不交，風火兼化而致然也。夫風者有內外之分，風從外入者，則兼化也，由內之外者，乃火之生風也。醫者，察審內傷外感之由，脈浮自汗，項強不仁爲傷風，脈緊無汗，筋攣掣痛爲感寒，脈虛煩悶者爲暑，脈沉滯吐逆者爲濕，寸脈俱沉，此爲異耳。至於七情內傷者，使臟氣不平，鬱而生涎，結而爲飲，隨氣上攻，令人頭運，眉稜骨痛，目不可開，其證婦人得之。蓋婦人性多偏怒，經曰：『天之氣曰風，人之氣曰怒，怒則致傷肝木，木動生風，令人頭目旋運，皆由此矣。』婦人本陰血主之，因產難崩漏虧損，致其陽氣無依爲眩運也。男子患此，或因金瘡吐衄便利之損，或酒醉行房勞傷精血，使氣不能歸元，而諸氣逆上，是爲頭目眩運也。學者於此，當分標本，別其盛衰，用藥施治，如鼓應桴，無不效矣。

㈡頭痛頭風大頭風

頭痛爲病，靈樞云：『厥頭痛，取足六經手少陰，眞頭痛，其腦盡痛，手足寒至節，死不治。』難經曰：『手三陽之脈，受風寒，伏留而不去，名厥頭痛，入連在腦者，名眞頭痛。』內經云：『寸口脈中手短者曰頭痛脈。』經云：『陽弦則頭痛。』又云：『寸口脈浮，中風發熱頭痛，脈緊，頭痛是傷寒。脈緊上寸口者，風頭痛。』脈訣云：『頭痛短濇應須死，浮滑風痰皆易除。』內經云：『東風生於春，病在肝，俞在頭項，故春氣者病在頭，又諸陽會於頭面，如足太陽膀胱之脈起於目內眥，上額交巔上，入絡腦，還出別下項，病衝頭痛。又足少陽膽之脈，起於目銳眥，上抵頭角，病在頭角額

傷風頭痛，脈緩而浮，或左脈微急，證兼鼻塞眼脹目赤，傷風頭痛也，宜解肌，冬月桂枝湯，餘月十味芎蘇飲
火頭痛，寸口脈洪而大，證兼口乾目赤等火證者，上焦實火也，宜清散，兼降，川芎茶調散之類，加酒芩連梔子石膏。
勢盛而脈實者，用熟大黃以瀉火也。丹溪法用酒大黃半兩，茶煎服。
食鬱頭痛，右關寸脈滑而實，證兼嘔吐惡心，心下痞悶，或寒熱如瘧，乃食鬱頭痛也。治須消導，二陳湯，加山楂厚朴枳實神麴。

痰厥頭痛，兩寸脈滑而弦，或惡心吐清水，昏重，乃痰厥頭痛也。半夏白朮天麻湯。

濕熱頭痛，脈數而濡，或兩寸脈沉伏而數，身重肢節重，或四肢面目浮腫，乃濕熱頭痛也。此多見於酒客，宜散濕解熱，二陳二朮酒芩羌獨防風之類，不已，用嗅鼻法。濕家一身盡痛，發熱面黃而喘，鼻塞，心煩，頭痛者，濕在上也，瓜蒂散內鼻中吐之。

氣虛頭痛，右脈大而無力，或按之不數，或弱或弦，或兩尺洪盛，四肢怠惰無力，飲食不思，口淡無味，乃氣虛頭痛也。四君子湯，加黃芪蔓荊子，或調中益氣湯，加蔓荊子，重者加細辛。

血虛頭痛，左脈大而無力，或濡細而數，自魚尾上攻於頭，是血虛頭痛也。四物，倍川芎，加酒芩。

脚氣頭痛，脈細而緩，或濡，肢節痛，大便祕，或吐逆，脚膝軟弱而頭痛者，屬脚氣，當從脚氣治。

陽明證額痛及眼，或兼鼻塞，脈浮而長，陽明受病也，升麻葱白白芷主之。自汗，脈洪口渴，屬陽明裏證也，白虎解毒承氣選用。三陰脈至頸胸而還，不循於頭，惟厥陰循喉嚨之後，上連目系頂巔，故有頭痛，證多嘔吐涎沫，四肢厥冷，脈多沉伏，吳茱萸湯主之。脈沉而細，足寒，氣逆，或身微熱而頭痛者，屬裏虛受寒，乃太陽脈似少陰也。麻黃附子細辛湯主之。以附子溫中，麻黃散寒，加細辛，是汗劑之重者。

熱未除,中寒復生,必傷人命。此病自外之內者是血病,況頭部分受邪,見於無形迹之部,當先緩而後急。先緩者,謂邪氣在上,著無形之分部,既著無形,無所不至,若用重劑速下,過其病難已,雖用緩藥,若急服之,或食前,或頓服,皆失緩體,則藥不能除病,當徐徐浸漬無形之邪也。或藥性味形體不離緩體是也。且急治者,謂緩劑已瀉,邪氣入於中,是到陰部,染於有形質之所,若不速去,則損陰也。此急治却爲客邪,當急去之,治客以急也。且治主病當緩者,謂陽邪在上,陰邪在下,本家病也,若急治之,不能解分而益亂也。治客以急者,謂陽分受陰邪,陰分受陽邪,此客氣急除去之也。假令少陽陽明爲邪,出於耳之前後也。陽明爲邪者,首大腫也,先以黃芩黃連甘草湯通炒煎,少少不住服,服畢不愈,用新瓦上炒鼠黏子,待香同大黃煎,去滓內芒硝,俱各等分,亦時時呷之,無令飲食在前,得微利則邪氣去。若陽明行經之藥,升麻葛根芍藥甘草太陽行經,羌活防風之類是也。又以東垣治驗其所論製方自有來矣。天之四時,民多疫癘,初覺增寒體重,次傳頭面腫盛,目不能開,上喘咽喉不利,舌乾口燥。俗云:『大頭天行,親戚不相訪問,』慮其傳染之故,得此病者五六日,醫以承氣加藍根下之,稍緩,翌日其病如故,再下之又緩,終莫能愈。潔古謂之曰:『夫身半已上,天之氣也,身半已下,地之氣也,此邪熱客於心肺之間,令人頭目頸項腫盛,以承氣下之,瀉胃中之實熱,是誅罰無過,而不知適其所至之故。』遂處方用藥,黃芩黃連味苦寒,瀉心胞熱以爲君。橘紅苦平,元參苦寒,生甘草甘寒,人參甘溫,瀉火補氣以爲臣。連翹鼠黏子薄荷味辛平,板藍根味苦寒,馬勃白殭蠶味苦平,散腫消毒以爲佐。升麻柴胡平,行少陽陽明二經,不得伸,桔梗味辛溫,爲舟楫不令下行,共爲細末,一半用白沸湯調,時時呷下,一半用蜜爲丸,噙化之,服盡良愈。如大便硬者,加酒煨大黃一錢或二錢以利之,腫勢甚者,宜砭刺之,是皆深得病機之道,詳盡立論處方,以爲後人之規焉。

張三錫醫學準繩六要

眩運上實下虛所致，所謂下虛者血與氣也，所謂上實者痰火泛[illegible]，脈弦實有力，口煩渴，壯盛之人屬實痰實火，或過飲恣口所致，宜降火化痰，酒芩梔子二陳枳桔薄荷荊芥黃芩花粉，出入不惡心，加酒煮大黃二三錢妙。

中宮濕痰，壅塞清道，因頭眩，脈必緩弱，宜平胃滲濕。

風痰眩運，頭痛惡心，吐酸水，半夏南星白附子生爲末，滴水丸桐子大，以生麪爲衣，陰乾，每服十九至二十九，薑湯下。

頭面喜暖，手按則運定，此陽虛也，大劑參芪。

痰盛氣虛，六君子加黃芪少佐炮附子煎成，入竹瀝薑汁。

天麻荊芥穗薄荷，乃消上焦風熱妙品，非治本藥也，因痰治痰，因火治火，或補氣，或補血，或滋陰，要在變而通之。

亡血家作眩，芎歸湯。胃中有死血，飲韭汁酒良。

上焦風熱作眩，脈浮數，兼頭痛眼赤作寒熱者，防風通聖散出入。

兩手脈緩大無力，飲食減而微渴，大便三四日一行，亡血人乃大虛證，參芪歸朮芍藥作大劑，濃煎下，連蘗丸三十粒，連蘗皆薑汁炒，冬加乾薑少許，更以薑汁煮糊丸。

冬月冒寒，鼓激痰涎，亦作眩運，宜從寒治，

早起眩運，須臾自定，乃胃中老痰使然，古方用黑錫丹劫之。藥用桂附沉磁黑錫蘆巴故紙茴香陽起金鈴木香大辛大熱，恐劫不開，轉增病耳，不若蒙石鎮墜之藥，徐徐取效，更愼口腹爲佳。

古方用鹿茸五錢，酒煎湯加麝少許，治元陽虛。眩運必虛而無火者宜之。

眩運悉屬虛火泛上，鼓動其痰，上潮衝動目系，故耳鳴，目系轉，覺房屋俱動是也。且腦爲髓海，腦實氣旺，火自不能

頭久痛，非火即風，膈上有痰也。濃煎茶一椀，取吐苦水出乃止，不損人，待渴自止。

平人頭痛，屬火與痰者多。

風熱在上，脈浮洪而痛者，宜天麻荊子台芎酒芩。

少陽偏頭痛，便祕者，或可下之。

瘡毒頭痛，脈弦數，曾病梅瘡而痛不止，或咽中痛，或臂膊有一塊痛，屬瘡毒，愈毒湯多服自止。

大法曰：高巔之上，惟風可到，一切痰火氣血頭痛，須加風藥，如荊芥川芎薄荷羌活白芷藁本之類，即前各加引經藥是也。

手三陽足三陽脈，皆上循於頭，故諺曰，六陽會首是也。六陰脈際頸而還，惟厥陰上入吭嗓，連目系出額，是頭病當於七經辨之。緣邪著本經，或有火，有痰，脈道不利，所以作痛，各見所部，以太陽在後，陽明在額，挾鼻與齒，少陽兩角，厥陰屬巔頂，而多吐涎，尋風尋火，或在氣，或在血，辨其虛實表裏得病情也。

㈡頭搖

頭搖屬風屬火，高年病後辛苦人多屬虛，因氣血虛而火犯上鼓動也。

㈢頭眩

眩運悉屬痰火，但分虛實多少而治。

肥人脈沉滑，屬濕痰，白朮半夏天麻湯妙。

瘦人脈弦數，乃陰虛相火上炎也，宜滋陰降火。

如兩手脈伏，面色痿黃憔悴，屬氣虛，生涎濁氣泛上，其涎亦令頭眩，恆見於鬱悒之人及婦女輩，宜舒鬱。中年之人，大病初起，元氣未復，起則眩倒，脈必緩弱，或右手寸關大而無力，宜補中益氣，倍參芪，加天麻。有痰加二陳，有火加

陽明頭痛，不惡寒反惡熱六七日不大便胃實氣攻於上也少與調胃承氣湯
少陽頭痛，脈弦，發熱，小柴胡湯。
頭痛發熱，心煩，梔子黃芩湯。
天行勞復頭痛四肢痛葱頭湯。

㈡頭眩

頭眩者，少陽半表裏之間，表邪傳裏，表中陽虛，故頭眩。又有汗下後而眩冒者，亦陽虛所致。少陰下利，止時頭眩，時時自冒，此虛極而脫也。太陽病若下之，因復發汗，以此表裏俱虛，其人必冒，冒家汗自出而愈。陽明病頭眩不惡寒，能食而欬，甘草乾薑茯苓白朮湯。少陽證目眩，小柴胡湯。太陽病發汗後，汗出不解，心下悸，頭眩身瞤，筋惕振振欲擗地者，眞武湯。吐汗下後虛而脈沉數，心下痞，脅下動氣衝咽喉，不得息，身振搖，筋肉惕，久則成痿，茯苓桂枝白朮甘草湯是也。風家亦有眩者，風主運動故也。其或諸逆發汗，劇者言亂目眩而死也。

發汗過多，或虛弱人微發汗，或傷風自汗，妄用大青龍湯，便有厥逆筋惕肉瞤之證，並屬眞武湯，羸者去芍藥，有熱者去附子，應發汗而腹中左右有動氣者，並不可汗，汗之則筋惕肉瞤。或頭眩汗出不止，其後最逆，先宜防風白朮牡蠣湯，次服小建中湯十救一二。吐下之後，心下逆滿，氣上衝胷，起則頭眩，脈沉緊，身振搖者，茯苓桂枝白朮甘草湯；久而成痿者，通用。心下痞滿者，枳桔湯加茯苓甘草。

上升，所以少年無運病也。亦有稟賦怯弱而有此者，又不可以常理論。丹溪曰：眩運乃中風之漸，中年之後，大病之餘，必加補養，斷酒色，方保無虞。產後血運，亦屬虛，肥白者補氣，黑者補血，各加童便薑汁竹瀝，以降泛上虛火也。忌涼劑。

㊃雷頭風

頭痛腫起核塊，或作赤腫，或作寒熱拘急，皆風熱挾火炎上所致。雷屬相火，故名。古方用升麻蒼朮，加荷葉，名升麻湯，莫若荊防敗毒散為便。

陶華六書

㊀頭痛

頭痛者，寒邪入足太陽經，上攻於頭，此表證也。頭痛脈浮緊無汗，惡寒，可發汗。頭痛脈浮緩有汗，惡寒，宜解肌，照前時令用藥。陽明病不惡寒，反惡熱，五六日不大便，胃實燥渴，熱氣上攻於頭目，脈實者，調胃承氣下之。少陽頭痛者，小柴胡和之。濕家鼻塞頭重者，瓜蔕散搐鼻，黃水出即愈。痰涎頭痛，胸滿寒熱者，瓜蔕散吐之。厥陰乾嘔吐涎沫頭痛者，吳茱萸湯主之。三陽雖有頭疼，不若太陽專主也。三陰無頭痛，惟厥陰有頭痛者，是脈系絡於頂巓也。若痛連於腦，手足俱青，為眞頭痛，必死矣。

大凡頭痛屬三陽，乃邪氣上攻也。太陽專主頭痛，陽明少陽亦有之。三陰絡上不過頭，惟厥陰循喉嚨之後，上連目系頂巓，故有頭痛乾嘔吐涎沫之證，却無身熱，亦與陽證不同。雖然，風濕在少陰，濕溫在太陰，其經從足走至胸中而還，及頭痛過於陰毒，是又不可拘也。若兩感於寒，太陽少陰俱病，則頭痛口乾，煩滿而渴，與夫頭痛極甚，又連於胸，手足寒者，則為眞頭痛，不可治矣。

醫部彙考一百二十四

頭門三

明王肯堂證治準繩

㈠頭痛總論

醫書多分頭痛頭風爲二門,然一病也,但有新久去留之分耳。淺而近者名頭痛,其痛卒然而至,易於解散速安也。深而遠者爲頭風,其痛作止不常,愈後遇觸復發也。皆當驗其邪所從來而治之。世俗治頭痛,不從風則從寒,安知其有不一之邪乎?試考內經論頭痛所因以明之;如風從外入,振寒汗出,頭痛。新沐中風爲首風,當先風一日頭痛,不可以出內。大寒內至骨髓,髓以腦爲主,腦逆故頭痛齒亦痛。少陽司天之政,初之氣風勝乃搖,候乃大溫,其病氣怫於上,頭痛。二之氣,火反鬱,白埃四起,其病熱鬱於上,頭痛。少陽司天,火淫所勝,民病頭痛發熱惡寒如瘧,歲金不及,炎火乃行,復則陰厥且格,陽反上行,頭腦戶痛,延及腦頂發熱。太陽之勝,熱反上行,頭項頂巔腦戶中痛,目如脫。太陽之復,心痛痞滿頭痛。太陰司天,濕淫所勝,腰脊頭項痛,時眩。太陰在泉,濕淫所勝,病衝頭痛,目似脫,項似拔。太陰之復,頭頂痛重而掉瘛尤甚。陽明之復,欬噦煩心,病在膈中頭痛。傷寒一日,巨陽受之,頭項痛腰脊強。靈樞謂風痹股脛爍足如履冰,時如入湯,煩心頭痛,時眩,悲恐短氣,不出三年死。凡此皆六

頭旋眼黑頭痛……

熱厥頭痛，雖嚴寒猶喜風寒，微來暖處或見煙火，其痛復作，宜清上瀉火湯，後用補氣湯。

風熱頭疼，石膏散，荊芥散。

冬月大寒犯腦，令人腦痛，齒亦痛，名曰厥逆，出奇病論中，宜羌活附子湯。

頭痛，胷中痛，食減少，咽嗌不利，寒冷，脈左寸弦急，宜麻黃吳茱萸湯。

濕熱在頭而頭痛者，必以苦吐之，輕者用透頂散，嗃鼻取涎。

新沐中風爲首風，頭面多汗惡風，當先風一日則病甚，至其風日則少愈，大川芎丸主之。

風氣循風府而上，則爲腦風，項背怯寒，腦戶極冷，神聖散主之。

凡治頭痛，皆用芎芷羌防等辛溫氣藥升散者，由風木虛不能升散，而土寡於畏，得以壅塞而痛，故用此助肝木，散其壅塞也。若風盛疎散太過而痛，服辛散藥反甚者，則宜用酸澀收而降之乃愈，乳香盞落散之類是也。

血虛頭痛，自魚尾上攻頭痛，當歸川芎主之，當歸一兩，酒一升，煮取六合，飲至醉效。

當歸川芎連翹熟苄各二錢，水煎去查，入龍腦薄荷末二錢，乘沸泡之，鼻吸其氣，候溫即服，服即安臥，效。

氣血俱虛頭痛者，於調中益氣湯加川芎蔓荊子細辛，其效如神。

痰厥頭痛，眼黑頭旋，惡心煩亂，半夏白朮天麻湯主之。痰厥頭痛非半夏不能療，眼黑頭旋，風虛內作，非天麻不能解。天麻苗謂之定風草，獨不爲風所搖，以治內風之神藥。內風者虛風是也。黃芪甘溫瀉火補元氣，實表虛止自汗。人參甘溫調中補氣瀉火。二朮甘溫除濕補中益氣。澤瀉茯苓利小便導濕。橘皮苦溫益氣調中而升陽，炒麴消食，蕩胃中滯氣，麥芽寬中助胃氣，乾薑辛熱以滌中寒，黃蘗苦寒用酒洗以療冬日少火在泉而發躁也。

鼻鼽腹腫頭痛，病在胃。經云：陽明所謂客孫脈則頭痛鼻鼽腹腫者，陽明并於上，上者則其孫絡太陰也，故頭痛鼻

氣相侵，與淸陽之眞氣相薄而痛者也。至於頭痛甚則腦盡痛，手足寒至節死。頭痛巔病，下虛上實，注以腎虛不能引膀胱之氣故爾。心煩頭痛，耳鳴九竅不利，腸胃之所生。心熱病者卒心痛煩悶，頭痛面赤，刺手少陰太陽，肺熱病者，頭痛不堪，汗出而寒，刺手太陰陽明，腎熱病者項痛員員澹澹然，刺足少陰太陽，靈樞謂厥頭痛面若腫起而煩心，取足陽明太陰厥頭痛頭脈痛，心悲善泣，取血與厥陰，厥頭痛貞貞頭重而痛，取手足少陰，厥頭痛意善忘按之不得，取頭面左右動脈後取足太陰，厥頭痛項先痛腰脊為應，先取天柱後取足太陽，厥頭痛頭痛甚耳前後脈湧有熱，瀉出其血後，取足少陽。頭痛不可取於腧者，有所擊墮惡血在於內，若肉傷痛未已，可側取不可遠取也。頭痛不可刺者，大痹為惡，日作者可令少愈，不可已，頭半寒痛，先取手少陽陽明，後取足少陽陽明，膀胱足太陽所生病頭顖頂腦戶中痛，膽足少陽所生病頭痛，凡此皆臟腑經脈之氣逆，上亂於頭之淸道，致其不得運行，壅遏經隧而痛者也。蓋頭象天，三陽六腑淸陽之氣皆會於此，三陰五臟精華之血亦皆注於此，於是天氣所發六淫之邪，人氣所變五賊之逆，皆能相害，或蔽覆其聰明，或瘀塞其經絡，因與其氣相薄，鬱而成熱則脈滿，滿則痛，若邪氣稽留，則脈亦滿而氣血亂，故痛甚，是痛皆為實也。若寒濕所侵，雖眞氣虛不與相薄成熱，然其邪客於脈，外則血泣脈寒，寒則脈縮卷緊急，外引小絡而痛，得溫則痛止，是痛為虛也。如因風木痛者，則抽掣惡風，或有汗而痛；因暑熱痛者，或有汗或無汗，則皆惡熱而痛；因濕而痛者，則頭重而痛，遇天陰尤甚；因痰飲而痛者，亦頭昏重而痛，憒憒欲吐；因寒而痛者，絀急惡寒而痛，各與本臟所屬風寒濕熱之氣兼為之狀而痛，更有氣虛而痛者，遇勞則痛甚，其脈大；有血虛而痛者，善驚惕，其脈芤，用是病形分之，更兼所見證察之，無不得之矣。

三陽頭痛藥，羌活、防風、荊芥、升麻、葛根、白芷、柴胡、川芎、芍藥、細辛、連鬚葱白。

陰證頭痛，只用溫中藥，如理中、薑附之類。

風濕熱頭痛，上壅損目及腦痛，偏正頭痛，年深不愈，並以淸空膏主之，如苦頭痛，每料中加細辛二錢。如太陰脈緩

頭上赤腫，結核或如酸棗狀，鍼刺出血則愈。亦有因痰火者，痰生熱，熱生風故也。痰火上升，壅於氣道，兼乎風化，則自然有聲，輕如蟬鳴，重如雷聲，故名雷頭風也。用半夏牙皂薑汁煮一兩，大黃酒浸透，濕紙包煨，再浸再煨三次，二兩，白殭蠶連翹橘紅桔梗天麻各五錢，片芩酒炒七錢，薄荷葉三錢，白芷青蒙石粉草各一錢，末之，水浸蒸餅爲丸，如菉豆大，食後臨臥茶吞二錢，以痰利爲度，然後用清痰降火煎藥調理。

㊂眞頭痛

天門眞痛，上引泥丸，夕發旦死，旦發夕死。蓋腦爲髓海，眞氣之所聚，卒不受邪，受邪則死不可治。古方云，與黑錫丹，灸百會，猛進參沉烏附，或可生。然天柱折者，亦難爲力矣。

㊃大頭病

頭腫大如斗是也。是天行時疫病也。東垣監濟源稅時，長夏多疫癘，初覺憎寒體重，次傳面目腫盛，目不能開，上喘，咽喉不利，舌乾口燥，俗云大頭天行，遂處方用黃連黃芩，味苦寒，瀉心肺間熱以爲君；橘紅元參苦寒，生甘草甘寒，瀉火補氣以爲臣；連翹鼠黏子薄荷葉，苦辛平，板藍根味甘寒，馬屁勃白殭蠶味苦平，散腫消毒定喘以爲佐；升麻柴胡苦平，行少陽陽明二經不伸之氣，桔梗味辛溫爲舟楫不令下行，共爲細末，用湯調時時服之，拌蜜爲丸，噙化服盡良愈。乃施其方全活甚衆，名普濟消毒飲子。或黑白散甘桔湯加鼠黏子連翹大黃元明粉白殭蠶荆芥。

㊄頭風屑

羅謙甫云：『肝經風盛，木自搖動，』尚書云：『滿招損，』老子云：『物壯則老，』故木陵脾土，金來剋之，是子來爲母復仇也。使梳頭有雪皮見，肺之證也。肺主皮毛，大便實，瀉青丸主之，虛者人參消風散主之。

萬病紫苑丸，治頭多白屑，每服三丸至五七丸，薑湯下。

按上治法，必有風熱上攻頭目眩痛諸證而後用之。若止是白屑，但宜白芷零陵香之屬外治而已。

觔腹腫也。

動作頭重痛熱氣潮者，屬胃。丹溪云：頭痛如破，酒炒大黃半兩，茶煎服。婁全善云：病在胃而頭痛者，必下之方愈也。如孫兆以利膈藥下張學士傷食頭痛，郭茂恂以黑龍丹下其嫂產後汚血頭痛，皆下咽卽安是也。

心煩頭痛，病在膈中，過在手巨陽少陰，東垣清空膏之類治之。

頭痛巓疾，下虛上實，過在足少陰巨陽，甚則入腎，許學士謂之腎厥頭痛也。其脈舉之則弦，按之則堅，用玉眞丸治之。戴復菴用正元散或大三五七散，入鹽煎服。或於正元散內，入炒椒十五粒，下來復丹，間進黑錫丹。有服諸藥不效，其痛愈甚，宜茸硃丹。

素問曰：頭痛巓疾，下虛上實，過在足少陰巨陽，甚則入腎，徇蒙招尤，目眩耳聾，下實上虛，過在足少陽厥陰，甚則入肝。下虛者，腎虛也，故腎虛則頭痛。上虛者，肝虛也，故肝虛則頭運。徇蒙者，如以物蒙其首，招搖不定，目眩耳聾，皆運之狀也。故肝厥頭運，腎厥巓痛，不同如此。肝厥宜鉤藤散。

傷食頭痛，胷膈痞塞，嚥酸噫敗卵臭，畏食，雖發熱而身不痛，宜治中湯，加砂仁一錢，或紅丸子。

傷酒頭痛，惡心嘔吐，出宿酒，昏冒眩運，宜葛花解醒湯。

怒氣傷肝，及肝氣不順，上衝於腦，令人頭痛，宜沉香降氣散，幷蘇子降氣湯，下養正丹。

上熱頭目赤腫而痛，胷膈煩悶，不得安臥，身半已下皆寒，足胻尤甚，大便微祕，宜既濟解毒湯。

外有臭毒頭痛，喫一味炒香附愈。

頭痛連睛痛，石膏鼠黏子炒爲末，茶清，食前調下。

頭風，搐鼻白芷散，川芎散，如金散，瓜蔕神妙散，火筒散，鬱金散。

氣之精與脈，幷爲目系，上屬於腦，後出於項中。故邪中於項，因逢其身之虛，其入深，則隨眼系以入於腦，入於腦則腦轉，腦轉則引目系急，目系急則目眩以轉矣。所謂邪者，風寒濕熱內外之諸邪也。然諸邪盡謂以火之所成。眩者何內經謂諸風掉眩，皆屬肝木者，是專言風邪矣。原病式釋之曰：風火皆屬陽，多爲兼化，陽主乎動，兩動相搏，則頭目爲之眩運而旋轉。火本動也，焰得風則自然旋轉，於是乎掉眩掉搖也。眩，昏亂旋運也，此非風邪之因火所成者歟？然風有內外，外入者兼火化者，則如是；若內發者，尤是因火所生之風也。及諸篇中考之，有謂厥陰司天客勝，耳鳴掉眩，厥陰之勝者亦然。此司天之氣，從上受者，外入者也。又謂發生之紀，與歲木運太過，皆掉眩巔疾，善怒，肝肺太過，善忘，忽忽冒眩巔疾，又徇蒙招尤，過在足少陽厥陰者，言目瞤動蒙昧也。巢氏亦謂脅下痛，頭眩者，肝實也，此或得於肝臟應天氣者所動，或因本臟虛實之氣自動，皆名之爲風，非火之烈焰，何能上於巔也？至於木鬱之發，甚則耳鳴眩轉，目不識人，善暴僵仆者，尤是肝木中火發之甚也。此天氣內應於臟，與肝虛實之氣動者，是皆名內發之風者也。又謂太陽之勝，熱反上行，頭項頂腦中痛，目如脫，註文謂寒氣凌逼，陽不勝之，太陽之氣，標在於巔，入絡於腦，故病如是。謂太陽司天，善悲，時眩仆，靈樞謂邪在心者，病亦同，二者皆是邪逼於心下，致神志不安，則悲，心火不行則妄動上炎。謂太陰之復，陰氣上厥，飲發於中，頭項胸痛而掉瘛尤甚，註文謂濕氣內逆，寒氣不行，太陽上留，故爲是病。謂太陰在泉，病衝頭痛，目似脫，註文云：亦是足太陽病也。謂太陰司天，頭項痛，善眩，靈樞謂邪在腎，頸項時眩，此皆濕邪害腎，逼太陽之氣，留於上而然也。至於金匱要略謂心下有支飲，其人苦冒眩者，亦是格其心火不行而上衝也。謂尺脈浮爲傷腎，趺陽脈緊爲傷脾，風寒相搏，食穀即眩，謂陽明脈遲，食難用飽，飽則發煩頭眩，二者因脾胃虛而陽氣不足，所以外見遲緊之脈，內受濕飲之鬱，而不足之微陽，始與所鬱之熱，幷而衝上於頭目也。用此比類言之，則眩運之病，非一邪而可終。若夫太乙天眞元氣，皆得胃脘之陽，以行於周身，分三陰三陽之經脈，

㈥頭重

頭重何因得之？曰：因天之濕淫外著也。因人之濕痰上蒸也。因在下之陰氣逆於上也。皆得而頭重。何以言之？頭象於天，其氣極清，地氣重濁，地者陰也，土濕也，若外著內蒸，必壅蔽清道，致氣血不利，沉滯於經隧脈絡，故重。內經曰：『陽氣者，因於濕，首如裹』是外濕蔽著者也。又曰：『脾熱病者先頭重』是胃脈引其熱上於頭也。

㈦頭搖

頭搖，風也，火也。二者皆主動，會之於巔，乃為搖也。內經曰：『徇蒙招尤，目瞑耳聾，下實上虛，過在足少陽厥陰，』註：謂徇疾也，蒙目不明，招掉搖不定也，尤甚也。目疾不明，首掉尤甚。又『太陰之復，頭項痛重，掉瘛尤甚，』註：謂濕氣內逆，太陽上留胷中而掉瘛也。靈樞謂督脈之別，長強虛則頭重高搖之。然病機有謂諸風掉眩，皆屬肝木，夫頭之巔，足太陽之所過，督脈與厥陰之所會，是故三經所逆之火留聚於此者，皆從風木而為掉搖也。張仲景又言心絕者，亦直視搖頭也。

㈧頭痛脈法

浮緊為太陽，弦細少陽，浮緩長陽明，沉緩太陰，沉細少陰，浮緩厥陰，浮弦為風，浮洪為火，右寸滑或大或弦有力皆痰火積熱，細或緩兼體重者濕。左脈不足血虛，右脈不足氣虛，左右俱不足氣血俱虛。右寸緊盛食積，右關洪大為胃熱上攻，寸口弦細為鬲上有風涎冷痰或嘔吐。沉細為陰毒傷寒，但頭痛身不熱也。病苦頭疼目痛，脈急短濇者死。

㈨眩運

眩，謂眼黑眩也。運如運轉之運，世謂之頭旋是也。

內經論眩皆屬肝木屬上虛，丹溪論眩主於補虛治痰降火，仲景治眩，亦以痰飲為先也。

七情相干，眩運欲倒，用十四友丸、安腎丸二藥夾和，以和七氣湯送，[illegible]

有氣虛者，乃清氣不能上升，或汗多亡陽所致，當升陽補氣，黃芪、人參、白朮、川芎、當歸、甘菊花、柴胡、升麻之類。直指方云：淫欲過度，腎家不能納氣歸元，使諸氣逆奔而上，此眩運出於氣虛也，宜益氣補腎湯。

有血虛者，乃因亡血過多，陽無所附而然，當益氣補血芎歸湯之類。

中脘伏痰，嘔逆眩運，旋覆花湯主之。金匱方：卒嘔吐，心下痞，膈間有水，眩悸者，半夏加茯苓湯主之。假令瘦人臍下有悸，吐涎沫而頭眩，此水也，五苓散主之。又云：心下有支飲，其人苦冒眩，澤瀉白朮湯主之。澤瀉五兩，白朮二兩，水二升，煮一升，分溫再服。支飲之證，短氣倚息，形如腫是也。痰閉不出者吐之。

青黛散嗃鼻取涎，治眩神效。

頭風眩運，可用獨聖散吐之，吐訖，可用清上辛涼之藥，防風通聖散，加半夏等味。仲景云：此痰結胷中而致也。

大小便結滯者，微利之，河間搜風丸。

體虛有寒者，溫之，仲景云：風虛頭重眩，苦極不知食味，暖肌補中益精氣，白朮附子湯主之。

肝厥狀如癇疾不醒，嘔吐，醒後頭虛運發熱，用麻黃鉤藤皮石膏乾葛半夏麴柴胡甘草枳殼甘菊爲麤末，每服四錢，水一鍾半，生薑三片，棗一枚，同煎至八分，去查溫服。

㈢百會疽

或問百會穴生疽何如？曰：此名玉頂發，初如麥米，頓增痛楚，寒熱大作，由虛陽浮泛，宜以鹽湯下八味丸，引火歸源，甚則黑錫丹。或元氣素厚，六陽經受風邪，風火相扇，臟腑熱毒上攻而然者，宜黃連消毒飲，兼玉樞丹，勝金丹，更以附子切片，置湧泉穴，灸五壯，以洩其毒。七日無膿者死。

㈡頂門癰

六氣應天之陰陽，運行於表者，謂之六化，布五行於五臟屬之氣，應地之陰陽，運行於裏者，謂之五陽。雖然，表裏固分爲二，及乎一經合一臟相通氣而行，則表裏必似二而一，一而二者也，悉如其天之有德有化有用有變於氣交者，備在身形之中。經曰：『成敗倚伏，皆生於動，動之淸靜則生化治，動之躁亂則苛疾起。』自此言之，掉眩由人氣所動者，豈止如金匱所云濕飲而已？若此五陽六化妄動而病者，又可勝數哉！且夫凡有過節，即隨其所動經臟之氣而妄起，因名曰厥陽之火，厥陽之火有五，謂之五邪，五邪之變，遂勝剋之病作。又或腎水不足，或精血傷敗，不能制其五陽之火獨光，或中土虛衰，不能隄防下氣之逆，則龍雷之火，得以震動於巔。諸火上至於頭，重則搏擊爲痛，輕，則旋轉爲眩運矣。夫如是比類之道，在經有之，諸治病循法守度，援物比類，化之冥冥，循上及下，何必守經，不引比類，是知不明也，其此之謂歟？或曰：治諸邪當何如？曰：夫火因動而起，但各從其所動之因而治之，因實熱而動者，治其熱，因邪搏擊而動者，治其邪，因厥逆逼上者，下治所厥之邪，因陰虛而起者，補其陰，抑其陽，按而收之，因陽虛而氣浮上者，則補其陽，斂其浮游之氣，因五志而動者，各安其臟氣以平之，因鬱而發者，治其所鬱之邪，開之發之，因精血不足者，補之不已，則求其屬以衰之，因勝剋而動者，從勝衰之氣而補瀉之，中氣虛衰而動者，補其土以安之，上焦淸明之氣虛，不能主持而動者，亦當補中焦之穀氣，推而揚之，因五臟六腑上注之精氣不足而動者，察其何者之虛而補之。如是雖不專治其火，而火自息矣。凡治百病之由火而生者皆然，非唯掉眩而已。嚴氏云：外感六淫，內傷七情，皆能眩運，當以脈證辨之。

風則脈浮有汗，項強不仁，局方消風散，本事川芎散，羚羊角散，都梁丸，青州白丸子。

寒則脈緊無汗，筋攣掣痛，不換金正氣散加芎芷白芍藥，甚則薑附湯，濟生三五七散。

暑則脈洪大而虛，自汗煩悶，黃連香薷飲，十味香薷飲，消暑丸。

……除濕湯，滲濕湯，濟生芎朮散。

陳實功外科正宗

㈠頭痛

頭痛者，風火濕痰四者皆能致之。又楊梅瘡毒上攻，亦有此證。或婦人產後，梳洗當風太早亦致之，名曰頭風。宜用天麻餅子三聖散二方。毋論病之新久受之眞似並效。

㈡腦疽論

夫腦疽者，俗稱對口是也。但所發不同，其源有二：得於濕熱交蒸，從外感受者輕；五臟蘊結，從內發外者重。其理何也？濕熱之爲病，天行氣候，寒暑不調，節序溫涼，陰陽失度，凡有體虛者，易於侵襲項後，雖屬督脈，又主太陽寒水司行之道，所有侵襲氣血必凝，凝則後必爲腫，此從外感受者，其患初起有頭，多生正穴，三四日間，多作焮痛，始生寒熱，口和而乾，色紅根活，瘡勢漸高，形不散大，時止時疼，易膿易腐，飲食知味，起坐尋常，外勢雖可畏，而內無七惡之證相干，此屬陽證，其由從外來矣，故多不治可愈。所有五臟蘊結而成者重，其源有五：蓋心主血，故心緒煩擾，煽動不甯，以致火旺而沸騰，行於項間，與寒水交滯而爲腫者，一也。肝統筋，故惱怒傷肝，項乃三陽統筋之所，肝傷則血脈不潮，筋無榮養，凝結爲腫，故項緊急強痛，不能轉側，其患未潰前肉色紫暗，堅硬漫腫，破流血水，木痛無膿，此等之證，皆肝氣受傷者，二也。脾主肌肉，故思慮傷脾，脾氣日損，又或膏粱損胃，胃汁乾枯，以致中脘否塞，氣不運行，逆於肉裏，乃生壅腫，其患外皮雖腐而內堅不潰，口燥舌乾，飲食不進，根腳走散，膿穢色敗，此等之證，皆脾氣受傷者，三也。肺主皮毛，故憂鬱傷肺，肺傷則毛竅閉塞，腠理不通，氣不舒暢，縱橫經絡，結而爲腫，其形瘡多平陷，色淡不華，皮腐脂流，形如湯潑，氣粗短促，面黴鼻掀，碌碌生痰，般般發嗽，此等之證，皆肺氣受傷者，四也。腎主骨髓，故恣慾傷腎，腎傷則眞陰之氣敗矣，眞陰一敗，相火自生，此火最能自升自降，或動或靜，煎熬臟腑，消鑠津液，更變形容，改換

或問頂門生癰何如？曰：此屬太陽經風熱所致，一名佛頂疽，穴名上星，由臟腑陰陽不調，熱毒上壅而成。宜服活命飲，加芩連梔子藁本清熱之劑，及紫金丹烏金散奪命丹汗之。虛者十全大補湯加羌活，稍遲潰爛黑陷惡證，多脈大，神昏，二便閉結者不治。

㊁額疽

或問當額生疽何如？曰：此屬陽明胃積熱，宜服活命飲，加升麻桔梗羌活水酒煎服。壯實者，一粒金丹下之。老弱者，十全大補湯，或十宣散黃芪內托散托之。過時潰爛腦髓出者死。

㊂太陽疽

或問兩太陽生疽何如？曰：此名勇疽，亦名腦發疽，屬足陽明胃經，狀如伏鼠，寒熱併作，面目浮腫，宜活命飲，加升麻桔梗烏金散，十一日刺得黃白膿者生；清稀黑血者，及潰爛透腦者，死。

㊃鬢毛瘡廣瘡

或問頭上生瘡，狀如葡萄，痛甚久而無膿，何如？曰：名鬢毛瘡，治法與癩頭瘡同，必須詳驗其瘡，若中陷而四畔高起，色如黃蠟者，廣瘡也。

㊄赤色疽

鬼遺云：赤色疽發頭額及腦前，并手掌中，十日不穴者死，七日可刺出赤血，七日未有膿，不可治也，不穴者，不作穴而東攻西擊也。

㊅癰疽頭痛頭眩用托裏消毒散加減法

初腫頭痛發熱，邪在表也，加川芎羌活。若外邪在表，而元氣實者，暫用人參敗毒散。　頭痛惡寒，表虛也，去金銀花[illegible]，加柴胡升麻，如不應，暫用補中益氣湯，加蔓荊子。　日晡頭痛

夫鬢疽者乃手少陽三焦，相火妄動，又兼腎水不能制火。或外受風熱所感，但此經多氣少血，肌肉相薄，凡有患此，最難腐潰，此皆起於情性急暴，房慾血虛，火動肝氣，凝結而成。疽之初起，寒熱交作，頭眩痛徹太陽，甚則耳目連鬢通腫，治法不可妄用鍼灸，必分陰陽表裏，邪正虛實治之，庶不有悞。且如初見瘡時，多寒少熱，口乾作渴，好飲熱湯，六脈虛數無力，又兼患上堅硬，多不焮痛，無潰無膿，瘡根流散，此等之證，乃正氣虛而邪氣實也。治以托裏爲主，消毒佐之，如清肝養血湯，托裏消毒散之類是也。又見證時，熱多寒少，頭眩作痛，口燥舌乾，渴欲飲冷，二便祕澀，六脈沉實有力，瘡亦焮腫疼痛，發熱，易腐易膿，根脚不開，腫焮在外，此乃正氣實而邪氣虛也。治以消毒爲主，托裏佐之，如梔子清肝湯，鼠黏子湯之類是也。大抵正氣勝則實，邪氣勝則虛，必然一勝則一負，邪正不並立，欲其虛而不待損而自虛矣。又有未見瘡時，先作渴證，或一年半載，日久日重，然後發爲鬢疽，其形色多紫黑，瘡多平陷，堅硬無膿，毒流耳項，又兼氣味不止，形容不澤，精神不明，飲食不進者，俱爲不治。

㈥鬢疽看法

初起無口乾寒熱，飲食有味，舉止尋常，發瘡者，順。已成瘡頭腫起，根脚不散，形色紅活，掀痛潰膿者，順。已潰膿稠色鮮紅活，腫消痛止，項便頭輕，口和者，順。潰後瘀肉易腐，新肉易生，瘡口易平，飲食有味者，順。初起瘡頭如粟，頂軟不高，色紫根散，木痛，食少者，逆。已成瘡形紫黑，軟陷無膿，足冷身涼，便利脈虛者，逆。已潰膿水清稀，多生臭穢，壞肉不腐，新肉不生者，逆。潰後飲食厭餐，發熱口乾，不眠，肉削皮麤者，逆。

㈦鬢疽治法

初起焮腫堅硬，內熱口乾，脈數有力，邪實也，當利之。已成增寒壯熱，四肢拘急，脈浮者，邪在表也，宜散之。赤腫作痛，血凝滯也，散血清肝，色黯漫腫，升陽助胃。已潰堅腫不退，脈細而數，日晡發熱者，宜滋陰健脾。肝膽怒火上攻，心煩作躁，腮頦紅熱者，宜抑陰降火。已潰膿清腫痛猶甚，虛煩食少者，宜養氣血健脾胃。潰後氣血俱虛，身涼脈細，大便

聲音，瘡形紫黑，脈數乖度，煩躁口乾，隨飲隨渴，此等之證，皆腎氣受傷者，五也。凡治此證，必內分虛實，外辨陰陽，體順天時，察其病理，七日以前，瘡勢未成者，當通竅以汗發之，七日以後，病勢已成，治當兼補以托之，此則毒不內攻，必無變證，如藥攻利太過，元氣受傷，毒多難出，又敷圍涼藥，氣血冰凝，則肌肉多死，反難腐潰。予常治此及諸發背初起未成者，用披鍼當頂點入，知痛處出其惡血，通其瘡竅，隨插蟾酥條直至瘡底，外用膏蓋，內服萬靈丹，或蟾酥丸，發其大汗，解散內蘊之毒。次日患上，或腫或不腫，或痛或不痛，仍插仍貼，直至患頂腫高，根脚突起，四圍裂縫，有膿方住。插藥輕淺者，九日後吐出病根，堅硬不化之物，毒甚者，不能頓然脫落，亦可漸腐成膿，爲轉重就輕之良法。外用玉紅膏長肉，內服補托收斂，其患不久自愈。如陽證輕淺者，候自腐潰，不用前法鍼刺。如不腫不疼，灸亦不痛，陰證，尤當速用，不必遲延，此爲移深居淺之大法也。

(三)腦疽看法

初起頂高根活，色紅皮薄，作疼焮熱，腫不開散者順。已成無論偏正，瘡形獻起，疼痛發熱，易腐易膿者順。已潰膿稠肉色紅活，瘀腐易脫，焮腫漸消，痛減者順。潰後腐脫，新肉便生，瘡口漸斂，凝結癡膿，作痒者順。初生一點黃泡，或似疙瘩，不腫不疼，自不知覺者逆。已成不發高腫，亦不焮痛，瘡頂軟陷，根脚平散者逆。已潰膿清，肉色紫黑，外皮不腐，內生臭穢，不食者逆。腐肉雖盡，新肉不生，瘡口散大，軟陷無神，色敗者逆。

(四)腦疽治法

初起有頭或無頭，大痛或不痛，俱隔蒜灸，兼服解毒。已成堅硬，發熱焮痛，口乾便祕者，邪在內也，宜泄之。堅腫不痛，發熱惡寒，頭疼四肢拘急者，兼發表攻裏。腫硬日深，形色紫黑，外皮不腐，內膿不潰，宜行拔法。腫強頭面焮熱，口燥惡心嘔吐者，邪在上也，宜清之。焮熱腫痛，紅色光亮，疼苦有時，內膿脹痛者，急開之。將潰不潰，微熱微紅，不作腐潰，皆由胃虛也，宜補之。潰後腐肉不脫，膿水清稀，腫痛乃作者，當大養氣血。大便多溏，小便短濇，自汗食少，脈細身涼，

於陰而足寒，內經原有上者下之之法，邪從下而上，必驅之使從下出，一定之理也。其證輕者，裏無別病，但嗜其黃水，從清陽之鼻竅而下出，則其重而裏多危證者，必驅其黃水，從前後二陰之竅而出，所可意會也。金匱於本文之下，增若發其汗者二十四字，垂戒初不以下爲戒，又可意會也。但下法之難，不推其所以不可汗之故，卽不得其所以用下之權。仲景以其頭搖口噤背張，幾幾陽之欲亡。若更發其汗，重虛衞外之陽，惡寒必轉甚，若發汗已，其脈如蛇，眞陽脫離，頃刻死矣。由是推之，濕上甚爲熱之重者，非用下法，難以更生，而下法必以溫藥下之，庶幾濕去而陽不隨之俱去耳。此非無徵之言也。仲景卽於本篇申一義云，下之額上汗出，微喘，小便利者死。豈非因下而奪其陽之大戒乎？

(二)頭眩

諸風掉眩，皆屬於肝，若木勝則四肢強直而爲掉，風動於上而爲眩，脾土受邪，肝之實也。若木衰則血不養筋而爲掉，氣虛於上而爲眩，金邪乘木，肝之虛也。因誤汗致心悸頭眩，身瞤動無可奈何者，用眞武湯爲救法。夫汗雖出而熱不退，則邪未盡而正已大傷，況裏虛爲悸，上虛爲眩，經虛爲瞤，身振振搖，無往而非亡陽之象，所以行眞武把關坐鎮之法也。

少陰病，下利止而頭眩，時時自冒者，死。蓋陽回利止則生，若利止更加眩冒，則其止也，乃陰已先亡，故陽無依附，浮越於上，而神氣散亂，時時自冒也。

(三)額黑

女勞疸額上黑，謂身黃加以額黑也。黑爲北方陰晦之色，加於南方離明之位，此必先有胃熱脾寒之濁氣，下流入腎，益以女勞無度而後成，其由來非一日。肘後謂因交接入水所致，或有所驗，然火炎薪燼，額色轉黑，雖不入水，其能免乎？故脾中之濁氣下趨入腎，水土互顯之色，但於黃中見黑滯耳。若相火從水中上炎而合於心之君火，其勢

多溏者，宜峻補溫中。潰後不斂，新肉生遲，瘡口淡白，膿水不止，健中補脾。

㈧蟮拱頭

蟮拱頭，俗名腦猪是也。患小而稟受悠遠，皆父精母血蓄毒而成。生後受毒者，只發一次，其患腫高，破之又腫，皆稟受時原有皮膜相裹，毒雖出而膜未除，故愈又發。腫甚膿熟者，用鍼刺破，以三品一條鎗插入孔內，化盡內膜自愈。又有不膿而不收口者，此必風襲患口，宜敗銅散搽之，兼戒口味自愈。

㈨透腦疽

透腦疽發在額上髮際之間，多發寒熱，頭疼如斫，不可忍耐，先用萬靈丹，發汗解散風邪，次宜清托。

㈩玉枕疽

玉枕疽，生在腦後枕骨中，堅而難潰，痛引肩項，鼻塞氣麤，此太陽膀胱濕熱凝滯而成。初起有表證者，便宜解表，有裏證者，卽與通利。潰後宜補托，久則宜收斂，此爲一定治法，不可混亂妄投藥餌，致其危亡也。

⑪白禿瘡

白禿瘡，因剃髮腠理司開，外風襲入，結聚不散，致氣血不潮，皮肉乾枯，發爲白禿，久則髮落，根無榮養，如禿斑光潤不癢，內血已潮，以薑蘸潤肌膏常擦，其髮漸生。禿斑乾枯作癢者，內必有蟲，宜用麥餞散搽之，蟲死風散，髮生可愈。後忌動風發物等件。

醫門法律 臣喩昌著

㈠濕熱上干於頭宜審下法

金匱治上焦之濕，本內經濕上甚爲熱之義，而分輕重二證。輕者但發熱，面赤而喘，頭痛鼻塞，而煩，邪在上焦，裏無

治火之法，不宜佐以升散，蓋外邪之火可散而去，內鬱之火得升而愈熾矣，此爲忌也

陰虛頭痛，卽血虛之屬也。凡久病者多有之，其證多因水虧，所以虛火易動，火動則痛，必兼煩熱內熱等證，治宜壯水爲主，當用滋陰八味煎，加減一陰煎，玉女煎之類主之。火微者，宜六味地黃丸，四物湯，三陰煎，左歸飲之類主之。

陽虛頭痛，卽氣虛之屬也。久病者亦有之。其證必戚戚悠悠，或羞明，或畏寒，或倦怠，或飲食不甘，脈必微細，頭必沉沉，遇陰則痛，逢寒亦痛，是皆陽虛陰勝而然。治宜扶陽爲主，如理陰煎，理中湯，十全大補湯，補中益氣湯之類，皆可擇用。或以五福飲，五君子煎，加川芎細辛蔓荊子之類，以升達陽氣，則又最善之治也

痰厥頭痛，諸古方書皆有此等名目，然以余論之，則必別有所兼之因。但以頭痛而兼痰者有之，未必因痰頭痛也。故兼痰者，必見嘔惡，胷滿脅脹，或欬嗽氣粗多痰，此則不得不兼痰治之。宜二陳湯，六安煎，和胃飲，平胃散，加川芎細辛蔓荊子之類主之。如多痰兼火者，宜用淸膈煎，或二陳湯，六安煎，加黃芩天花粉之類主之。火甚者加石膏亦可。如多痰兼虛而頭痛者，宜金水六君煎，或六君子湯，加芎辛之類，酌而用之。

㈡頭眩

眩運一證，虛者居其八九，兼火兼痰者，不過十中一二耳。原其所由，則有勞倦過度而運者，有饑飽失時而運者，有嘔吐傷上而運者，有瀉泄傷下而運者，有大汗亡陽而運者，有眴目驚心而運者，有焦思不釋而運者，有被毆被辱氣奪而運者，有悲哀痛楚大叫大呼而運者，此皆傷其陽中之陽也。又有吐血衄血便血而運者，有癰膿大潰而運者，有金石破傷失血痛極而運者，有男子縱慾氣隨精去而運者，有婦女崩淋產後去血而運者，此皆傷其陰中之陽也。再若大醉之後，濕熱相乘而運者，傷其陰也。有大怒之後，木肆其強而運者，傷其氣也。有痰飲留中，治節不行而運者，脾之弱也，此亦有餘中之不足也。至若年老精衰，勞倦日積，而忽患不眠，忽苦眩運者，此營衛兩虛之致然也。由此察之，虛實可辨矣。卽如內經之言，亦無非言虛，而何後世諸家，每多各逞臆說，其於病情經義，果相合否？指

燎原，烟燄之色，先透於額，乃至微汗亦隨火而出於額，心之液且外亡矣。

景岳全書

臣張介賓著

㈠頭痛

凡診頭痛者，當先審久暫，次辨表裏。蓋暫病者，必因邪氣，久病者，必兼元氣，暫病有表邪者，此風寒外襲於經，治宜疏散，最忌清降，有裏邪者此三陽之火熾於內，治宜清降，最忌升散，此治邪之法也。其久病者，則或發或愈，或以表虛者，微感則發，或以陽勝者，微熱則發，或以水虧於下，而虛火乘之則發，或以陽虛於上，而陰寒勝之則發，所以暫病者，當重邪氣，久病者，當重元氣，此固其大綱也。然亦有暫病而虛者，久病而實者，又當因脈因證而詳辨之，不可執也。

頭痛有各經之辨，凡外感頭痛，當察三陽厥陰，蓋三陽之脈俱上頭，厥陰之脈亦會於巓，故仲景傷寒論則惟三陽有頭痛，厥陰亦有頭痛，而太陰少陰則無之。其於辨之之法，則頭腦額顱，雖三陽俱有所會，無不可痛，然太陽在後，陽明在前，少陽在側，此又各有所主，亦外感之所當辨者也。至若內傷頭痛，則不得以三陽為拘矣。如本經所言下虛上實，過在足少陰巨陽，若厥病篇所論，則足六經及手少陰少陽皆有之矣。奇病論曰：「腦者陰也，髓者骨之充也。」凡痛在腦者，豈非少陰之病乎？此內外之異，不可不察也。

外感頭痛，自有表證可察，蓋其身必寒熱，脈必緊數，或多清涕，或兼欬嗽，或兼脊背痠痛，或兼項強，不可以左右顧，是皆寒邪在經而然。散去寒邪，其痛自止。如川芎細辛蔓荊子柴胡之類，皆最宜也。若寒之甚者，宜麻黃桂枝生薑葱白紫蘇白芷之類，隨其虛實而加減用之。

火邪頭痛者，雖各經皆有火證，而獨惟陽明為最，正以陽明胃火盛於頭面，而直達頭維，故其痛必甚，其脈必洪，其證必多內熱，其或[illegible]

人所常有之事，但忽運而忽止者，人皆謂之頭運眼花；卒倒而不醒者，人必謂之中風中痰。不知忽止者，以氣血未敗，故旋見而旋止，即小中風也。卒倒而甚者，以根本既虧，故遽病而難復，即大頭眩也。且必見於中年之外，而較之少壯，益又可知。於此察之，則其是風非風，是痰非痰，而虛實從可悟矣。何今人不識病機，但見眩仆不語等證，無不謂之風痰，而非消即散，吾恐幾微之氣，有不堪再加剷削矣！深可悲也。

㈢論治

頭眩雖屬上虛，然不能無涉於下。蓋上虛者，陽中之陽虛也，下虛者，陰中之陽虛也，陽中之陽虛者，宜治其氣，如四君子湯五君子煎歸脾湯補中益氣湯；如兼嘔吐者，宜聖朮煎大加人參之類是也。陰中之陽虛者，宜補其精，如五福飲，七福飲，左歸飲，右歸飲，四物湯之類是也。然伐下者必枯其上，滋苗者必灌其根，所以凡治上虛者，猶當以兼補氣血為最，如大補元煎，十全大補湯，及諸補陰補陽等劑，俱當酌宜用之。

眩運證，凡有如前論首條所載病源者，當各因其證求而治之。其或有火者，宜兼清火，有痰者，宜兼清痰，有氣者，宜兼順氣，亦在乎因機應變，然無不當以治虛為先，而兼治為佐也。

古法之治眩運，亦有當察者。丹溪曰：濕痰者多，宜二陳湯，火者加酒芩，挾氣虛者相火也，治痰為先。挾氣藥降火，如東垣半夏白朮天麻湯之類。

眩運不可當者，以大黃酒炒為末，茶湯調下。

火動其痰，用二陳加黃芩蒼朮羌活，散風行濕。附錄曰：有早起眩運，須臾自定，日以為常者，正元散下黑錫丹。

傷食頭運，腎著湯加川芎，名除濕湯。

有痰者，青州白丸子。

南若此，後學能無誤乎？因摘其尤者，悉之如左。

河間之論眩運，獨取至眞要大論一句曰：諸風掉眩，皆屬肝木，風主動故也。所謂風氣甚而頭目眩運者，由風木旺必是金衰不能制木，而木復生火，風火皆屬陽，陽主乎動，兩動相搏，則爲之旋轉。故火本動也，焰得風則自然旋轉也。此釋風木之義，固然似矣。然不知至眞要論之言，乃言運氣臟氣所屬之理，非所以悉眩運之病情也。必若口問篇衞氣篇決氣篇經脈篇海論等議，方爲最切最近之論，何河間一無引證，而獨言風火二字，以該眩運一證，豈無失乎？

又若丹溪之論眩運曰：痰在上，火在下，火炎上而動其痰也。此證屬痰者多，蓋無痰不能作眩，雖因風者亦必有痰，挾氣虛者亦宜治痰爲主，兼用補氣降火之藥。若據此論，則凡屬眩運，無非痰證也。何軒岐之言絕然不及痰飲，而但曰上氣不足，頭爲之苦傾，目爲之眩，曰上虛則眩，曰督脈虛則頭重高搖之，曰髓海不足則腦轉耳鳴而眩冒。凡此者，豈皆痰證耶？又若余前章所列諸證，無非眩運之由，亦豈皆痰證耶？故在丹溪則曰無痰不能作眩，當以治痰爲主，而兼用他藥。余則曰無虛不能作眩，當以治虛爲主，而兼酌其標。孰是孰非，余不能必，俟明者正之！

頭痛之病，上實證也。頭眩之病，上虛證也。故內經分別甚明，曰：「頭痛巓疾，上實下虛」，又曰「上實下虛爲厥巓疾」。此以邪氣在上，所以爲痛，故曰上實也。至若眩運之病，則曰：「上氣不足」，又曰「上虛則眩」。未聞言上之實也。而後世諸家，如嚴用和楊仁齋輩，有曰結而爲飲，隨氣上逆者，有曰疲勞過度，下虛上實者，有曰腎家不能納氣，使諸家氣逆奔而上者，即如朱丹溪亦曰痰在上，火在下，凡此皆言上實也。何與內經相反若此？噫！此實後人之不明耳。夫眩運之證，或爲頭重，或爲眼黑，或爲腦髓旋轉，不可以動，求其言實之由，不過謂頭重者爲上實，而不知頭本不重於往日，而惟不勝其重者，乃甚於往日耳。上力不勝，陽之虛也，豈上實乎？又何氣不歸元，及諸氣逆奔之有？蓋上實者宜降宜抑，上虛者最不宜再伐生氣，此上實上虛之旨，有不可不辨，而誤則害矣。

當歸山藥各三錢，二劑即愈，此方妙在治腎[illegible]

腎水愈衰，今補肝又補腎，子母相資，自然上清頭目，況又入麥冬五味，以滋肺金之清肅乎？所以下喉即安然也。

頭痛有神方，用川芎沙參各一兩，蔓荊二錢，細辛五錢，水二碗，煎八分，加黃酒半碗，調勻早晨服之，一劑永不再疼。此方妙在用沙參，蓋沙參補陰，原不入腦，今用於川芎之中，而蔓荊細辛直走於巔，則沙參不能下行，不得不同群共入於腦中。夫腦痛者因腦陰之虛，風得留之而不去，今補其腦則風不能存，而腦痛自愈而頭痛亦除矣。此方不特治頭痛，兼治腦疼，無不神效。

頭痛之證，止消用蓖麻子一粒，搗碎同棗肉些須同搗勻，丸如黃豆大，外用絲綿裹之，納入鼻孔，少頃必有清涕流出，即將丸藥取出，不可久放其中，頭疼即愈，永不再發。倘久留在中，必致腦髓流出，又成不可藥救之證，切記切記！如人頭疼，法當用輕清之品，少少散之，無不立效，如小柴胡湯之方是也。然而小柴胡湯，世人不知輕重之法，予再酌定之，可永爲式。方用柴胡黃芩半夏甘草各一錢，人參五分，此小柴胡湯，予更加人參五分，茯苓二錢，更爲奇妙，蓋氣足則邪易出而汗易發，世人見用人參，便加失色，匪獨醫者不敢用，即病者亦不敢服，相沿而不可救藥者，滔滔皆是，安得布告天下醫人，詳察其病源而善用之也！

㈡腦痛治法

腦痛用黃酒一升，白芍三兩，辛夷桔梗各三錢，郁李仁麥冬柴胡各五錢，甘草一錢，水三椀，煎湯入前酒飲之，一醉而愈。量好者再飲之，以酒必以醉爲度。腦痛之病，乃風入膽經也。膽應於腦，故腦痛。人以爲用柴胡太多，過於辛散，不知有白芍和之，則不散氣而轉能散邪。辛夷郁仁，皆入膽之妙品，桔梗甘草，又入肺之妙藥。膽病何以又兼治肺，不知鼻上通於腦，腦熱則必下流清水，久則必成鼻淵矣。兼治其肺，則肺氣清肅，自去平膽木之旺，而清涕不致下行，此立方之神妙有如此。

愚謂古法之治眩運，如半夏白朮天麻湯，治脾痰也，二陳湯加黃芩，治熱痰也，青州白丸，治風痰寒痰也，腎著湯，治腎痰也。此外如大黃末之治眩運不可當，惟痰火上壅者宜之。黑錫丹之重墜，惟氣實於上者宜之。第恐眩運一證，實痰實火者無幾，而亦非上盛之病，此古方之有宜否用者，不可不審。

石室祕籙

臣陳士鐸著

㈠頭痛治法

常治法者，謂以常法而治之者也。如人病頭疼，則以頭疼常法治之是也。何必頭疼而治之於兩足乎？雖頭疼，實有治之兩足而愈者，然彼必常治之而不愈，然後以變法治之，非可以捨常法而先求之於變法也。故一遇頭疼，即以川芎五錢，白芷蔓荊子甘草半夏細辛各一錢，治之，病去如掃也。

上治者，治上焦之證也。如頭疼而風入太陽經也，用川芎細辛白芷柴胡半夏甘草各一錢，芍藥三錢，治之。蓋風雖犯太陽，治法不可全治太陽，當上清其邪，故用白芷川芎細辛三味以散之。又用白芍甘草柴胡以清肝膽之火，膽經與肝經入於頭絡，故用此數味以散邪去火。又加半夏去痰，甘草和中，相濟而有成也。又頭痛一方，用川芎一兩，蔓荊子二錢，水煎服，立愈。蓋川芎補血，蔓荊子去風也。

完治者，如病頭疼腦痛，不必支刀破囫圇而治之也。頭痛用黃酒一升，入細辛一兩，白芷一兩，煮酒，一醉而愈。此等治法，世人不知，亦不敢用。今為開導之：頭痛至終年累月，其邪深入於腦，可知一二錢之散藥，安能上至巔頂，而深入於腦中，必多用細辛川芎白芷，以大散之也。或疑散藥太多，必損真氣，恐頭痛未除，而真氣先行散盡，誰知風邪在頭，非多用風藥必難成功！有病則病受之，何畏哉？一醉而愈，此方信而不必疑者也。惟是既愈之後，必須用熟地芍藥當歸各五錢，川芎一錢，山茱萸麥門冬各三錢，水煎服四劑為妙。

醫部彙考一百二十五

頭門四

方一

㊀古鄉古敗散中藏經下同　治頭風血風。

荊芥穗一斤，乾菊花半斤，白朮炒二兩，川芎四兩。右同爲細末，食後茶調二錢。

㊁二烏丸　治風痰眩運。

川烏頭，草烏頭，青鹽各四兩，黑豆半升。右用水二升，同煮四味，水耗卽以溫水添之，候川烏頭半軟，四破之，更煮，以透爛爲度，去皮同煎。烏頭並黑豆於石臼或木臼內搗令極爛，不見白星，卽就丸乾，卽以煮藥水添濕同搗，煮時留一盞以下水以備添，勿令煮乾也。丸如梧子大，每服三二十丸，鹽酒鹽湯任下食前。

㊂鵰頭丸聖惠方　治頭風眩運。

鵰頭一枚炒黃，眞藺茹，白朮各一兩，川椒半兩炒去汗。右爲末，蜜和丸梧子大，每酒下二十丸。

㊃松花酒奇效良方　治風頭旋腦皮腫痹。

松花幷臺春三月取五六寸如鼠尾者，不拘多少。右蒸細切一升，用生絹囊貯以酒三升，浸五日，每日空心暖飲

㈢頭面腫

有人忽頭面腫如斗大，看人小如三寸，飲食不思，呻吟如睡，此痰也，用瓜蒂散吐之。而頭目之腫消，又吐之，而見人如故矣。後用人參白朮茯苓半夏各三錢，甘草一錢，陳皮五分，水煎服二劑愈。

㈣癩頭瘡

有癩頭洗方，用蝸牛數十條，以癩頭洗之，二次必全愈，亦神方也。水三碗，煎蝸牛三十條足矣。

㈤頭角生瘡

如人有頭角生瘡，當日即頭重如山，第二日即變生青紫，第三日青至身上即死，此乃毒氣攻心而死也。此病多得之好吃春藥。蓋春藥之類，不過一丸，食之即強陽善戰，非用大熱之藥，何能致此？世間大熱之藥，無過附子與陽起石之類是也。二味俱有大毒，且陽起石必須火煆而後入藥，是燥乾之極，自然尅伐津液，況窮工極巧於婦女博歡，則筋骸氣血俱動，久戰之後，必大洩盡情，水去而火益熾矣。久之貪歡，必然結成大毒，火氣炎上，所以多發在頭角太陽之部位也。初起之時，若頭重如山，便是此惡證，急不待時，速以金銀花一斤，煎湯飲之，數十碗，可少解其毒，可保性命之不亡，而終不能免其瘡口之潰爛也。再用金銀花元參各三兩，當歸二兩，生甘草一兩，煎湯日用一劑，服至七日，瘡口始能收斂而愈。此種病世間最多，而人最不肯忌服春藥也，痛哉！

⑬茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓四兩，桂枝去皮，白朮，甘草炙各二兩。右四味，以水六升，煮取三升，去滓，分溫三服。

⑭小芎辛湯濟生 治風寒濕在腦，頭痛眩運嘔吐，及眉稜眼眶痛。

川芎三錢，細辛，白朮各一錢半，甘草一錢。右剉作一貼，入生薑五片，茶芽少許，水煎服。

⑮川芎散綱目下同 治偏頭痛神效。

甘菊，石膏，川芎，白殭蠶生各六錢。右爲細末，每三錢，茶清調下。

⑯玉眞丸 內經曰：『頭痛巓疾，下虛上實，過在足少陰巨陽，甚則入腎。』許學士曰：『腎厥，頭痛也，此藥主之。』

硫黃二兩，石膏煆，半夏製，硝石各一兩。右爲末，薑汁糊和丸梧子大，陰乾，每二三十丸，薑湯或米飲下。

⑰川芎石膏湯 治熱厥頭痛。

川芎，石膏各等分，右剉水煎服。

⑱喝起散本草 治風寒頭痛，婦人血風攻腦，忽運倒。

蒼耳嫩心陰乾，爲末，酒服二錢。此藥多達腦蓋，善通頂門，末服煎服皆佳。

⑲川芎茶調散得效下同 治偏正頭痛及頭風鼻塞聲重。

薄荷二兩，川芎，荊芥各一兩，羌活，白芷，甘草各五錢，防風，細辛各二錢半。右爲末，每二錢，食後茶清調下，或剉取七錢，作一貼，入茶少許煎服，亦佳。偏頭痛取細末，以葱涎調貼兩太陽穴，特效。

⑳一字輕金散 治偏正頭風痛，夾腦風，眉稜骨痛，牽引兩眼，抽掣疼痛，迸出或生翳膜，視物不明。

川芎，白芷，藿香，荊芥，旋覆花，石膏，防風各五錢，南星，川烏生各二錢半，草烏一錢半。右剉

五合，晚食再服。

㊄桂枝芍藥知母湯仲景下同　治中風頭眩，短氣温温欲吐者。

桂枝，　知母，　防風各四兩　芍藥三兩，　甘草　麻黃，　附子炮各二兩　白朮，　生薑各五兩。　右九味，以水七升煮取二升，温服七合，日三服。

㊅甘草乾薑湯　治肺中冷頭眩多涎唾

甘草四兩炙，　乾薑二兩炮。　右㕮咀，以水三升，煮取一升五合，去滓，分温再服。

㊆苓桂朮甘湯　治痰飲胷脅支滿目眩。

茯苓四兩，　桂枝，　白朮各三兩，　甘草二兩。　右四味，以水六升，煮取三升，分温三服，小便則利。

㊇半夏加茯苓湯　治卒嘔吐，心下痞膈，間有水眩悸者。

半夏一升，　生薑半斤，　茯苓三兩一方四兩。　右三味，以水七升煮取一升五合，分温再服。

㊈文蛤散　治微風頭痛。

文蛤五兩。　右一味杵爲散，以沸湯五合，和服方寸七。

㊉茵陳蒿湯　治穀疸頭眩。

茵陳蒿六兩，　梔子十四枚，　大黃二兩。　右三味，以水一斗先煮茵陳，減六升，內二味煮取三升，去滓，分温三服，小便當利，尿如皂角汁狀，色正赤，一宿腹減，黃從小便去也。

㊀硝石礬石散　治女勞疸，身盡黃，額上黑。

硝石，　礬石燒等分，　右二味爲散，以大麥粥汁和服方寸七，日三服，病隨大小便去。小便正黃，大便正黑，是候也。

黃芩三兩半生半酒炒，甘草炙一兩半，防風　羌活　黃連酒炒各一兩，柴胡七錢　川芎五錢右爲末每二錢茶清調成膏臨臥抹口內少用白湯送下，此膏治諸般頭痛皆效惟血虛頭痛從魚尾相連痛者不治。

㉘小清空膏丹溪下同　治證同上。

片芩細切酒拌曬乾，右爲末茶清調下二錢，酒亦可。

㉙不臥散　治頭痛不可忍。

延胡索七枚，青黛二錢，猪牙皂角二兩。右爲末，用水調成小餅子。如杏仁大，令病人仰臥，以水化開，以竹管送入。男左女右鼻孔中覺藥味至喉少酸，令病人坐口咬銅錢一箇，涎出盈盆，卽愈。

㉚如聖餅子　治風寒伏留陽經氣厥痰厥一切頭痛。

天南星，乾薑，川芎，川烏，生甘草各一兩，半夏製，天麻，細辛，防風各五錢。右爲末，薑汁麵糊和丸芡實大，揑作餅子，每五餅細嚼，茶清溫酒任下。

㉛三生丸得效方下同　治痰厥頭痛。

半夏，白附子，天南星各等分。右爲末，薑汁浸，蒸餅和丸菉豆大，食後薑湯下四五十丸。

㉜防風散　治積熱上衝頭痛如火。

羌活，防風，當歸，生大黃，川芎，山梔子，薄荷各一錢，蟬殼，甘草各五分。右剉作一貼，入燈心二十莖，苦竹葉十片，水煎服。

㉝太陽丹　腦寒之病，皆因邪攻於上焦，令人頭痛，晝夜不甯，此藥主之。

龍腦二錢，石膏二兩，川芎，川烏炮，白芷，甘草各一兩。右爲末，煉蜜同麪麴糊和勻，每一兩作十八丸，

細，共搗爲末，每一字茶淸調下，神效。偏頭一邊痛，鼻塞不聞香臭，服此藥數次，嚏出一錠稠膿，卽愈。

㊁白附子散　治風寒入腦，令腦逆頭痛，齒亦痛，或牽引兩眼，遂至失明。

白附子一兩，　麻黃留節，　川烏，　南星各五錢，　全蝎五箇，　乾薑，　硃砂，　麝香各二錢半。　右爲末，溫酒調五分服，服訖去枕臥少時效。

㊂上淸白附子丸　治風痰盛，頭痛目眩，旋運欲倒，嘔噦惡心，神思昏憒，常服除風化痰，淸利頭目。

白附子炮，　半夏製，　川芎，　甘菊花，　南星炮，　白殭蠶炒，　陳皮去白，　旋覆花，　天麻各一兩，　全蝎炒半兩。　右爲末，薑汁浸蒸餅和丸梧子大，薑湯下三十丸。

㊂定風餅子　治痰厥頭痛嘔吐眩運。

川烏，　川芎，　南星，　半夏，　白茯苓，　白附子，　乾薑，　天麻，　甘草生用各等分。　右爲末，薑汁糊和丸芡實大，揑作餅子，硃砂爲衣，每一餅細嚼薑湯下。

㊃加味調中益氣湯東垣下同　治氣血俱虛頭痛，其效如神。

黃芪蜜炒一錢，　人參，　蒼朮，　甘草炙各七分，　陳皮，　當歸身，　川芎各五分，　木香，　蔓荊子，　細辛，　柴胡，　升麻各三分。　右剉作一貼，水煎服。

㊄安神湯　治氣血虛而有火，頭痛頭旋眼黑。

黃芪一錢半，　羌活，　黃蘗酒浸各一錢，　柴胡，　升麻，　生地黃酒浸，　知母酒浸各五分，　防風二分半，　生甘草，　炙甘草各二分。　右先水煎數沸，入川芎蔓荊子各三分，再煎至半，食後溫服。東垣　丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒蘗加風劑也。

乳香，沒藥，川芎，雄黃，白芷各二錢，芒硝五錢。右爲末令病人仰臥口含涼水取藥少許嗜入鼻內自效。

㊷四神散直方下同　治婦人血風眩運頭痛。

甘菊，當歸，旋覆花，荊芥穗各等分。右爲末每二錢葱白三寸，茶末一錢，煎水調下。

㊸芎辛導痰湯　治痰厥頭痛。

半夏製二錢，川芎，細辛，南星炮，陳皮，赤茯苓各一錢，枳殼麩炒，甘草各五分。右剉作一貼，薑七片，水煎服。

㊹芎藭酒千金方下同　治腦風頭重，頸項強，眼䀮䀮淚出，善欠，目欲眠，睡憎風，劇者，耳鳴，滿眉眼疼，悶吐逆眩倒不自禁，諸風乘虛經五臟六腑，皆爲癲狂諸邪病，悉主之。

芎藭，辛夷，天雄，人參，天門冬，柏子仁，磁石，石膏，茵芋，山茱萸，白頭翁，桂心，秦艽各三兩，松蘿，羚羊角，細辛，薯蕷，菖蒲，甘草各二兩，雲母一兩，燒令赤末爲粉。防風四兩。右二十一味，㕮咀以酒二斗漬七日，初服二合，漸加至五合日三。有女人少時患風眩，發則倒地，爲婦積年無兒，服此酒，幷將紫石門冬丸服之，眩瘥，生兒平復。

㊺人參湯　治頭眩屋轉眼不開。

人參，當歸，防風，黃芪炙，麥門冬，芍藥各二兩，獨活，白朮，桂心各三兩。右九味㕮咀，以水一斗，煮取三升，分三服。

㊻防風湯　治風眩嘔逆，水漿不下，食輒嘔，起卽眩倒，發有時，手足厥冷。

黃丹爲衣，每服二三丸食後以葱茶煎湯嚼下。

㉞芎烏散入門下同　治頭痛。

川芎，　烏藥各等分。　右爲末，每二錢以燒秤錘淬，酒調服。亦治產後頭痛。

㉟又方　治感寒濕眩運頭極痛。

川芎二錢，　白朮炒，　附子生各一錢，　甘草生，　橘皮各五分。　右剉作一貼，入薑七片，棗二枚，水煎服。

㊱一粒金嗃鼻法　治風涎偏正頭痛。

華撥末三錢，入猪膽內，拌勻候乾。　川芎，　白芷，　藁本，　青黛，　延胡索各二錢。　右爲末，水和爲丸，如芡實大，令病人臥，用一丸水化灌入鼻中，覺藥味至喉少酸，令病人坐，口咬銅錢一箇，當涎出盈盆即愈。

㊲當歸補血湯醫鑑　治血虛頭痛。

生乾地黃酒炒，　白芍藥，　川芎，　當歸，　片芩酒炒各一錢，　防風，　柴胡，　蔓荊各五分，　荊芥，　藁本各四分。　右剉作一貼，水煎服。

㊳七生丸回春下同　治男女八般頭風，及一切頭痛痰厥腎厥傷寒傷風頭痛並治。

川芎，　川烏，　草烏，　南星，　半夏二味，洗去滑，　白芷，　石膏俱生用等分，　加細辛，　全蝎各減半。　右爲細末，研取韭菜自然汁和丸梧子大，嚼生葱茶清送下七丸或九丸。

㊴黃芪益氣湯　治氣虛頭痛。

黃芪蜜炒一錢，　人參，　白朮，　半夏製，　陳皮各七分，　當歸酒洗，　川芎，　藁本，　甘草各五分，　黃蘗酒炒，　升麻，　細辛各三分。　右剉作一貼，入薑三片，棗二枚，水煎服。

防風五兩，桂心，天雄，細辛，朱砂，乾薑，人參，烏頭炮，附子炮各二兩，莽草，茯苓，當歸各一兩。右十二味治下篩酒服方寸七，日三。

㉔又方　治風頭眩，惡風，吐冷水，心悶。

防風二兩，澤瀉，天雄，細辛，附子，薯蕷，茯苓各一兩，白朮土炒二兩半，桂心一兩半，乾薑半兩。右十味，治下篩酒服方寸七，常令酒氣相接，則脫巾帽，解髮，梳頭百過，復投一升酒，便洗手足，須臾自熱，解髮以粉粉之，快然便熟眠。愈亦可洗頭面汗出。一本有澤蘭無澤瀉

㉕又方　治風眩翻倒無定。

獨活六兩，石膏，蒴藋各四兩，枳實三兩。右四味㕮咀，以清酒八升，煮取四升，頓服之，以藥滓熨頭覆眠，取汗覺冷，又內鐺中炒令熱熨之。一本有楮實，無枳實。

㉖又方　治患頭眩運，經久得瘥後，四體漸羸，食無味，好食黃土。

麴二斤，白朮三斤。右二味爲末，酒和併手丸如梧桐子大，曝乾，飲服三十丸，日三，斷食土無效。

㉗又方　治頭中五十種病。

巴戟天，白菊花，芎藭，乾薑，防風，石楠，白朮，烏頭炮，附子炮，細辛，薯蕷，蜀椒，人參，桔梗，秦艽，澤瀉，甘草生，天雄炮，栝蔞根，山茱萸，乾地黃，羌活各等分。右二十二味，治下，篩以酒服方寸七，日三。

㉘摩頭散　治同前

䕡茹，半夏，蜀椒各六分，烏頭炮八分，桂心七分，莽草四分，附子炮，細辛各一兩。右八味治下，篩

防風，防己，附子炮，乾薑，甘草生各一兩，桂心，蜀椒各二兩。右七味㕮咀，以水四升，煮取二升，分三服，日三。古今錄驗有白朮一兩。

㊼又方　治頭風眩欲倒，眼旋屋轉，腦痛。

防風，枳實，杏仁研，芎藭各三兩，白茯神，前胡，生薑，半夏，麻黃各四兩，細辛二兩，竹瀝三升。右十一味㕮咀，以水六升，合竹瀝煎取二升七合，分三服，頻服三兩劑佳。

㊽茵芋湯　治風虛眩眼暗。

茵芋一兩，人參，甘草，蓯蓉，黃芪，茯苓，秦艽，厚朴，烏喙各二兩，防風六兩，山萸，松實各三兩。右十二味㕮咀，以水一斗，煮取二升半，分五服。強者一日夜盡，羸劣分五服，二日盡。

㊾鴟頭酒　治風頭眩轉，面上遊風。

飛鴟頭五枚，獨活二兩，茯神，防風，芎藭，薯蕷各四兩，葛根，桂心，遼細辛，人參，天雄炮，乾薑，枳實，貫衆，蜀椒各三兩，山茱萸一升，麥門冬，石楠各五兩。右十八味㕮咀，絹囊盛清酒四斗漬六宿，初服二合，日再服，稍加以知為度。一本無茯神麥門冬石楠，有天門冬石膏。

㊿大三五七散　治頭風眩運，口喎目斜，耳聾。

天雄炮，細辛各三兩，山茱萸，乾薑各五兩，薯蕷，防風各七兩。右六味，治下篩，酒服五分匕，日再，不知稍加。

(五一)小三五七散　治頭風目眩耳聾。

天雄炮三兩，薯蕷七兩，山茱萸五兩。右三味，治下篩，以清酒服五分匕，日再，不知稍增，以知為度。

白朮，　薯蕷各三兩，　蜀椒五合。　右十七味，治下篩，酒服方寸匕，日三。

（六六）又方　治頭面上風。

松脂，　石鹽，　杏仁，　蜜蠟爲末各一兩，　薰陸香二兩，　蓖麻仁三兩。　右六味，熟搗作餅，淨剃百會上髮，貼藥餅上安紙，三日一易，若癢刺藥上不久風定。

（六七）頭風散　治頭風。

附子一枚中形者，　鹽如附子大。　右二味，治下篩，沐頭竟，以方寸匕摩頂上，日三。

（六八）沐頭湯　治肺勞熱，不問冬夏老少頭生白屑，搔癢不堪。然肺爲五臟之蓋，其勞損傷肺，氣衝頭頂，致使頭癢多生白屑，搔之隨手起，人多患此，皆從肺來，世呼爲頭風也。

大麻子，　秦椒各三升，　皂莢屑五合。　右三味熟研，內泔中漬一宿，去滓，以木匕攪百徧，取勞乃用沐頭髮際，更別作皂莢湯濯之，然後敷膏。

（六九）又方　治證同上。

甘菊花，　獨活，　茵芋，　防風，　細辛，　蜀椒，　皂莢，　杜蘅，　莽草，　桂心。　右十味各等分，可作湯沐及熨之。

（七十）又方　治證同上。

猪椒根三兩，　麻黃根，　防風各二兩，　細辛，　茵芋各一兩。　右五味㕮咀，以水三斗，煮取一斗，去滓，溫以沐頭。

（七一）犀角湯　治風毒熱頭面腫。

犀角屑，　生薑各二兩，　苦參，　栝蔞根，　防風各一兩，　石膏六兩，　竹葉二握，　黃芩，　青木香，　升麻各三兩，　防己一兩半。　右十一味㕮咀，以水七升，煮取二升，分三服，相去十里久，內消不利。

以大酢和摩頭記日數。三日頭膚痛，四五日後一著藥如前，十日以酢漿洗頭，復摩藥卽愈。若生息肉，併喉咽中息肉，大如棗，欲塞，以藥摩之卽愈。耳鼻齒有疾，並用之良。

(五九)入頂散　治頭面脹滿，腦癰偏枯，發作有時，狀似刀刺，失聲陰陰然疼，面目變青。

山茱萸，芎藭，防風，獨活各一兩半，細辛，莽草，白朮，薯蕷，牛膝，石楠，甘草生各一兩，烏頭炮，通草，菖蒲，附子炮，麻黃，天雄炮，蜀椒，桔梗各一兩六錢，　右十九味，治下篩，酒服方寸匕，日三。

(六〇)杏仁膏　治上氣頭面風頭痛，胷中氣滿，賁㹠氣上下往來，心下煩熱，產婦金瘡諸病。

杏仁二升，去皮尖雙仁者不用。　右一味搗研，以水一斗濾取汁令盡，以銅器盛置塘火上，從旦煮至日入，當熟如脂膏，下之，空腹酒服一方寸匕，日三。不飲酒者，以米飲服之。愼豬魚蒜酢。

(六一)大豆酒　治頭風。

大豆二升，炒令無聲。　右一味，先以一斗二升瓶盛清酒九升，乘豆熱卽傾著酒中，密泥頭，七日溫服之。

(六二)又方　治中風頭痛發熱，耳頰急。

麻黃，葛根，石膏，桂心各三兩，附子炮，芍藥，甘草，秦艽，防風各二兩，生薑五兩。　右十味㕮咀，以水一斗煮取三升，分三服，溫覆取汗。

(六三)薯蕷散　治頭目有風，牽引目睛疼痛，偏視不明。

薯蕷三兩，細辛一兩半，秦艽，天雄各二兩，獨活，桂心，山茱萸各二兩半。　右七味，治下篩，酒服方寸匕，日三。

(六四)又方　治頭中痛，身熱風熱。

分，麥門冬，防風，黃芩，芍藥，白朮各六分，柴胡，桔梗，白茯苓，芎藭，杏仁各五分，白斂，乾薑各三分，大棗一百枚取膏。右二十二味爲末合白蜜棗膏丸如彈丸，先食服一丸，日三。

(七八)天雄散 治頭目眩運，屋轉旋倒。

桂心三分，天雄，防風，芎藭，人參，獨活，葛根各三分，莽草四分，白朮，遠志，薯蕷，茯神，山茱萸各六分。右十三味，治下篩先食以菊花酒服方寸匕，日二，漸加至三匕，以知爲度。

(七九)菊花酒 治頭面病

九月九日，取甘菊花曬乾。右一味爲末，以米饙中蒸作酒。

(八〇)紫石煮散 治頭眩運。大人風引，小兒驚癇瘈瘲，日數十發，醫所不療者。

紫石英，滑石，白石脂，凝水石，赤石脂，石膏各六兩，甘草，桂心，牡蠣粉各五分，大黃，龍骨，乾薑各四兩。右十二味，治下篩爲粗散，盛以韋囊，懸於高涼處，欲用取三指撮，以新汲井水三升，煮取一升二合。大人頓服，未百日兒服一合。未能者，緜沾著口中，熱多者日四五服，以意消息。

(八一)升麻湯局方 治頭痛。

升麻，蒼朮各一兩，荷葉一箇全者。右爲細末，每服五錢，水一盞，煎七分，溫服。食後或燒全荷葉一箇，研細調煎藥服亦妙。

(八二)白花蛇散總錄下同 治腦風疼痛，時作時止，及偏頭風，

白花蛇酒，浸去皮骨一兩。石膏，荊芥各二兩，天南星漿水煮軟切炒一兩，地骨皮二錢半。右爲末，每服一錢，茶下，日三服。

(十二)防風散　治頭面偏身風腫。

防風一兩，　白朮三兩，　白芷一兩。　右三味，治下篩酒，服方寸匕，日三。

(十三)續命湯　治風眩，發則煩悶無知，口沫出，四體角弓目反上口，噤不得言。

竹瀝一升五台，　生地黃汁一升，　生薑，　防風，　麻黃各四兩，　龍齒煅四兩，　防己三兩，　附子炮三分，　石膏十兩，　桂心二兩。右十味㕮咀，以水一斗煮取三升分三服，有氣加附子一兩，紫蘇子五合，橘皮半兩。已服續命湯，口開四肢尙未好定，而心中尙不除者，紫石湯主之，方見後紫石煮散是也。

(十四)小續命湯

防風一錢二分，　桂枝，　杏仁去皮尖炒研，　川芎酒洗，　白芍酒炒，　人參，　甘草炙，　麻黃，　黃芩酒炒，　防風各八分，　附子四分。　右爲末，每服三錢，加薑棗煎。

(十五)薯蕷湯　治心中驚悸而四肢緩，頭面熱，心胷痰滿，頭目眩冒，如欲搖動。

薯蕷，　麥門冬，　人參各四兩，　生地黃，　前胡，　芍藥各八分，　枳實，　遠志去心，　生薑各三分，　茯苓，　茯神各六分，　半夏五分，　甘草，　竹葉各二分，　黃芩二分，　秫米三合。　右十六味㕮咀，取江水，高舉手揚三百九十下，量取三斗煮米，減一斗內半夏，復減九升，去滓下藥，煮取四升，分四服。無江水處，以千里東流水代之，攪手令上頭也。秦中無江水，涇渭水可用，諸葛灌劍猶尙取之。

(十六)防風湯　服前湯後，四體尙不涼冷，頭目眩轉者，服之。此湯大勝，宜長將服，但藥中小小消息隨冷暖耳，仍不除瘥者，依此方。

防風，　石膏，　人參，　赤石脂，　生薑，　寒水石，　龍骨，　茯苓各三分，　桂心二分，　紫石一分。　右十味㕮咀，

後服。

(九一)加味六君子湯　治氣虛痰甚，風邪眩運不休者。

人參，白朮，茯苓各一錢，陳皮，半夏各一錢五分，荊芥穗，甘草各五分。右水二盞，薑三片，棗二枚，煎一盞，去滓，入竹瀝二匙，温服。

(九二)補中益氣湯　治煩勞內傷，身熱心煩，頭痛惡寒，懶言惡食，脈洪大而虛，或喘或渴，或陽虛自汗，或氣虛不能攝血，或瘧痢脾虛，久不能愈，一切清陽下陷，中氣不足之證。

黃芪蜜炙錢半，人參，甘草炙各一錢，陳皮，白朮土炒，當歸各五分，升麻，柴胡各三分，薑三片，棗二枚，煎。頭痛加蔓荊子，痛甚加川芎，腦痛加藁本細辛。

(九三)荊黃湯　治風熱眩運。

大黃酒炒，荊芥穗，防風各二錢，右剉水煎服，以利為度。

(九四)羌活勝濕湯醫統下同　治脊臂項強，腰如折，項如拔，上衝頭痛，此足太陽經不行，此藥主之。

羌活，獨活各一錢，藁本，防風各一錢五分，川芎，荊子，炙甘草各四分。右水二盞，煎八分，食後温服。

(九五)荊防敗毒散　治大頭天行時疫頭痛，發散瘟邪。

荊芥穗，防風，羌活，獨活，前胡，枳殼炒，茯苓，薄荷，炙甘草，川芎，牛蒡子，桔梗，人參各等分　水煎服。內熱加黃連，渴加天花粉。

(九六)通聖消毒散　治時行疫癘，頭面腫盛，目不能開，鼻塞口乾舌燥，內外有熱，或咽喉腫痛不利，或內實大便不利，煩躁脈洪數。

㊂芎黃湯　治頭目眩運。

大黃，荊芥穗，川芎，防風各等分，右爲粗末，大作劑料，水煎去滓服之，以利爲度。

㊃香芎丸　治頭痛。

香附子炒，川芎，石膏水飛，白芷，甘草，薄荷已上各一兩，川烏半兩炒去皮臍。右爲細末，每服二錢，溫酒茶清調下無時。

㊄搜風丸　一名人參半夏丸，治頭痛眩。

蛤粉二兩，人參，茯苓，藿香，薄荷，南星各半兩，半夏，乾薑，生礬，凝水石各一兩。右爲細末，與藏用丸末各中停水丸如豌豆大，每服三十丸，生薑湯下。

㊅藏用丸

大黃，黃芩各二兩，滑石，黑牽牛各四兩。右爲末，水丸桐子大，每服五七十丸，食後溫水下。

㊆獨聖散 元戎下同　一名瓜蔕散，治頭痛。服藥鍼灸久不愈者，以其濕氣在上也。

瓜蔕不拘多少。右爲細末，每服一錢或二錢，虀汁調下服之。或用少許吹入鼻中，清水徐徐出一晝夜，濕盡痛止。

一方加鬱金少許。

㊇大頭病方　兼治喉痹。

人間治疫有仙方，一兩殭蠶二大黃，薑汁爲丸如彈大，井花調蜜便清涼。

㊈大頭時氣方

馬牙硝，寒水石，鼠黏子，鬼臼，川大黃，鬼箭草各等分，腦子少許。右七味爲細末，用新井華水一盞，

㊂㊃飛虎散良方下同 治風熱痰火偏正頭風疼痛

白附子，白芷，荊芥，石膏煅，川芎，天麻，薄荷，防風各半兩，蒼朮米泔浸，兩頭尖黑心者不用各一錢 右爲細末每服一錢食後溫酒或茶清調下。

(三五)通天散 治偏正頭痛幷夾腦風熱壅滯。

赤芍藥，川芎 黃連，黃芩 延胡索，皂角，當歸 乳香各等分。右爲末，用紙撚蘸藥入鼻中，得嚏神效。

(三六)靈砂丹 御藥 治風熱鬱結，氣血蘊滯，頭目昏眩，鼻塞聲重，淸涕口苦，舌乾咽嗌不利，胷膈痞悶，咳嗽痰實，腸胃燥澀，小便赤黃，陰虛心火熾甚，及偏正頭痛，遍身痲木，瘡癢一切風證，竝宜治之。

明天麻，獨活 羌活，細辛，石膏煅，防風，連翹，薄荷各二兩，川芎，梔子 荊芥穗，大黃生，當歸，黃芩，全蠍去毒微炒，菊花，人參，白朮各五錢，甘草生，寒水石生，桔梗各二兩 砂石二錢半，滑石四兩。右爲末煉蜜和勻，朱砂二兩爲衣，每兩作十丸，每服一丸，細嚼，茶淸下。

(三七)青火金針 治頭風牙痛，赤眼腦瀉耳鳴。

火硝一兩，青黛，薄荷，川芎各等分。右爲末口噙冷水勿嚥，此藥吹鼻。

(三八)赤火金針 治同前。

火硝一兩，雄黃，乳香，沒藥，川芎，石膏各一錢，全蠍一對，用法如前。

(三九)升氣和中湯 寶鑑 治年高氣弱，淸氣不能上升，頭昏悶，本無表邪，因發汗數次，表氣愈虛，故苦頭痛惡風，不喜飲食，氣短，脈弱弦細而微，宜升陽氣。

黃芪錢半，人參一錢，白朮，陳皮，當歸，白芍藥各五分，甘草，升麻，柴胡各三分，川芎，細辛，

防風，荊芥穗，牛蒡子，甘草，川芎，當歸，白芍藥，黃芩，薄荷，梔子，桔梗，滑石末，麻黃，[illegible]拘急無汗脈浮數者用之　連翹，芒硝，大便堅實者加之　大黃酒浸。內實大便堅硬者用之內虛大便溏者不可用　右水煎溫服，細呷之。

(九七)清涼救苦散　治大頭瘟腫，甚者以此藥敷之。

芙蓉葉，霜桑葉，白蘞，白芨，大黃，黃連，山慈姑，赤小豆，黃芩，黃蘗，白芷，雄黃，芒硝，南星，金線重樓各等分。右為末，蜜水調，敷腫處，以翎頻掃之。

(九八)辛芎散　治熱痰壅塞，頭目不清，語音不出，服藥不解，乃是熱兼風痰所致，服此即愈。

細辛，川芎，防風，桔梗，白朮土炒，羌活，桑白皮炒，薄荷葉各一兩，甘草五分。右水二盞，薑三片，煎八分，食後溫服。

(九九)溫中化痰丸　治停痰留飲，胸膈痞滿，頭目眩運，惡心咳嗽，痰涎等證。

陳皮，青皮，良薑，乾薑炮各二兩。右為細末，醋煮糊丸梧桐子大，每服三十丸，空心米飲送下。

(一〇〇)急風散　治男婦偏正頭痛，夾腦頭風，太陽穴痛，坐臥不安。

生川烏去皮臍，辰砂研各一兩，南星洗二兩。右為細末，酒調塗貼痛處，小兒貼顖門。

(一〇一)都梁丸百一選方　治風吹項背，頭目昏眩，及腦痛，婦人胎前產後傷風頭痛

白芷大塊白者洗去土淨，沸湯泡四五次，剉用。右剉以蘿蔔汁浸，曬乾為末，煉蜜丸如彈子大，每服一丸，細嚼，以茶清或荊芥湯下。

(一〇二)九龍丸聖惠　治婦人男子八般頭風，一切頭痛。

[illegible]，[illegible]，[illegible]，[illegible]，半夏各半兩，細辛，全蠍各二錢半。右為末，韭汁丸梧桐子大，

延胡索十枚，猪牙皂角肥實者二枚，青黛二錢。右爲末，水和成小餅子，如[illegible]

⑱笑香餅　治[illegible]

乳香一錢，蓖麻子十四粒。右同搗爛作餅，貼太陽穴上，如痛定急去之，解開頭髮出氣。

⑲決明散　治頭痛。

決明子爲末。　水調，貼太陽穴，一方用決明槳梳去頭風明目。

⑳烏麥餅子　治久病頭痛，諸藥不效。

烏麥麵半斤，吳茱萸二兩，　爲末，和勻水調作餅子，入鏊上鏊熟，乘熱分頭髮，蓋在頭上如帽子，外以厚帛包裹，一時熱氣入腦而痛卽止。冷則去之，未愈更換熱者，無不愈也。

㉑天麻羌活丸　治頭目風眩，邪氣鼓作，或時旋運。

明天麻，羌活，白芷，藁本，芎藭，白芍藥，麻黃，細辛各二兩，牛黃，麝香並另研各一分。右爲細末，煉蜜爲丸，皂角子大，不拘時，薄荷煎酒下一二丸。

㉒白朮飲　治風邪在胃，頭旋不止，復加嘔逆。

白朮土炒，厚朴薑製，甘菊花各半兩，防風，白芷，人參各一兩，右咀每服五錢，水盞半，薑五片，煎八分，食遠服。

㉓滾痰丸　治痰火頭眩目運，如坐舟車，胷滿背脹，一服立止。

青蒙石煅酢淬七次一兩，沉香五錢，黃芩，大黃酒蒸各半斤。右爲細末，滴水如梧桐子大，每服七八十丸，量人強弱加減。

㉔加味二陳湯　治氣鬱痰火眩運。

甘草五分，陳皮，半夏，人參。茯苓，黃芩，川芎各一錢。右水二盞，薑三片，煎七分，木香五分，磨汁兌入

蔓荊子各一分。右咀水二盞，煎一盞，食後溫服。

㉚加味調中益氣湯東垣　治氣血兩虛頭痛，其效如神。

陳皮，黃蘗酒炒各二分，升麻，柴胡各四分，人參，甘草炙，蒼朮各六分，黃芪一錢，川芎六分，細莘二分，蔓荊子三分，當歸一錢。右咀水二盞，煎一盞，溫服。

㉛人參順氣散活人　治頭痛憎寒，壯熱，四肢疼痛。

麻黃，乾葛，甘草炙，白朮炒，人參，桔梗，白芷各一錢，白薑炮五分。右咀分二服，水一盞，薑三片，葱白二寸，同煎，連進取汗。

㉜葱附丸嚴氏　治元氣虛壅，上攻頭痛，

大附子一箇製　右為末，葱汁為丸，梧桐子大，空心茶下。

㉝當歸酒元戎　治血虛頭痛欲裂。

當歸一兩，酒一升，煮取六合服。

㉞珍珠散　治風熱上攻，頭痛目眩，鼻塞用此搐之。

盆硝七錢半，滑石一兩，乳香五分，冰片少許。右研勻，用一字口含水搐鼻中。

㉟本事方　治八般頭風。

草烏尖，細莘各等分，黃丹少許，右為末，搐鼻立效。

㊱延胡餅祕方　治頭痛不可忍。

延胡索十枚，猪牙皂角肥實者二枚，青黛二錢。右為末，水和成小餅子，如杏仁大，用時令患人仰臥，以水化

冬天大寒猶喜寒風其頭痛則愈微來煖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活三錢，酒知母，酒黃芩各一錢半，黃芪，炙甘草，酒黃蘗各一錢，防風，升麻各七分，柴胡五錢，藁本，酒黃連，生地黃，生甘草各五分，川芎，荊芥穗各二分，蔓荊子，蒼朮，當歸各三分，細辛，紅花各少許。右剉如麻豆大，分作二服，每服水二盞，煎至一盞，去查，稍熱食後服。

㉜補氣湯　服前藥之後，服此藥。

黃芪八分，甘草炙，當歸各二錢，細辛少許，柴胡，升麻各二分，麻黃炒，苦丁香各五分。右水煎服。

㉝川芎散寶鑑下同　治頭風，偏正頭痛，昏眩妙方。

川芎，細辛，羌活，槐花，甘草炙，香附子，石膏各半兩，荊芥，薄荷，菊花，防風去叉，茵陳各一兩。右爲末，每服二錢，食後茶清調下，日三服，忌動風物。

㉞石膏散　治證同上。

麻黃，石膏各一兩，何首烏半兩，葛根七錢半，右爲細末，每服三錢，生薑三片，水煎稍熱服。

㉟石膏散　治證同上。

川芎，石膏亂紋好者，白芷各等分。右爲細末，每服四錢，熱茶清調下。

㊱荊芥散本事　治頭風，

荊芥，石膏煆存性等分。右爲細末，每服二錢，薑三片，葱白三寸，和鬚使水一盞，煎至七分，食後服。

㊲又方　治一切頭疼，並皆治之。

茵陳揀淨五兩，麻黃，石膏煆存性各二兩，右爲末，每服一錢，臘茶調下，食後服，服畢仰臥霎時。

㊳麻黃吳茱萸湯東垣

藥，內食後服。

㉕十全大補湯　治氣血兩虛，頭眩運痛。

人參，白朮炒，茯苓，甘草炙，熟地黃酒洗，川芎，芍藥炒，黃芪，當歸酒洗，肉桂各等分。右㕮咀每服八錢，水二盞，薑三片，棗一枚，煎服。

㉖茯神湯　治七情所感氣血不足，臟氣不行，鬱而生涎，結爲痰飲，留於心經，則有怔忡四肢緩弱頭目眩運。

人參，黃芪製，半夏，麥門冬，山藥，前胡，熟地黃各一錢，枳殼一錢五分，甘草炙七分，遠志甘草水煮薑汁炒七分，茯苓，茯神各二錢。右作二服，水盞半，薑五片，秫米一小撮，煎一盞服。

㉗麻黃附子細辛湯仲景下同　治傷寒少陰頭痛，始得之反發熱脈沉者。

麻黃，細辛各二兩，附子一枚炮。先煮麻黃去沫，納諸藥煎。

㉘吳茱萸湯

吳茱萸一升，人參三兩，生薑六兩，大棗十二枚。右四味，以水五升，煮取三升，溫服七合，日三服。

㉙白虎湯

知母去皮一兩半，甘草一兩，糯米一合，石膏四兩，亂紋者另爲末。右剉如麻豆大，粳米拌勻，另水一盞煎至六分，去查溫服無時，日三四服。或眩嘔者，加半夏半兩薑汁製過用之。

㉚安神散東垣下同

黃芪，羌活，黃蘗酒炒各一兩，防風二錢半，知母酒炒，生地黃酒浸，柴胡，升麻各五錢，炙甘草，[illegible]。[illegible]水二盞，煎至一盞半，加蔓荊子半錢，川芎三分，再煎至一盞，臨臥去查熱服。東垣丹溪

錢半亦名玉壺丸治證同

㊺水煑金花丸潔古　治證同上。

南星生，半夏生各一兩，天麻，雄黃各二錢，白麪三兩。右爲細末，滴水爲丸，每服五十丸至百丸，先煎漿，水沸下藥煑，令浮爲度，漉出淡漿水浸另用生薑湯下。本草有寒水石一兩煆。

㊻調中益氣湯東垣下同　治頭眩。

黃芪一錢，人參，炙草，當歸，白朮各半錢。白芍藥，柴胡，升麻各三分，五味子十五粒，橘皮二分，水二盞煎至一盞，去查，食後溫服。

㊼半夏白朮天麻湯　治頭眩。

天麻五分，半夏湯洗錢半，白朮一錢，人參，蒼朮，黃芪，澤瀉，茯苓各五分，乾薑三分，神麴一錢炒，橘皮，大麥蘗各錢半，黃蘗二分。右㕮咀每服半兩，水二盞煎至一盞，去查，食前熱服，一服而愈。

㊽正元散　治下元氣虛，臍腹脹滿，心脅刺痛，泄利嘔吐，自汗，陽氣甚微，手足厥冷，及傷寒陰證，霍亂轉筋，久下冷利，少氣羸困，一切虛寒頭旋目眩。

紅豆炒，乾薑炮，陳皮留白各三錢，甘草炙，人參，白朮，茯苓去皮各二兩，肉桂去麤皮，川烏炮去皮尖各半兩，附子炮去皮尖，烏藥，山藥薑汁浸炒，川芎，乾葛各一兩，黃芪炙一兩半。右爲細末每服三錢，水一盞，薑三片，棗一枚，鹽少許，煎七分，食前溫服。常服助陽消陰，正元氣，溫脾胃，進飲食。

㊾來復丹和劑　治上盛下虛，裏寒外熱，伏暑泄瀉如水，頭痛目眩。

硝石一兩，同硫黃爲末，入磁碟內，以微火炒，用柳篦攪，不可火太過，恐傷藥力，再研極細，名二氣末。太陰元精石研飛，舶上硫黃透明者各一兩，五靈脂水澄去砂，曬乾，青皮去白，陳皮去白各二兩。右用

蒼朮一錢，麻黃，羌活各五分，藁本，柴胡，升麻，黃芪蜜製，當歸，黃蘗，黃連，黃芩各二分，半夏，川烏頭，蔓荊子各一分，吳茱萸三分，紅花，細辛各少許。水二盞，煎至一盞，去查，食遠稍熱服。

㊴透頂散本事　治偏正頭風，夾腦風，幷一切頭風，不問年深日近。

細辛表白者三莖，瓜蔕七箇，丁香三粒，糯米七粒，腦子，麝香各一，黑豆大。右將腦麝乳鉢內研極細，却將前四味研勻，另自治為末，然後入乳鉢內，盪起腦麝令勻，用瓦罐子盛之，謹閉罐口，患人隨左右嗜之一大豆許，良久出涎一升許則安。

㊵大川芎丸河間下同　治頭風旋運眩急，外合陽氣，風寒相搏，胃膈痰飲，偏正頭疼，身體拘倦。

川芎一斤，天麻四兩。右為末，煉蜜丸，每兩作十丸，每服一丸，細嚼，食後茶酒下。

㊶神聖散　治腦風邪氣留連不散，項背怯寒，頭痛不可忍者。

麻黃去節，細辛去苗，乾葛生一半炒一半，藿香葉各等分。右為末，每服二錢，煮荊芥薄荷，酒調下，茶調亦得。並治血風證。

㊷乳香盞落散寶鑑　治男子婦人偏正頭疼，不可忍者。

御米殼去蔕四兩，陳皮，甘草炙，桔梗去蘆，柴胡去苗各一兩。右為細末，每服二錢，水一鍾，入燈心十莖長四指，同煎七分，去查，食後溫服。

㊸順氣和中湯綱目　治氣虛頭痛。

黃芪一錢半，人參一錢，白朮，陳皮，當歸，芍藥各五分，甘草炙，升麻，柴胡各三分，蔓荊子，川芎，細辛各二分。水二盞，煎至一盞，去查，食後溫服，一服減半，再服而愈。

㊹玉壺丸和劑　治風痰吐逆，頭痛目眩，胃膈煩滿，飲食不下，及咳嗽痰盛，嘔吐涎沫。

醫部彙考一百二十六

頭門五

方二

(三五)沉香降氣散約說　治陰陽壅滯，氣不升降，頭目不清，或痛或眩，胷膈痞塞，喘促短氣。

沉香二錢八分，砂仁七錢半，甘草炙五錢半，香附子鹽水炒去毛六兩二錢五分。右爲極細末，每服二錢，入鹽少許，沸湯調服，不拘時；淡薑湯下亦得。

(三六)蘇子降氣湯和劑方下同　治虛陽上攻，氣不升降，上盛下虛，痰涎壅盛，頭目痛眩，胷膈噎塞，幷久年肺氣至效。

紫蘇子炒，半夏湯泡各二錢半，前胡去蘆，甘草炙，厚朴去皮薑製炒，陳皮去白各一錢，當歸去蘆一錢半，沉香七分，水二鍾，生薑三片，煎至一鍾，不拘時服。虛冷人加桂五分，黃芪一錢。

(三七)養正丹　治上盛下虛，氣不升降，元陽虧損，氣短身羸，頭旋屋轉，及中風涎潮，不省人事，傷寒陰盛，自汗唇青，婦人血海久冷。

水銀，黑錫去滓淨秤，與水銀結砂子，硫黃研，朱砂研細各一兩。右用黑盞一隻，火上鎔黑鉛成汁，次下水

五靈脂二橘皮爲末，次入元精石末及前二氣末，拌勻好，酢打糊爲丸，豌豆大，每服三十丸，空心米飲下。

(五十)茸硃丹魏氏　治頭眩。

好辰砂，草烏，瞿麥，黃藥子各一兩。右爲麤末，磁碗一箇，以薑汁塗炙數次，入砂在內，上鋪諸藥，復以盞蓋了，掘一小坑，安碗在內，用熟炭五斤煆，令火盡，吹去草藥灰，取辰砂研細，或只獨用辰砂末，每服一錢半，淡薑湯下，或加用鹿茸燎去毛切片，酒浸爲末三兩，和黃棗肉丸如梧桐子大，每服三四十丸，人參湯下，空心服。熟砂有毒，更宜斟酌。

(五一)鈎藤散本事　治肝厥頭運清頭目。

鈎藤鉤，陳皮，半夏，麥門冬，茯苓各一兩，石膏，人參，菊花，防風各半兩，甘草二錢半。右爲粗末，每服四錢，水一鍾半，薑七片，煎八分，溫服。

(五二)治中湯良方　治頭眩。

人參，乾薑，白朮土炒各三錢，甘草炙一錢，青皮，陳皮各一錢五分，水二鍾，煎一鍾，不拘時服。

(五三)紅丸子和劑　壯脾胃，消宿食，去膨脹，止眩運。

京三稜浸軟切片，蓬莪朮煨，青皮去白，陳皮去白各五斤，乾薑炮，胡椒各三斤，右爲末，用酢麪糊丸，如梧桐子大，礬紅爲衣，每服三十丸，食後薑湯送下，小兒臨時加減與服。

(五四)葛花解醒湯東垣　治飲酒太過，嘔吐痰逆，頭目痛眩，心神煩亂，胷膈痞塞，手足顫搖，飲食減少，小便不利。

青皮去瓤三錢，木香五分，橘紅，猪苓去皮，人參，茯苓各一錢半，神麯炒，澤瀉，乾薑，白朮各二錢，白豆蔻，葛花，砂仁各五錢。右爲極細末，每服三錢，白湯調服，但得微汗，則酒病去矣。此蓋不得已而用

(五五)火筒散衍慶世　治頭風

蚯蚓糞四錢，乳香二錢，麝香少許。右爲末，用紙筒自下燒上，吸煙嗃鼻內。

(五六)一滴金丸奇效良方　治首風及偏正頭風。

人中白，地龍各一錢。右爲細末，用羊膽汁和丸，如芥子大，每用一丸，新汲水一滴，化開滴入兩鼻中。

(五七)治八般頭風本事方

草烏尖，細辛等分，黃丹少許。右爲細末，用葦管嗃入鼻中。

(五八)斗門方　治卒頭上痛。

皂莢。右爲末，吹鼻嚏即止。

(五九)又方聖惠下同　治風頭痛，每天欲陰風雨先發者。

桂心一兩，爲末，以酒調如膏，用傅頂上幷額角。

(六〇)治頭風餅子。

五倍子，全蝎，土狗各七箇。右爲末，醋糊作如錢大餅子，發時再用醋潤透，貼太陽穴上，炙熱貼之，仍用帕子縛之，啜濃茶睡覺即愈

(六一)冲和膏元珠下同　治偏正頭風腫痛，幷眼痛者。

紫荊皮炒五兩，獨活去節炒三兩，白芷，菖蒲各一兩，赤芍藥炒二兩。右爲末，葱頭煎濃湯調塗。

(六二)祕方茶調散　治風熱上攻，頭目昏痛，及頭風熱痛，不可忍。

片芩二兩，酒拌炒三次，不可令焦。小川芎一兩，荊芥穗四錢，白芷五錢，細芽茶，薄荷各三錢，頭巔及腦痛，加細辛藁本蔓荊子各三錢。右爲細末，每服二三錢，用茶淸調下。

銀，以柳條攪次下朱砂攪令不見星子，放下少時，方入硫黃末，急攪成汁和勻。如有餘，以醋灑之，候冷取出，研極細，煮糯米糊丸菉豆大每三十丸，鹽湯棗湯任下。

㊳既濟解毒湯寶鑑　治上熱頭目赤腫而痛，胸膈煩悶，不得安臥，身半以下，皆寒，足胻尤甚，大便微祕。

大黃酒煨，大便利勿用。　黃連酒炒，　黃芩酒炒，　甘草炙，　桔梗各二錢，　柴胡，　升麻，　連翹，　歸身各一錢。
右㕮咀作一服，水二鍾煎至一鍾，去查食後溫服，忌酒濕麵大料物及生冷硬物。

㊴白芷散東垣下同　治風頭痛搐鼻。

石膏打碎，　芒硝，　香白芷，　鬱金各二錢，　薄荷三錢。　右爲細末，口含水搐鼻，若證在太陽，加羌活二錢，防風一錢，紅豆二粒，爲末搐之。

㊵川芎散　治頭痛。

蔓荊子，　川芎各一錢二分，　鬱金，　芒硝，　細辛根各一錢，　石膏一錢三分，　薄荷葉二錢，　紅豆一粒，　青黛二錢半，　右爲末搐鼻。

㊶瘦人搐鼻藥丹溪　治頭痛。

軟石膏，　朴硝各半錢，　腦子，　檀香皮，　荊芥，　薄荷葉各一錢，　白芷，　細辛各三錢。　右爲細末，搐鼻。

㊷如聖散寶鑑　治眼目偏痛頭風。

麻黃灰半兩，　盆硝二錢半，　麝香，　腦子各少許，　右爲細末搐之。

㊸又方　治證同上。

楊梅青，　硝石，　伏龍肝，　各等分爲末，搐鼻。

㊹瓜蔕神妙散河間　治偏正頭目昏眩，及偏正頭痛。

子各一兩，阿膠炒一兩半，麥門冬去心二兩，[illegible]

酒任下。

(六〇)葫蘆巴丸　治氣攻頭痛如破。

蘆葫巴炒，　三稜剉醋浸炒乾，　乾薑炮各一兩。　右爲細末，每服二錢，不拘時，溫生薑湯，或溫酒調服。及治瘴瘧瘥後頭痛。

(六一)細辛散東垣　治火逆頭痛。

柴胡二錢，　白芍藥，　生黃芩各五分，　黃芩酒炒一錢，　瓦粉，　細辛各二分，　甘草炙一錢半，　黃連酒炒，　川芎各七分，　每服三錢，水煎，食後溫服。

(六二)仙靈脾浸酒方　治偏頭風，手足不遂，皮膚不仁，

仙靈脾一斤。　右細剉，以無灰酒二斗浸之，春五夏三，秋七冬十日，取出藥，每日隨性煖酒飲之，常令醺醺，不得大醉，酒盡再合，合時忌雞犬見之。

(六三)淸震湯保命集　治雷頭風，頭面疙瘩，憎寒，拘急，發熱，狀如傷寒。

升麻，　蒼朮米泔浸一宿，各四錢，　荷葉一箇全者，　用水二鍾，煎八分，食後服。

(六四)茶調散　一名二仙散，治證同上。

大黃，　黃芩各二兩，　牽牛，　滑石各四兩。　右爲細末，滴水爲丸，如小豆大，溫水下十五丸，每服加十丸，以利爲度，日三服。

(六五)神芎丸子和　治心經積熱，風痰壅滯，頭目赤腫，或有瘡癤，咽膈不利，大小便閉澀，一切風熱之證，並宜服之。

⑬茶調散子和 治頭痛頭眩，

瓜蒂不拘多少， 好茶中停。 右爲細末，每服二錢，虀汁調下，空心用之。

⑭川芎散奇效良方下同 治風盛膈壅，鼻塞淸涕，熱氣上攻，眼目多淚生眵，及偏正頭痛，

川芎， 柴胡各二錢， 細辛， 半夏麯， 甘菊花， 人參， 前胡， 防風， 甘草炙各一錢， 薄荷少許。 右作一服，水二鍾，薑三片，煎至一鍾，食後服。

⑮菊花散 治風熱上攻，頭痛不止。

甘菊花， 旋覆花，並去梗， 防風去蘆， 蔓荊子， 枳殼去瓤麩炒， 川羌活去蘆， 石膏， 甘草炙各一錢半。 右作一服，水二鍾，薑五片，煎一鍾，不拘時服。

⑯大追風散 治久新偏正頭疼，肝臟久虛，血氣衰弱，風毒上攻，頭目眩運，心煩，百節痠疼，鼻塞聲重，項背拘急。皮膚瘙癢，面上遊風，狀若蟲行，一切頭風，兼治婦人血風攻注，此藥消風化痰，淸利頭目。

川烏炮去皮臍， 防風， 川芎， 荊芥。 石膏煆， 白殭蠶炒去絲， 甘草炙各一兩， 白附子炮， 全蝎去毒炒， 羌活， 地龍去土炒， 天南星， 天麻， 白芷各五錢， 乳香研， 沒藥研， 雄黃， 草烏炮各二錢半。 右爲細末，每服半錢，臨睡，細茶湯調服。

⑰止痛太陽丹 治頭痛。

天南星， 川芎各等分。 右爲細末，用連鬚葱白同搗爛，作餅，貼太陽痛處。

⑱點頭散 治偏正頭疼，常服除根。

川芎二兩， 香附子四兩，炒去毛。 右爲細末，每服二錢，食後用茶淸調服。

⑲芎犀丸 治偏正頭疼一邊，鼻不聞香臭，常流淸涕，或作臭氣一陣，服芎蝎等藥不效者，服此，不十

黃芩　黃連各[illegible]　人參[illegible]　[illegible]

馬屁勃各一錢，　白殭蠶炒，　升麻各七分。　右共爲細末，用湯調，時時服，或拌蜜爲丸，噙化，或加防風薄荷川芎當歸身㕮咀，如麻豆大。每服五錢，水煎去查，熱服之，食後時時服之。如大便硬，加酒煨大黃一錢或二錢以利之。腫熱甚者，宜砭刺之。

（一九一）黑白散潔古　治大頭病如神。

烏黑蛇酒浸，　白花蛇去頭尾酒浸，　雄黃二錢，　大黃煨半兩。　右爲極細末，每服一二錢，白湯調，無時。

（一九二）青州白丸子和劑方　治男婦手足癱瘓，風痰壅盛，嘔吐涎沫，眩運欲倒，及小兒驚風，婦人血風。

半夏七兩，水浸洗，　南星三兩，　白附子二兩，　川烏半兩，去皮臍，並生用。　右爲末，以生絹袋盛於井華水內，擺出，如未出者，更以手揉出，如有滓，更研，再入絹袋，擺盡爲度。置磁盆中，日曬夜露，至曉撇去舊水，別用井水攪，又曬至來日早，再換新水攪。如此法，春五日，夏三日，秋七日，冬十日。去水曬乾後，如玉片，研細，以糯米粉煎粥清，丸菉豆大，薑湯下二十丸，無時。如癱瘓風，溫酒下。小兒驚風，薄荷湯下三五丸。

（一九三）天麻半夏湯醫學綱目　治風痰眩運欲吐。

天麻，　半夏製各一錢，　橘皮，　柴胡各七分，　黃芩酒炒，　白茯苓，　前胡，　甘草炙各五分，　黃連三分。　右剉作一貼，入薑二片，水煎服。

（一九四）人參前胡湯丹溪心法下同　治風痰頭運目眩。

半夏麴一錢，　紫蘇，　枳殼，　赤茯苓，　南星炮，　前胡，　橘紅，　甘草炙各八分，　木香，　人參各三分。　右剉作一貼，入薑五片，水煎服。

（一九五）補虛飲　治氣鬱涎盛，面熱忪悸，及風虛眩運。

大黃生，黃芩各二兩，牽牛生，滑石各四兩，黃連，薄荷葉，川芎各半兩，爲末滴水丸，梧桐子大，每服五十丸食後溫水送下。

(六六)烏荆丸 和劑方　治諸風縱緩，言語謇澀。偏身痲痛，皮膚搔癢，幷婦人血風頭疼眼運，及腸風臟毒，下血不止，或病風攣搐，頭頷寬嚲不收，六七服瘥，

川烏炮去皮臍一兩，荆芥穗二兩。右爲末，醋糊丸如梧桐子大，每服二十丸，酒湯任下。有疾食空時，日進三四服，無疾早晨一服。

(六七)愈風餅子 子和

川烏炮半兩，川芎，甘菊花，白芷，防風，細辛，天麻，羌活，荆芥，薄荷，甘草炙各一兩。右爲細末，水浸蒸餅爲劑，揑作餅子，每服三五餅，細嚼，茶酒送下，不計時候。

(六八)涼膈散　治大人小兒煩躁熱渴，頭眩面熱，脣焦咽燥，舌腫喉痹，目赤鼻衄，頷頰結硬，口舌生瘡，譫語狂妄，腸胃燥澀，便溺閉結，睡臥不安，一切風壅。

梔子仁，連翹，薄荷，黃芩，甘草各一兩半，大黃，芒硝各半兩。右爲粗末，每一兩，水二盞，竹葉七片，煎至一盞，去滓，入蜜少許，食後服，加薑煎亦得。去六經熱減大黃芒硝，加桔梗甘草人參防風，治肺經邪熱，咳嗽有痰，加半夏。涼膈與四物各半服，能益血洩熱，名　散。錢氏去連翹，加藿香石膏爲瀉黃散，寶鑑連翹四兩，硝黃各二兩，餘各一兩。

(六九)黑錫丹 和劑方　治眞頭痛。

沉香，附子製去皮臍，葫蘆巴酒浸炒，肉桂各半兩，茴香炒，破故紙，肉豆蔻煨，金鈴子蒸去皮核，木香各一兩，黑錫去滓。硫黃各二兩，與黑錫結砂子。右爲末，同研勻，酒煮麪糊和丸，如梧桐子大，陰乾，以布

㉓川芎散醫學正傳　治頭目不清利或眩運。

酒炒黃連，　酒炒片芩各一兩，　羌活，　生甘草，　防風，　藁本，　升麻各五錢，　柴胡三錢半，　川芎錢半，　生乾地黃，　甘草各七錢半。　右爲末，每二錢，食後茶清調下。

㉔川芎散本事方　治風眩頭運。

山茱萸一兩，　山藥，　甘菊花，　人參，　小川芎，　茯神各半兩。　右爲細末，每服二錢，酒調下，無時，日三服，不可誤用野菊花。

㉕芎藭散　治風頭旋，眼目昏痛，眩運，倦怠心忪。

芎藭，　前胡，　白殭蠶炒，　人參各一兩，　蔓荆，　天麻酒浸焙，　防風去叉各半兩。　右爲細末。每服二錢，食後溫酒調下。

㉖防風飲子　療風痰氣發，即頭旋嘔吐不食。

防風，　人參，　橘皮各二兩，　生薑四兩，　白朮，　茯神各三兩。　右剉碎以水六升，煑取三升，去滓，分溫四服，一日令盡。忌醋桃李雀肉蒜麪。

㉗羌活湯東垣　治風熱壅盛上攻頭目昏眩。

羌活，　防風　黃芩酒洗各一兩，　柴胡七錢，　黃連酒煑一兩，　黃蘗酒炒，　瓜蔞酒洗各半兩，　甘草炙七錢，　白茯苓五錢，　澤瀉三錢。　右爲粗末，每服五錢，水煎取清或先臥後食通口熱服之日二服。

㉘仙朮芎散　治風熱壅塞，頭目運眩，消痰，明耳目，清神。

川芎，　連翹，　黃芩，　山梔子，　菊花，　藿香葉，　防風，　酒大黃，　當歸，　白芍藥，　桔梗各七分，　石膏，　滑

人參，　麥門冬；　山藥各一錢，　白茯苓，　茯神各八分，　半夏製，　黃芪各七分，　熟地黃，　前胡各五分，　枳殼。　遠志薑製，　甘草炙各三分。　右剉入薑五片，秫米一撮水煎溫服。

(一九六)香橘飲　治氣虛眩運。

半夏製二錢，　陳皮，　白茯苓，　白朮炒各一錢，　木香，　丁香，　縮砂研，　甘草炙各五分。　右剉作一貼，入薑五片，水煎服。

(一九七)滋陰健脾湯 回春　治臨事不甯，眩運嘈雜，此心脾虛怯也。此治氣血虛損有痰飲作眩運之仙劑。

白朮炒一錢五分，　陳皮鹽水洗去白，　半夏製，　白茯苓各一錢，　當歸，　芍藥，　生地黃各七分，　白茯神，人參，　麥冬，　遠志製各五分，　川芎，　甘草各三分。　右剉作一貼，入薑三片，棗二枚水煎服。

(一九八)芎朮湯 醫學入門　治冒雨中濕，頭重鼻塞眩運。

川芎，　白朮，　半夏薑製各二錢，　甘草炙五分。　右剉作一貼，入薑七片，水煎服。

(一九九)川芎丸 丹溪心法下同　清頭目止旋運，消風化痰。

桔梗五兩，　川芎，　薄荷各三兩二錢半，　細辛　防風，　甘草各一兩二錢半。　右爲末，蜜和每一兩半作五丸，每一丸茶清嚼下。

(二〇〇)防風散　治頭目不清，或眩運，去風明目。

防風，　川芎，　白芷，　甘菊，　甘草各一兩。　右爲末，每二錢，茶清調下。

(二〇一)清神養榮湯 集略　清頭目聰耳竅助精神止眩運。

麥門冬，　當歸各一錢二分，　川芎一錢。　薄荷，　甘菊，　羌活，　梔子各五分，　白芷七分，　甘草四分，　升麻

㉕守中丸

人參，白朮，甘菊花，枸杞子，山藥各二兩，白茯苓去皮十兩。麥門冬去心三兩，生地黃二十斤絞取汁。右爲細末，先用生地黃汁於銀器內入酥三兩，白蜜三兩同煎，逐旋掠取汁上金花令盡，得五升許，於銀器內拌炒前七味藥，漸漸令盡，候乾入白蜜同搗數千杵，丸如梧子大，每服五十丸，空心溫酒送下。服百日後，五臟充滿，肌膚滑潤。此藥須擇四季旺相日或甲子日修合。

㉖旋覆花湯 濟生

旋覆花，半夏，橘紅，乾薑各一兩，檳榔，人參，甘草，白朮各半兩。右剉，每服一兩，薑水煎服。

㉗柴胡半夏湯 治風證不敢見風，眼澀頭痛，有痰，眼黑，惡心兀兀欲吐，風來覺皮肉緊，手足重難舉，居暖處有微汗，便減，如見風即復作，一名補肝湯。

柴胡，蒼朮各錢半，半夏二錢半，升麻五分，白茯苓二錢，炒麯，藁本各一錢。右作一服，水二鍾，薑五片，煎至一鍾，食遠服。

㉘玉液湯 治七情所傷，氣鬱生涎，隨氣上逆，頭目眩運，心嘈忪悸，眉稜骨痛。

半夏肥大者六錢，湯泡七次，切作片。右作一服，水一鍾半，生薑十片，煎至八分，去查，入沉香末少許，不拘時溫服。

㉙漢防己散 治上焦風痰攻注，頭目旋運，心神煩亂。

漢防己，麥冬去心焙，前胡各一兩，旋覆花，半夏製，防風，細辛，甘草炙各半兩，人參，赤茯苓，芎藭，羚羊角屑，枳實麩炒，荊芥各七錢五分。右㕮咀，每服三錢，水一中盞，生薑半分，煎至六分，去查，不拘時溫服，忌飴糖羊肉。

㉚羚犀湯 治暗風，頭旋，眼黑昏眩，倦怠，痰涎壅盛，骨節疼痛。

石各一錢半，蒼朮，甘草各一錢，薄荷葉，縮砂仁，荊芥各四分。右作一服，水二鍾煎至一鍾，食後服。

㉙蔓荊子散　治風頭旋運，悶起則欲倒。

蔓荊，甘菊花，半夏湯泡，羚羊角屑，芎藭，枳殼麩炒，茯神去木，黃芩，防風各七錢半，麥門冬去心焙，石膏各一兩，地骨皮，赤箭，細辛，甘草炙各半兩。右㕮咀，每服三錢，水一盞生薑半兩，煎至六分，去查不拘時溫服，忌熱麪飴糖羊肉。

㉚羌活湯　治風頭眩，筋脈拘急，痰涎壅滯，肢節煩疼。

羌活，前胡去苗，石膏研，芎藭，枳殼麩炒，茯苓去皮，黃芩去黑心，甘菊花，細辛去葉，防風，甘草炙剉，蔓荊子，麻黃去根節煮掠去沫焙各一兩。右㕮咀，每服三錢水一盞生薑三片雞蘇三葉同煎至七分，去查，不拘時服。

㉛芎朮除眩湯直指方　治感濕感寒，頭重眩運。

附子生，白朮，川芎各半兩，官桂，甘草炙各二錢半。右剉每服三錢，薑七厚片，同煎，食前服。

㉜益氣補腎湯　治氣虛眩運。

人參，黃芪各一錢二分，白朮二錢，山藥，山萸肉各一錢半，白茯苓一錢，甘草炙五分，水二鍾，棗二枚，煎八分，食前服。

㉝補肝養榮湯　治血虛眩運。

當歸，川芎各二錢，甘菊花一錢，甘草五分，芍藥，熟地黃，陳皮各一錢半。水二鍾，煎八分，食前服。若腎虛氣不降者，去菊花，入前補腎湯。

（三五）防風通聖散河間 治頭痛[illegible]

防風，川芎，當歸，芍藥，大黃，麻黃去節，薄荷，連翹，芒硝各半兩，滑石三兩，甘草二兩，石膏[illegible]黃芩，桔梗各一兩，荊芥，白朮，梔子各二錢半。右爲末，每服二錢，水一大盞生薑三片煎至六分溫服。涎嗽加半夏製半兩，不可無生薑同煎。

（三六）搜風丸 治邪氣上逆，風熱上攻，頭目眩運，大小便祕結。

人參，薄荷，茯苓，南星各半兩，牽牛二兩，蛤粉，大黃，黃芩，滑石各二兩，寒水石，半夏，乾薑，白礬生各一兩，藿香二錢五分。右爲末滴水丸小豆大，每服十丸生薑湯下，加至二十丸，日三服。

（三七）白朮附子湯仲景 治風虛頭重眩，苦極不知食味。

白朮二兩，附子一兩半炮去皮，甘草炙一兩，每服五錢，薑五片，棗一枚，水一鍾半，煎至七分，去查溫服。

（三八）沉香磁石丸 治上重下虛，頭目眩運，耳鳴耳聾。

沉香別碎，蔓荊子，青鹽研，甘菊花各半兩，巴戟去心，胡盧巴。山藥炒，陽起石火煅研，川椒去目炒，山茱萸去核，附子炮去皮臍，磁石火煅醋淬細研水飛各一兩。右爲細末，用酒煮米糊和丸梧子大，每服五十丸，加至七十丸，空心用鹽湯送下。

（三九）控涎丹三因方 治痰眩。

甘遂去心，紫大戟去皮，白芥子眞者各等分。右爲末，煮糊丸如桐子大，曬乾，臨臥淡薑湯或熟水下五七丸至十丸。痰猛氣實，加丸數不妨。

（四〇）選奇湯東垣 治風火頭痛眩運。

酒黃芩一錢，冬不用，如能食熱痛者加之 防風，羌活，甘草各三錢。夏生冬炙。 每服三錢，水煎稍熱，食後時時服。

（四一）上清散奇效良方 治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者。

細辛半兩，羚羊角屑，旋覆花，紫菀，石膏，甘草炙各一兩，前胡七錢半，犀角屑二錢五分。右㕮咀每服三錢，水一盞生薑三片棗一枚，煎七分，去查食後溫服。

㉛人參丸　治風頭旋目眩，痰逆惡心胷膈痞滯，咳嗽痰涎，喘滿嘔逆，不欲飲食。

人參，白朮土炒，旋覆花炒，甘草炙各一兩，麥冬焙，枳殼麩炒，前胡各二兩，木香半兩。右爲細末，湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸，食後，溫生薑湯下。

㉜祛痰丸　治風頭旋，痰逆惡心，胷膈不利。

南星生，半夏生，赤茯苓去皮，陳皮去白，乾薑炮各等分。右爲細末，麵糊丸如梧子大，每服五十丸，不拘時，溫米飲送下。

㉝天南星丸　治風虛痰，頭目旋運，肢節拘急。

南星炮，附子炮去皮臍，白附子炮，旋覆花　細辛，半夏湯泡，芎藭各半兩，天麻一兩。右爲細末，麵糊丸如梧子大每服三十丸，加至五十丸，不拘時，用荊芥薄荷煎湯下。

㉞青黛散子和　治頭痛眩運。

猪牙皂角一箇，延胡索一分，青黛少許。右爲末，水調豆許，鼻內灌之，其涎自出，先仰臥灌鼻，俟喉中酸味，卽起身涎出，口咬銅錢一文任流下。

㉟神芎散　治一切風熱上攻，頭目眩痛，上壅鼻塞，并牙關悶痛。

川芎，鬱金，荊芥，薄荷，紅豆各等分。右爲細末入盆硝研勻，鼻內嗃之，力慢加藥。

㊱鬱金散　治頭痛眩運，

[illegible]服一二錢，空心用薑汁調服，此木鬱達之之法也。若胷中有宿痰，宜瓜

即桂枝麻黃二湯合爲一方也。右服法同桂枝湯

[illegible]不拘時[illegible]或冷水調下

(四〇)人參半夏丸 寶鑑 化痰墜涎止嗽定喘療風痰食痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭痛
或風壅頭目昏眩，或耳鳴鼻塞咽乾，胸膈不利。

人參，白茯苓，南星，薄荷各半兩，寒水石，白礬生用，半夏，薑屑各一兩，藿香二錢半，蛤粉二兩。右爲末，米麵糊爲丸，如桐子大，每服三十丸，薑湯下，食後日三服。白湯亦得。一方加黃連半兩，黃蘗二兩，尤效。又治酒病，調和臟腑殊妙。

(四一)芎芷香蘇散 得效方 治證同上。

川芎七錢，半夏六錢，枳殼三錢，甘草二錢，陳皮三錢半，桔梗二錢半，紫蘇葉，白茯苓，乾葛，柴胡各半兩。每服三錢，水一盞，薑三片，棗一枚，煎八分，不拘時溫服。

(四二)新法半夏湯 和劑方 治脾胃氣弱，痰飲不散，嘔逆酸水，腹脅脹痞，頭眩惡心，不思飲食。

縮砂仁，神麴炒，陳皮去白，草菓仁各一兩，白豆蔻仁，丁香各半兩，甘草二兩半生半炙，大半夏四兩，湯洗七次，切作兩片，白礬末一兩，沸湯浸一晝夜，洗去礬，俟乾，一片切作兩片，薑汁浸一晝夜，隔湯頓焙乾爲末，薑汁拌成餅，炙黃用。 右爲細末，每服二錢，先用生薑自然汁調成膏，入炒鹽湯，不拘時點服。

(四三)川芎散 子和

香附子炒，川芎，石膏水飛，白芷，甘草，薄荷各一兩，川烏半兩，炮去皮臍。 右爲細末，每服二錢，溫酒茶清調下無時。

(四四)萬全散 治瘴氣時毒，大頭疔瘡，蛇犬咬等證。

嫩柏根，水坑根，狸咬根，烏苞根，青王乂，生藍葉，溪楓根，穿山蜈蚣。 右薄荷煎服，及調雄黃末服，或合七神散最妙。

川芎，鬱金，芍藥，荊芥穗，芒硝各半兩，薄荷葉。乳香，沒藥各一錢，片腦半錢。右爲細末，每用一字，鼻內嗃之，若眉心并眉梁骨疼者，用二陳湯煎飲下青州白丸子立驗。

(三四)胃風湯東垣 胃風者，胃虛而風邪乘之也。風屬肝木，能剋脾土，故頭痛眩，此方主之。

柴胡，羌活，草豆蔻，藁本，蒼朮，蔓荊子，黃蘗，當歸，炙草各五分。麻黃不去節，葛根各一錢，升麻，白芷各一錢二分，加薑棗煎。

(三五)九味羌活湯元素 治傷寒傷風，憎寒壯熱，頭痛身痛，項痛脊強，嘔吐口渴，太陽無汗，及感冒四時不正之氣，溫病熱病。

羌活，防風，藁本各錢半，細辛五分，川芎，白芷，生地黃，黃芩，甘草各一錢，加生薑葱白煎。如風證自汗者，加白朮黃芪。胸滿去地黃，加枳殼桔梗。喘加杏仁。夏加石膏知母。汗下兼行加大黃。

(三六)麻黃湯仲景下同 治傷寒太陽證，邪氣在表，發熱頭痛，身痛腰痛，骨節痛，項背強，惡寒惡風。

麻黃去節三兩，桂枝二兩，杏仁去皮尖及雙仁者七十枚，甘草炙一兩。先煑麻黃數沸去沫，內諸藥煎，熱服，覆取微汗，中病卽止，不必盡劑，無汗再服。

(三七)桂枝湯 治太陽中風，陽浮而陰弱，發熱頭痛，自汗，惡風惡寒，鼻鳴乾嘔。

桂枝，芍藥，生薑各三兩，甘草炙二兩，大棗十二枚，熱服須臾，啜熱稀粥，以助藥力，溫覆取微似汗，不可令如水淋漓。汗出病差，停後服，服一劑盡，病證猶在者，更作服。

(三八)桂枝麻黃各半湯

卽桂枝麻黃二湯合爲一方也。右服法同桂枝湯

(三九)十味香薷飲百一 消暑氣，和脾胃，清頭目，止痛眩。

㉜逍遙散局方　治血虛肝燥骨蒸勞熱咳嗽潮熱往來寒熱口乾便澀月經不調頭熱目眩

當歸酒拌，　白芍酒炒，　白朮土炒，　柴胡　茯苓各一錢，　炙甘草五分，　加煨薑薄荷煎。

㉝二陳湯　治痰飲爲患或嘔逆惡心或頭眩心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃不和，並宜服之。

半夏湯洗七次，　橘紅各五兩，　白茯苓三兩，　炙甘草一兩半。　右㕮咀每服四錢，水一盞，薑七片，烏梅一枚，煎六分，不拘時熱服。

㉞香薷散　治一切感冒暑氣，皮膚蒸熱，頭痛頭重，自汗肢倦，或煩渴或吐瀉。

厚朴去皮，薑汁炒，　黃連，薑汁炒，　香薷四兩，　甘草半兩。　右爲末，每服四錢，水煎不犯鐵器，慢火煎之，井中沉令極冷，頓服之乃效。

㉟升麻湯局方　治頭重痛。

升麻一兩，　蒼朮一兩，　荷葉一箇全者。　右爲細末，每服五錢，水一盞，煎七分，溫服，食後或燒全荷葉一箇，研細，調煎藥服亦妙。

㊱芎星湯　治一切風虛寒痰，頭痛目眩。

附子生去皮臍，　烏頭生，　南星，　乾薑　川芎，　甘草炙，　細辛等分。　右剉每服四錢，薑五片，芽茶少許，煎服。

㊲導痰丸　治痰火眩運

法製硝同萊菔水煮化，去蔔滓，濾令結入臘月牛膽內風化五錢，一作一兩，只風化硝亦可。　礞石二兩，搥碎，　焰硝二兩，同礞石入小砂罐內，瓦片蓋之，鐵線縛定，鹽泥固濟，曬乾火煅紅，候冷取出。　右爲末，神麴糊丸梧子大，每服三五十丸，白湯下。

㊺七神散　治證同上。

紫花子，紫金藤，金腦香，大小青，仙人薯，土木香，百丈光，即土人參。右薄荷煎，去查，調雄黃末服。

㊻瀉青丸　治頭風屑。

當歸焙，草龍膽焙，川芎，川大黃煨，梔子，羌活，防風。右各等分爲末，煉蜜爲丸，雞頭大，每服一丸，煎竹葉湯同砂糖溫水化下。

㊼人參消風散　寶鑑　治諸風上攻，頭目昏痛，項背拘急，肢體煩疼，肌肉蠕動，目眩旋運，耳嘯蟬鳴，眼澀好睡，鼻塞多嚏，皮膚頑麻，燥癢癮疹。又治婦人血風，頭皮腫癢，眉骨疼旋欲倒，痰逆惡心。

芎藭，羌活，防風，人參，白茯苓，藿香葉，白殭蠶炒，荊芥，甘草炙，蟬殼去土各二兩，厚朴去皮薑製，陳皮去白各半兩。右爲細末，每服二錢，茶清調下。如久病偏頭風，每日三服，便覺輕減。如脫著沐浴，暴感風寒，頭痛聲重，寒熱倦疼，用荊芥茶清調下半盞。小兒虛風，目澀昏倦，及急慢驚風，用乳香荊芥湯調下亦得。

㊽紅豆散　治頭重

麻黃根炒，苦丁香各半錢，羌活燒，連翹各三錢，紅豆十粒。右五味爲細末，鼻內嗃之，又治頭內如蟲蛀響名天白蟻，用茶子細末吹鼻中。

㊾四君子湯　治一切陽虛氣弱，脾衰肺損，食少頭旋，體瘦面黃，皮聚毛落，脈來細軟。

人參，白朮土炒，茯苓各二錢，甘草一錢，薑三片，棗二枚煎。

㊿六君子湯　治氣虛痰眩，脾虛鼓脹。

即四君子湯，加半夏陳皮。

黃連四兩，薑汁同炒令黃色，白扁豆微炒半斤，香薷去土一斤，厚朴去皮薑汁炙熟半斤　右㕮咀每服三錢，水一盞入酒少許，煎七分沉冷，不拘時服。

(二五)祖傳經驗方正傳　治頭風熱痛，不可忍者。

黃芩二兩，酒拌炒三次，不可令焦。小川芎一兩，細茶芽三錢，薄荷葉二錢半，荊芥穗四錢，白芷半兩。

右爲細末，每服二錢，白湯或茶清調下。

(二六)加減芎辛湯醫鑑　治頭風攻目。

川芎，細辛，白芷，蔓荊子，藁本，牙皂角，羌活，防風，荊芥穗，桔梗，石膏，甘菊花，薄荷，甘草各五分。右剉作一貼，水煎服。

(二七)菊花茶調散丹溪心法　治頭風鼻塞，或偏正頭痛。

甘菊花，川芎，荊芥穗，羌活，白芷，甘草各一兩。防風七錢半，細辛五錢，蟬殼，薄荷，白殭蠶各二錢半。右爲細末，每服二錢，茶清食後調下。

（三八）一字散濟生方　治寒痰頭痛目眩。

雄黃，細莘各半兩　川烏尖生五箇。右爲細末，每服一字，薑汁茶芽煎湯，不拘時服。

（三九）芎附飲三因方　治肝氣上逆頭痛眩運

川芎二兩，香附四兩。右爲細末，每服二錢，不拘時，茶湯調服。

（四十）十四友丸　補諸虛理頭眩益氣血，斂心氣，治怔忡不寧，精神昏憒，睡臥不安。

柏子仁另研，遠志湯浸去心，酒灑蒸，熟地黃，酸棗仁炒香，紫石英明亮者，白茯苓去皮，茯神去木，人參，黃芪蜜炙，阿膠蛤粉炒，當歸酒洗，肉桂去粗皮各一兩　龍齒二兩　辰砂別研二錢半。右爲末，煉蜜丸如梧子大，每服三四十丸，食後棗湯送下。

（四一）羚羊角散　治一切頭眩。

羚羊角，茯神各二錢半，芎藭，防風，白芷，甘草，半夏湯洗各半兩，枳殼，附子各二錢半。右爲粗末，每服四錢，水一鍾，生薑五片，慢火煎七分。

（四二）消風散寶鑑　治諸風上攻，頭目昏痛，項背拘急，肢體煩疼，肌肉蠕動，目眩旋運，耳嘯蟬鳴，眼澀好睡，鼻塞多嚏，皮膚頑痲，燥癢癮疹，又治婦人血風，頭皮腫癢，眉骨疼，旋欲倒，痰逆惡心。

茯苓去皮，白殭蠶炒，藿香，荊芥穗，芎藭，羌活，防風，人參，甘草炙，蟬殼各二兩，厚朴去皮，薑製，陳皮去白各半兩。右爲細末，每服二錢，茶清調下。如久病偏頭風，每日三服，便覺輕減。如脫著沐浴，暴感風寒，頭痛聲重，寒熱倦疼，用荊芥茶清調下半盞。小兒虛風，目澀昏倦，及急慢驚風，用乳香荊芥湯調下亦得。

（四三）澤瀉白朮湯仲景　治水濕上蒸眩運。

澤瀉五兩，白朮二兩，水二升，煮一升，分溫再服。

醫部彙考一百二十七

頭門六

方三

(二六)養血祛風湯醫鑑　婦人頭風，十居其半，每發必掉眩，如立舟車之上，蓋因肝虛風襲故也。

川芎，防風，荊芥，羌活，蔓荊子，旋覆花，細辛，藁本，石膏，半夏，生乾地黃，當歸，甘草各五分。右剉作一貼，入薑三片，棗二枚，水煎服。

(二五)清運化痰湯　止眩運

橘紅，半夏製各一錢半，枳實麩炒，白朮，茯苓各一錢，黃芩酒炒，川芎各八分，白芷，羌活各七分，防風，細辛，南星製各六分，甘草三分。右剉一劑，生薑三片，水煎，以此作丸亦可。血虛加當歸一錢半，氣虛加人參七分，有熱加黃連六分。

(二四)黑將軍散祕方　治因痰火太盛，眩運難當。

大黃，酒炒為末，清茶調下，或用大黃酒浸，九蒸九曬為末，水丸如菉豆大，每服百丸，食後臨臥，清茶送下，神效。

(二三)仙朮通神散　治風熱上壅，頭旋目眩，起則欲倒。

麝香少許，茶芽一兩　川芎　細辛　荊芥　川烏　甘草各半兩　右㕮咀每服三錢水一盞煎七分去查，不拘時溫服。

(二六〇)烏翳散　治諸般頭疼不可忍者。

川烏炮去皮臍　御米殼蜜炒，橘皮各等分。　右㕮咀，每服三錢，水一盞半，煎七分，去查，不拘時溫服。

(二六一)韭根丸　治頭疼眼睛如刀刺。

全蝎糯米炒，　大川芎去皮尖，微炒各等分。　右爲細末，用韭根取汁，和丸如梧桐子大，每服十五丸，食後用薄荷茶清送下。

(二六二)烏香散　一名太乙麝香湯，治風邪客於腦，頭痛至甚，及偏正頭疼，夾腦風，連眉骨項頸上徹腮頤疼痛不可忍者。

草烏生一兩，一方鹽炒　新芽茶，　細辛去苗各二兩。　右剉如麻豆大，每服三錢，水一盞半，入眞麝香一捻同煎八分，去查熱服。一方無麝，共爲細末，茶清調下，食後服。

(二六三)玉女煎景岳全書　治水虧火盛，六脈浮洪滑大，少陰不足，陽明有餘，煩熱乾渴，頭痛目眩，牙疼失血等證，如神。若大便溏泄者，乃非所宜。

生石膏三五錢，　熟地三五錢或一兩，　知母，　牛膝各錢半，　麥冬二錢，　水一鍾半，煎七分，溫服，或冷服。　如火之盛極者，加梔子地骨皮之屬亦可。　如多汗多渴者，加北五味十四粒。　如小水不利，或火不能降者，加澤瀉一錢五分，或茯苓亦可。　如金水俱虧，因精損氣者，加人參二三錢尤妙。

(二六四)雙玉散　治熱痰，欬嗽喘急，煩渴頭痛。

石膏，　寒水石等分。　右爲極細末，每服三錢，人參湯或隨證用引調下。

防風，川芎，當歸，芍藥，大黃，薄荷葉，連翹，石膏，黃芩，桔梗，滑石麪，甘草，荊芥，白朮，梔子，藿香，砂仁，甘菊花，蒼朮。如風熱上攻頭目昏眩，悶痛，痰喘咳嗽，加甘菊花人參砂仁寒水石。

㉒碧雲散東垣　治頭痛。

細辛，鬱金，石膏，芒硝各一錢，薄荷二錢，青黛一錢五分，蔓荊子，川芎各一錢二分，紅豆一箇，

右爲極細末，口噙水鼻內嗃之。

㉓六合湯　治血虛風眩。

生地，當歸，川芎，白芍，秦艽，羌活，水煎服。凡失血過多，血虛眩運，只以芎歸二味煎服。

㉔天香散　治年久頭風不得愈者。

南星製，半夏製，川烏去皮，白芷各二錢。右作一服，水二鍾，加生薑自然汁小半盞，煎一盞，食遠服。

㉕麝香天麻丸　治風痰氣厥，頭疼，目眩旋運，四肢倦怠，精神不爽，睡臥不甯。

麝香二錢研，天麻酒浸，防風，芎藭各一兩，南星一枚，重一兩者，先用白礬湯泡洗七次，然後用水煮令軟，切片焙乾。甘菊花三分。右爲細末，煉蜜和丸如雞頭實大，每服一丸，不拘時細嚼，荊芥湯送下。

㉖吳茱萸湯仲景　治嘔涎頭痛。

人參一兩，吳茱萸一升，棗二十枚，生薑一大兩，右以水五升，煎取三升，每服七合，日三服。

㉗通頂烟　治諸頭風如斧劈，痛不可忍者。

川烏一兩，右爲末，燒烟熏椀內，熱茶清泡椀內烟氣，服之大效。

㉘石膏鼠黏子散　治偏正頭疼連眼疼。

三錢　如有脹悶加陳皮一錢　如腰膝筋骨無力加杜仲牛膝

(五一)左歸飲　此壯水之劑也。凡頭目痛，眩係命門之陰衰陽勝者，宜此方加減主之。

熟地二三錢或至一二兩，　山藥，　枸杞各二錢，　山茱萸一二錢，畏酸者少用之。　茯苓錢半，　炙甘草一錢，　水二鍾煎七分食遠服。

(五二)五福飲　凡五臟氣血虧損而眩運者，此能兼治之，足稱王道之最。

人參，　熟地黃各隨宜，　當歸二三錢，　白朮炒一錢半，　炙甘草一錢，　水二鍾煎七分，食遠溫服。或加生薑三五片。凡治氣血俱虛等證，以此爲主。或宜溫者加薑附，宜散者加升麻柴葛。

(五三)加減一陰煎　火之甚者，宜用此方。

生地黃，　芍藥，　麥冬各二錢，　熟地黃三五錢，　知母，　地骨皮各一錢，　炙甘草五七分，　水二鍾煎服。　如躁煩熱甚便結者，加石膏二三錢。　如小水熱澀者，加梔子一二錢。　如火浮於上者，加澤瀉一二錢，或黃芩一錢。如如血燥血少者，加當歸一二錢。

(五四)金水六君煎　治肺腎虛寒，水泛爲痰，或年邁陰虛，血氣不足，外受風寒，欬嗽嘔惡，多痰喘急，頭痛目眩等證，神效。

熟地黃三五錢，　陳皮一錢半，　半夏，　當歸，　茯苓各二錢，　炙甘草一錢，　水二鍾，生薑三五七片，煎七八分，食遠溫服。　如大便不實而多濕者，去當歸，加山藥。　如痰盛氣滯，胸脅不快者，加白芥子七八分。　如陰寒盛而嗽不愈者，加細辛五七分。　如兼表邪寒熱者，加柴胡一二錢。

(五五)六安煎　治風寒欬嗽，頭痛頭旋。

陳皮一錢半，　半夏二三錢，　茯苓二錢，　甘草，　杏仁各一錢，去皮尖研，　白芥子五七分，老年氣弱者不用。　水一

(二六五)吹鼻六神散　治頭腦疼痛。

焰硝提淨五錢，白芷，雄黃另研，乳香製，沒藥製，薄荷葉各一錢。右為細末，磁罐收貯，左吹左，右吹右，先令病人口含水吹之其氣上行須臾覺效或兩鼻皆吹之。

(二六六)六味地黃丸　治腎水虧損小便淋閉，頭目眩運，壯水制火之劑也。

熟地黃八兩蒸擣，山茱萸肉，山藥炒各四兩，丹皮，澤瀉，白茯苓各三兩。右為細末和地黃膏加煉蜜為丸，桐子大每服七八十丸空心食前滚白湯或淡鹽湯任下。

(二六七)四物湯局方　治血虛營弱，一切血病眩運，當以此為主。

熟地黃，當歸各三錢，川芎一錢，芍藥二錢，水二鍾煎服。

(二六八)三聖散　治男婦頭痛不論新久但夏月欲重綿包裹者並效。

鬧楊花淨末，槿樹花淨末各一錢，大楓子白肉去油五分，共研，每服六分，葱酒調服，洗浴發汗自愈。

(二六九)人黃散正傳　治四時疫癘大頭天行等病。

糞缸鹼置風露中，年遠者水飛一兩，甘草三錢，辰砂，雄黃各一錢半。右為細末，每服二錢，煎薄荷桔梗湯送下。日三五服。煎藥甘草桔梗茯苓藁本白朮各半錢，水煎服。大頭天行病，從頤頷腫熱者，又名鸕鷀瘟，東垣有方用羌活，酒炒黃芩，酒蒸大黃，加減水煎服，十五六日服小柴胡湯，不愈者，仍用陳皮紫蘇發散而愈。又法酒炒黃芩黃連為君，炙甘草為佐，水煎細細呷之，再加鼠黏子酒蒸大黃煎入芒硝，亦細細頻與服之，微利為度，腫減後去後三味只服前藥。屬少陽加瓜蔞根，若陽明加升麻芍藥葛根甘草，太陽羌活荊芥防風，頭痛加黃芩。

(二七〇)三陰煎景岳全書下同　此治肝脾虛損，精血不足及營虛失血，頭痛目眩等病，故曰三陰有火者宜一陰煎，無火者宜此主之。

人參隨宜，水二鍾煎七分，食遠服。

或面赤舌焦，或雖渴而不喜熱飲，或背心肢體畏寒，但脈見無力者，悉是假熱之證。若用寒涼攻之必死，宜速用此湯，照後加減，以溫補陰分，托散表邪，連進數服，使陰氣漸充，則汗從陰發，而寒邪不攻自散，此最切於時用者也，神效不可盡述。

熟地黃三五七錢或一二兩，　當歸二三錢或五七錢，　乾薑炒黃色一二三錢，　炙甘草一二錢，　水二鍾，煎七八分熱服。或加肉桂一二錢，此方加附子，即名附子理陰煎；再加人參，即名六味回陽飲，治命門火衰，陰中無陽等證。若風寒外感，邪未入深，但見發熱身痛，脈數不洪，凡內無火證，素稟不足者，但用此湯加柴胡一錢半或二錢，連進一二服，其效如神。若寒凝陰盛而邪有難解者，必加麻黃一二錢，放心用之，或不用柴胡亦可，恐其清利也。此寒邪初感溫散第一方，惟仲景獨知此義。第仲景之溫散，首用麻黃桂枝二湯，余之溫散，即以理陰煎及大溫中飲爲增減，此雖一從陽分，一從陰分，其跡若異，然一逐於外，一托於內，而用溫則一也。學者當因所宜，酌而用之。　若陰勝之時，外感寒邪，脈細惡寒，或背畏寒者，乃太陽少陰證也，加細辛一二錢，甚者再加附子一二錢，眞神劑也。或并加柴胡以助之亦可。　若陰虛火盛，其有內熱不宜用溫，而氣血俱虛，邪不能解者，宜去薑桂，單以二味加減與之。或止加人參亦可。　若治脾腎兩虛，水泛爲痰，或嘔或脹者，於前方加茯苓一錢半，或加白芥子五分以行之。　若泄瀉不止，及腎泄者，少用當歸，或并去之，加山藥、扁豆、吳茱萸、破故紙、肉豆蔻、附子之屬。若腰腹有痛，加杜仲、枸杞。

若腹有脹滯疼痛，加陳皮、木香、砂仁之屬。

㊂五君子煎　治脾胃虛寒，嘔吐泄瀉，頭重頭眩，而兼濕者。

人參二三錢，　白朮土炒，　茯苓各二錢，　炙甘草一錢，　乾薑炒黃一二錢，　水一鍾半煎服。

㊂內疏黃連湯保命集下同　治腦疽嘔呃，心逆發熱而煩，脈沉而實，腫硬水悶，而皮肉不變色，根深大病在內，臟腑祕澀，當急疏利之。

鍾半加生薑三五七片，煎七分食遠服。凡外感風邪欬嗽而寒氣盛者，多不易散，宜加北細辛七八分或一錢。若冬月嚴寒邪盛者加麻黃桂枝亦可。若風勝而邪不甚者加防風一錢，或蘇葉亦可。若頭痛鼻塞者，加川芎白芷蔓荊子皆可。若兼寒熱者加柴胡蘇葉。若風邪欬嗽不止而兼肺胃之火者，加黃芩一二錢。甚者再加知母石膏所用生薑只宜一片。凡寒邪欬嗽痰不利者，加當歸二三錢。老年者尤宜。若氣血不足者當以金水六君煎與此參用。

㉒和胃飲　治寒濕傷脾霍亂吐瀉，及痰飲水氣，胃脘不清，嘔惡脹滿，頭運腹痛等證。此即平胃散之變方也。凡嘔吐等證多有胃氣虛者，一聞蒼朮之氣亦能動嘔，故以乾薑代之。

陳皮，　厚朴各一錢半，　乾薑炮一二錢，　炙甘草一錢　水一鍾半，煎七分溫服。此方凡藿香木香丁香茯苓半夏扁豆砂仁澤瀉之類，皆可隨宜增用之。若胸腹有滯而兼時氣寒熱者，加柴胡。

㉓清膈煎　治痰因火動，氣壅喘滿，內熱煩渴，上盛眩運等證。

陳皮錢半，　貝母二三錢，微敲破，　膽星一二錢，　海石，　木通各二錢，　白芥子五七分，　水一鍾半，煎七分溫服。　如火盛痰不降者，加童便一小鍾。　如渴甚者，加天花粉一錢。　如熱及下焦小水不利者，加梔子一錢半。如熱在上焦頭面紅赤，煩渴喜冷者，加生石膏二三錢。　如痰火上壅而小水不利者，加澤瀉一二錢。　如痰火閉結，大便不通而兼脹滿者，加大黃數錢，或朴硝一二錢，酌宜用之。

㉔滋陰八味煎　治陰虛火盛，頭痛頭旋，下焦濕熱等證。此方變丸爲湯，即名滋陰八味煎。

山藥，　山萸肉各四兩，　丹皮，　白茯苓，　澤瀉，　黃蘗鹽水炒，　知母鹽水炒各三兩，　熟地黃八兩蒸搗。　右加煉蜜搗丸梧桐子大，或空心或午前用滾白湯或淡鹽湯送下百餘丸。

㉕理陰煎　此理中湯之變方也。凡脾腎中虛以致眩運等證，宜剛燥者，當用理中六君之類；宜溫潤

大蒜去皮，切三文錢厚。右安瘡頭上用艾壯於蒜上灸之三壯換蒜復灸未成者即消已成者亦殺其大勢不能為害如瘡大用蒜搗爛攤患處將艾鋪上燒之蒜敗再換如不痛或不作膿及不起發或陰瘡尤宜多灸灸而仍不痛不作膿不起發者不治此氣血虛極也。

㉗十宣散　治頭瘡脈緩濇，身倦怠，惡寒，或脈弦，或緊細者，皆宜用之。散風寒，助陽氣也。

人參，當歸酒拌，黃芪鹽水炒各一錢　白芷，川芎，甘草炙　桔梗各一錢　厚朴薑製五分，防風，肉桂各三分，作一劑，水二鍾煎八分服。

㉘槐花酒　治發背腦疽及一切瘡毒，不問已成未成，但焮痛者並治之。用槐花四五兩，微炒黃乘熱入酒二鍾，十餘沸，去查熱服。未成者二三服，已成者一二服。

㉙清涼飲　治積熱腦瘡，煩躁飲冷，焮痛脈實，大便閉結，小便赤澀。

大黃炒，赤芍藥，當歸，甘草各二錢，作一劑，用水二鍾，煎八分，食前服。

㉚仙方活命飲　治腦疽未作膿者，內消，已成膿者，即潰，此排膿止痛消毒之聖藥也。

穿山甲，蛤粉炒黃色，甘草節，防風，赤芍藥，沒藥，白芷，當歸尾，乳香，皂刺炒各一錢，天花粉，貝母各八分。金銀花，陳皮各三錢。作一劑用酒一椀同入瓶內紙糊瓶口弗令泄氣慢火煎數沸去查分病在上下，食前後服之。能飲酒者，再飲二三杯尤好。

㉛人參敗毒散　治腦疽焮痛發寒熱，或拘急頭痛，脈數有力。

人參，羌活，獨活，前胡，柴胡，白茯苓，桔梗，枳殼，川芎，甘草各　錢，作一劑，用水二鍾，煎八分，食遠服。

㉜五香連翹湯　治腦疽，初覺一二日便厥逆，咽喉閉塞，寒熱。

黃連，白芍藥，當歸身，檳榔，木香，黃芩，薄荷，桔梗，甘草，山梔各一兩，連翹二兩。右除檳榔木香二味爲細末外，並剉每服一兩，水一盞半，煎至一盞，先喫一二服，次每服加大黃一錢，再服加一錢，以利爲度。如有熱證，止服黃連湯，大便祕澀，加大黃，覺無熱證，少煎沒藥，內托復煎散，時時服之，如實無熱及大小便通，止服復煎散，稍有熱證，却服黃連湯。祕則加大黃。如此內外皆通，營衛和調，則經絡自不遏絕矣。

㊂內托復煎散　治腦疽焮腫於外，根盤不深，形證在表，其脈多浮，痛在皮肉，邪氣盛則必侵於內，急須內托以救其裏也。

黃芪，芍藥，黃芩，白朮土炒，茯苓，人參，甘草，柳桂，地骨皮，防己，當歸各一兩，防風二兩。

右㕮咀，先煎蒼朮一斤，用水五升，煎至三升，去朮滓，入前藥十二味，再煎至三四盞，絞取清汁，作三四服，終日服之。又煎蒼朮滓爲湯，去滓，再依前煎服十二味滓。此除濕散鬱熱，使胃氣和平，如或未已，再作半料服之。若大便祕及煩熱，少服黃連湯。如微利及煩熱已過，却服復煎散半料，如此使營衛俱行，邪氣不能內侵也。

㊂當歸黃芪湯　治頭項瘡瘍，臟腑已行，而痛不可忍者。

當歸，黃芪，地黃，地骨皮，川芎，芍藥等分。右㕮咀每服一兩，水一椀，煎至五分，去滓溫服。如發熱者加黃芩。煩熱不能臥者加梔子。如嘔，是濕氣侵胃也。

㊂升麻牛蒡子散　治時毒頭面腫，及項胷膈有瘡，脈浮洪，表候者。

升麻，牛蒡子，桔梗，生甘草，葛根，元參，麻黃，連翹各一錢。右咀薑三片，水二盞，煎八分，取微汗。

㊂二神丸　治腦疽脾胃虛弱，飲食不消，大便溏泄，必服之。

破故紙四兩，微炒黃色，肉果肥大者二兩，生用。用大棗四十九枚，老生薑四兩，切片，水淒棗薑煎至水乾爲度。取棗肉爲丸，桐子大，每服七十丸，清米湯空心送下。

棗二枚，煎八分，食前服。

㊳葛根牛蒡子湯　治時毒腫痛，脈數而少力者。

葛根，　管仲，　甘草　江西豆豉，　牛蒡子半生杵炒各二錢，　作一劑，水一鍾半，煎八分，食後服。

㊴梔子仁湯　治時毒腫痛，大便祕結，脈沉數。

鬱金，　枳殼麩炒去穰，　山梔仁炒，　牛蒡子炒，　升麻，　大黃煨各等分。　右爲細末，每服三錢，蜜水調下。

㊵五利大黃湯　治時毒焮腫赤痛，煩渴便祕，脈實數。

大黃煨，　黃芩，　升麻各二錢，　芒硝，　梔子各一錢二分，　作一劑，水一鍾半，煎六分，空心熱服。

㊶國老膏　治腦疽，及一切癰疽，能消腫逐毒，使毒不內攻，其效不可具述。

甘草大者二斤。　右搥碎，河水浸一宿，揉令漿汁濃，去盡筋滓，再用絹濾過銀石器內，慢火熬成膏，用器收之。每服一二匙，無灰酒或白湯亦可。曾服燥藥丹劑者，亦解之。按本事方，每甘草一斤，分作三服，溫酒調下，今云一二匙，恐力少也。

㊷黃連清熱消毒散　治腦疽。

黃連，　黃芩，　黃檗酒洗，　人參，　獨活，　防風，　藁本，　甘草炙，　當歸梢，　蘇木，　甘草梢生，　陳皮各五分，　知母酒炒四分，　桔梗，　連翹，　羌活，　防己酒洗，　黃芪，　當歸身酒洗，　生地黃酒洗各一錢，　澤瀉七分。　右俱作一服，水三盞煎，減一半，去滓入酒少許，再煎，食後溫服。投劑之後，不得飲水，必再作膿，效遲。初患三日者，服之立效。

㊸羌活當歸湯　治腦疽。

黃芩酒炒，　黃連酒炒，　當歸身酒浸，　炙甘草各一兩，　防風，　梔子仁，　羌活，　黃檗酒浸，　連翹各五分，

沉香，木香，麝香另研，連翹，射干，升麻，丁香，獨活，桑寄生，甘草炙各一錢，大黃，木通，乳香各一錢五分。每服五錢，水一鍾，煎八分，溫服取利。

㉝托裏散 治腦疽，飲食少思，或不腐，不收斂。

人參，黃芪鹽水拌炒，川芎，白朮炒，茯苓，當歸酒拌，芍藥各一錢，厚朴薑製，白芷，甘草各五分，作一劑，水二鍾，煎八分服。

㉞加減八味丸 治腦疽瘥後，及將瘥，口乾渴，甚則舌或生黃，及未患先渴，此腎水枯竭，不能上潤，以致心火上炎，水火不能既濟，故心煩躁作渴，小便頻數，或白濁陰痿，飲食不多，肌膚漸消，或腿腫脚先瘦，服此以生腎水，降心火，諸證頓止。

五味子炒二兩半，山茱萸肉酒浸杵膏，山藥各一兩，熟地八兩，酒拌，銅器蒸半日搗膏，丹皮，桂心去皮，澤瀉切片蒸焙，白茯苓各半兩，爲細末，入二膏，加煉蜜少許，丸梧子大，每服六七十丸，五更初未言語前，或空心用鹽湯送下。

㉟參苓白朮散 治頭瘡，脾胃不和，飲食不進，或嘔吐泄瀉，凡大病後，皆宜服此藥，以調理脾胃。

人參，白茯苓，白扁豆薑汁拌炒，薏苡仁炒，白朮土炒，蓮肉去心皮，砂仁炒，桔梗炒，山藥，甘草炙各二兩，爲細末，每服三錢，用石菖蒲煎湯下。

㊱托裏消毒散 治頭瘡已攻發不消者，宜服此藥，未成即消，已成即潰，腐肉易去，新肉易生。如有瘡口宜貼膏藥，斂即不用，切不可用生肌之藥。

人參，黃芪鹽水拌炒，當歸酒拌，白芍藥炒，川芎，白朮土炒，白茯苓各一錢，甘草五分，白芷，金銀花各七分，作一劑用水二鍾，煎至八分，瘡在上下，食前後服之。

麝香二錢　血竭[illegible]　蟾酥[illegible]

右爲極細末，煉蜜和丸爲劑。如瘡有頭者用鍼頭挑破，微有血出，將藥一黍米大，放挑開瘡內，上用紙花周圍唾津濕貼瘡上，不過時刻卽愈。忌雞鵝酒麪一切發熱之物。

㉜黃連救苦湯　外科正宗下同　治腦疽發鬢發頤及天行時毒，初起憎寒壯熱，頭面耳項俱腫，服之未成者卽消，已成者自潰。

黃連，　升麻，　乾葛，　柴胡　赤芍藥，　川芎，　歸尾，　連翹，　桔梗，　黃芩，　羌活，　金銀花，　防風，　甘草節各一錢，　水二椀，煎八分，臨服入酒一杯，食後服。

㉝解毒天漿散　治腦疽積毒日深，堅腫木硬，口燥舌乾，惡心煩渴，六脈沉實有力，大便閉結不通者，並宜服之。

石決明生研，　殭蠶，　山甲土炒，　連翹，　羌活，　乳香，　甘草，　金銀花，　黃連，　當歸尾各一錢，　天花粉新鮮未曬者四兩，石臼內搗爛，投水一椀，攪勻，絞去查用　大黃三錢，　防風一錢，　右花粉淨汁一椀半，同藥煎至八分，入酒一杯，空心熱服。行過三次，方用飲食，忌食煎炒發物。

㉞內托千金散　治腦疽發背諸毒，惡瘡已成不消者，服之易潰。

白芍藥，　黃芪製，　川芎，　當歸，　防風　桔梗，　人參　天花粉　金銀花各一錢，　肉桂，　白芷，　甘草各五分，　乳香，　沒藥二味，痛甚加入。　右水二椀，煎八分，臨服入酒一小杯，食遠服。

㉟迴毒銀花散　治腦疽，及一切發陰瘡不起，色變紫黑者，急宜服之。

金銀花連枝葉二兩　黃芪生四兩，　甘草生一兩。　右咀用細酒二十兩，同藥入小口砂罐內，密封，重湯內煮，盡三香爲度。取起濾淸服之，蓋煖患上，其瘡漸漸高腫，此轉陰爲陽吉矣。後用托藥潰膿，如服後不痛，不起，瘡頭流出

澤瀉，獨活，藁本各三錢，右㕮咀分作四服，水一小椀，先浸一時許，入酒一匙，煎至八分，去查，大温服，食後日二服，和查計六服，三日服盡，去查，清藥調下後檳榔散。

㉞檳榔散　治腦疽。

檳榔。右爲細末，將羌活當歸湯調下。

㉟松脂膏　治頭瘡經年月不瘥。

松脂，黃連各七錢半，黃芩，苦參各一兩，蛇牀子二錢半，大黃，白礬枯各半兩，水銀一兩半，胡粉半兩，合水銀入少水同研，令無星爲度。右爲細末，研勻，用臘猪脂調傅瘡上，大效。

㊱貝母膏　治頭㿉瘡。

貝母，半夏生，南星，五倍子，白芷，黃蘗，苦參各二錢半，虢丹煅一錢半，雄黃一錢。右爲細末，先以蜂房白芷苦參大腹皮荊芥煎湯，熏洗拭乾，即用蜜水調傅兩三次，後乾摻藥。

㊲加味平胃散　治一切惡瘡頭上瘡。

蒼朮二錢，厚朴，陳皮，甘草各一錢，爲細末，加入膩粉，清油調傅之，甚妙。

㊳螵蛸散　治頭上生瘡，俗曰粘瘡。

海螵蛸二錢，白膠香，輕粉各半兩，爲細末研勻，先用清油潤瘡，後摻藥只一上可。

㊴漏蘆湯　治頭上惡瘡，并腦疽。

生黃芪，連翹，沉香，漏蘆各一兩，粉甘草半兩，大黃一兩。右爲細末，每服二錢，薑棗湯調下。

㊵防風通聖散　治癩頭瘡。

防風，荊芥，連翹，麻黃，薄荷葉，川芎，當歸，白芍，白朮，炒山梔，大黃酒蒸，芒硝各五錢，石

人參　白朮　熟地黃各五錢　歸身　天門冬　枸杞各三錢　杜仲　遠志各二錢五分，木[illegible]
寬貯，以無灰好酒五斤，磁罐內浸至一伏時，每早午晚各飲一杯，熱服。如夏月天炎易壞，不堪久服，將藥分作五分，每次用酒一斤，隨便浸服亦效。如酒將完，藥尚有味，再添酒浸飲之。若藥淡無味，不必再浸。

（二三）桑木灸法　治諸瘡毒堅而不潰，潰而不腐，新肉不生，疼痛不止。

新桑木長七寸，擘指大，一頭燃著，向患上灸之，火盡再換，每次灸木五六條，肉腐爲度。

（二四）神妙拔根方　治腦疽發背陰證初起，不腫高，不焮熱，灸不疼，其病將來難愈，必致壞人，十日以前，用披鍼當頂插入，知痛處方止，隨用蟾酥條插至孔底，每日二條，膏蓋，三日後加添插藥，其根高腫作疼，外用神燈照法，轉陰爲陽，插照七日，其瘡裂縫流膿，至十三日，其根自脫。如日多根深蔕固不能脫者，披鍼取之，內用玉紅膏，不脫者自脫，不斂者自斂，此法百人百活，再無不愈者。

（二五）三品一條鎗　上品去十八般痔，中品去五漏翻花癭瘤氣核，下品治瘰癧疔瘡發背癰疽等證。此爲古之三品。錠子藥同而分兩不同，治病故有分別。今注一條鎗本方三品，以上之證並皆用之，俱各相應，況又藥品簡易而不繁，是曰三品一條鎗之說也。

（二六）上品

明礬二兩，　信石一兩五分，　雄黃三錢，　乳香，　沒藥各三錢五分。

（二七）中品

白礬二兩，　信石一兩三錢，　雄黃二錢，　乳香，　沒藥各三錢。

（二八）下品

白礬二兩，　信石一兩五錢，　雄黃一錢，　乳香，　沒藥各二錢五分。　砒礬二味，共爲細末，入小罐內，加炭火煅

黑水，此眞陰不治。

（三六）梅花五氣丹　治腦疽發背諸般疔腫初起，寒熱交作，筋骨疼痛，有似傷風惡心嘔吐，但未成膿者，並宜服之。

梅花片，麝香各五分，輕粉，辰砂各六分，乳香，沒藥，血竭，明雄黃各一錢，眞蟾酥二錢，端午日用頭男乳調膏。　右前藥各研極細，對準分數，於端午日辰時製度，候至午時，將上藥九味，和入蟾酥膏內，向日丸之，如茄子大，一時內曬乾，用川椒二十七粒，燈心二十七段，同藥收於磁罐內養之，以蠟封口，不泄藥氣爲妙。凡遇惡瘡大毒，開器取出一枚，先用美饌食飽，次用無根水漱淨口內，中含水一口，少頃待溫，用葱白五寸，同水嚼爛嚥下，隨將藥餅安放舌下，睡於煖處，以被覆蓋，藥化苦水，徐徐嚥之。瘡勢大者二三餅亦可。藥盡其汗卽到，如淋，諸病若失。如冬月天寒難汗，嚥後將葱白湯催之亦妙。凡治無有不效。如暗疔人所不知覺，及知覺而大危者，毒氣入裏，人便昏沉，一中便倒，不能依法服藥，急用連鬚葱白七箇，煎酒一杯，研藥五餅灌下，藥氣到心，其功如湯潑雪，患者卽便甦醒，此爲外科第一奇方也。

（三七）小保安湯　治腦疽及一切發已潰流膿時，平常服之，庶不更變。

人參，白朮，當歸身，白茯苓，川芎，黃芪，陳皮，桔梗，麥門冬各一錢　半夏，甘草，藿香各五分，薑三片，棗二枚，水二茶杯，煎八分，食遠服。

（三八）大保安湯　治腦項及一切發癰疽惡瘡大毒已潰之後，膿水出多，氣血虛弱，精神短少，飲食少思，坐臥不甯，煩躁不眠，晝則安靜，夜則發熱，及大病後虛陽煩渴等證。

人參，白朮，當歸，白茯苓，川芎，白芍藥，山茱萸肉，黃芪，山藥，牡丹皮，熟地黃，五味子各一錢，肉桂，甘草，麥門冬，熟附子各五分，煨薑三片，大棗二枚，蓮肉七粒，水煎，食前後服。

攪看似膏鎔化之象，方算熬熟淨油一斤，將飛過黃丹六兩五錢，徐徐投入，少加火些，[illegible]
錢，不住手攪，候鍋內先發青烟，後至白烟疊疊旋起，氣味香馥者，其膏已成，即便住火。將膏滴入水中，試軟硬得中，如老加熟油，若稀亦加炒丹，每各少許，漸漸加火，務要冬夏老嫩得宜為佳。候烟盡，掇下鍋來，方下阿魏，切成薄片，散於膏面上，化盡，次下乳沒輕粉，攪勻，傾入水內，以柳棍摟成一塊，再換冷水浸片時，乘溫每膏半斤，扯拔百轉成塊，又換冷水投浸，隨用時每取一塊，銅杓內復化，隨便攤貼至妙。

㊂天麻餅子 瘡瘍全書下同 治頭痛因風火濕痰上攻，及楊梅瘡毒所致，兼治頭目昏眩，項背拘急，肢體煩痛，肌肉蠕動，耳哨蟬鳴，鼻塞多嚏，皮膚頑痲，瘙癢癮疹，又治婦人頭風作痛，眉稜骨疼，牙齒腫痛，痰逆惡心，並皆治之。

天麻，草烏湯泡去皮，川芎，細辛，蒼朮，甘草，川烏湯泡去皮，薄荷，甘松，防風，白芷，雄黃，白附子去皮各五錢，全蠍三錢。右為細末，寒食麵打糊搗稠，如寒豆大，捻作餅子，每服二三十餅，食後細嚼葱頭湯送下。屬火熱痰痛者，茶湯下。甚者日進二服，忌諸般發物。

㊂保安萬靈丹 治鬢疽初起，憎寒壯熱，頭眩惡心，四肢拘急者。

茅朮八兩，全蠍，石斛，明天麻，甘草炙，當歸，川芎，羌活，荊芥，防風，北細辛，麻黃，川烏湯泡去皮尖，草烏湯泡去皮尖，何首烏各一兩，明雄黃六錢。右為細末，煉蜜丸彈子大，每藥一兩，分作四丸，一兩作六丸，一兩作九丸，三等作下，以備年歲老壯，病勢緩急取用。預用朱砂六錢，研細為衣，磁罐收貯。如惡瘡初起，二三日之間，或癰疽已成，至十朝前後，但未出膿者，狀若傷寒頭疼煩渴，拘急惡寒，肢體疼痛，惡心嘔吐，四肢沉重，恍惚悶亂，坐臥不寧，皮膚壯熱，又治傷寒四時感冒，傳變疫證，但惡寒身熱，表證未盡者，俱宜服之。用連鬚大葱白九枝，煎湯一茶鍾，將藥一丸，乘熱化開，通口服盡，被蓋出汗為效。如服後汗遲，再用葱白湯催之，後必汗如淋洗，

紅，青烟已盡，旋起白烟，片時約上下紅徹，住火取罐，頓地上一宿取出，約有砒礬淨末一兩，加前雄黃二錢四分，乳香一錢二分，共研極細，厚糊調稠，搓成如線條，陰乾。凡遇前證有孔者，紝入孔內，無孔者先用鍼放孔竅，早晚插藥二次，插至三日後孔大者每插十餘條，插至七日，患孔藥條滿足方住。以後所患四邊，自然裂開大縫，共至十四日前後，其疔核瘰癧痔漏諸管自然落下，隨用湯洗，上玉紅膏，虛者兼服健脾之藥。

玉紅膏　治癰疽發背諸般潰爛等瘡，用在已潰流膿時，先用甘草湯洗，再用猪蹄湯淋洗患上，軟絹擄淨，用抿脚挑膏於掌，捺化遍搽新腐肉上，外以太乙膏蓋之，大瘡早晚洗換二次，內兼服大補脾胃煖藥，其腐肉易脫，新肉即生，瘡口自斂，此乃外科收斂藥中之神藥也。

白芷五錢，紫草二錢，甘草一兩二錢，歸身，白蠟各二兩，血竭，輕粉各四錢，麻油一斤，先用當歸紫草甘草白芷四味，入油內浸三日，大杓內慢火熬藥，微枯色，細絹濾清，將油復入杓內煎滾，下整血竭化盡，次下白蠟，微火亦化，先用茶鍾四枚，預頓水中，將膏分作四處，傾入鍾內，候片時方下研極細輕粉，每鍾內投和一錢，攪勻，候至一伏時取起，不得加減，致取不效。

敗銅散　治蟮拱頭，已破後膿水不乾，愈之又發，久不收口。

化銅舊罐，右爲末，洗淨患上，香油調搽。

太乙膏　治發背癰疽腦瘡，及一切惡瘡，跌撲傷損，濕痰流毒，風濕風溫，遍身筋骨走注作痛，內傷風鬱，心腹胃背攻刺作疼，腿脚痠軟，腰膝無力，湯潑火燒，刀傷棒毒，五損內癰，七傷外證，俱貼傷處，又男子遺精，婦人白帶，俱貼臍下，臟毒腸癰，亦可丸服，諸般瘡癤，血風癩證，諸藥不止疼痛者，並效。

肉桂，白芷，當歸，元參，赤芍藥，生地黃，大黃，土木鱉各二錢，阿魏，沒藥末各三錢，輕粉四錢，槐枝，柳枝各一百段，血餘一兩，乳香末五錢，東丹四十兩。右上十味，并槐柳枝，用眞麻油足秤五斤，

水皆服之

當歸，白芍藥，茯苓，白朮，貝母，熟地黃，山梔子各一錢，半夏，人參，柴胡，牡丹皮，陳皮，香附，川芎各六分，甘草四分，水二鍾，薑三片，煎八分，食遠服。

㊱茯苓內托散　治鬢疽已成，堅而不潰，潰而不斂，氣血俱虛，身涼脈細，飲食少思，口淡無味，及形體消瘦者。

歸身，黃芪製，川芎，白芍藥，陳皮，白朮，山藥，熟地，白茯苓，人參各一錢，熟附子，甘草，肉桂，牡丹皮，地骨皮各五分，薑三片，棗二枚，水二鍾，煎八分，食遠服。

㊲升陽益胃散正傳　治一切惡瘡發背腦疽等證。

人參，陳皮，獨活，防風，防風梢，黃連，黃蘗，蘇木，當歸梢，漢防己各五分，桔梗，連翹，知母，生地黃，生甘草，黃芩各一錢，炙甘草，羌活，藁本，黃芪各一錢五分，當歸三錢，澤瀉七分，右細切分作二服，每服用水二大盞，浸半日，煎至一盞，滴酒數十點，去查，臨臥溫服。忌飲水，再作膿，效遲，初患二三日者，服之立消。作膿者，立潰。隨病上下，食前後服。

㊳定痛消毒飲瘡瘍全書下同　治腦疽并一切癰疽疼痛不禁。

人參，當歸，升麻，川芎，白芍藥，桔梗，白茯苓，半夏，柴胡，甘草，羌活，防風，白芷，天花粉，枳殼，厚朴，右剉，薑三片，燈心三十莖，空心服。

㊴三香內托散　治證同上。

人參，木香，黃芪炙，厚朴，甘草炙，紫蘇，官桂，烏藥，白芍藥，白芷，川芎，防風，枳殼，乳香。右薑三片，棗二枚，水煎，不拘時服。

漸漸退下，覆蓋衣物，其汗自收自斂，患者自然爽快，其病如失。但病未成者，隨即消去，已成者，隨即高腫潰膿。如諸疾無表證，相兼不必發散者，只用熱酒化服。此方原載於諸風癱瘓門，予每用之發散瘡毒，其功甚捷，故移錄於此。詳觀此方治腫瘍甚效者，何也？凡瘡皆起於榮衛不調，氣血凝滯，乃生癰腫，觀此藥性專發散，又能順氣搜風，通行經絡，所謂結者開之。況瘡毒又乃日積月累，結聚所發，苟非甘溫辛熱發泄，以汗疏通，安能得效？所謂發散不遠熱，正合此方之意無謬也。服後避風，當食稀粥，忌冷物房事，孕婦勿服。

㉛柴胡清肝湯　治鬢疽初起未成者，毋論陰陽表裏，俱可服之。

川芎，　當歸，　白芍藥，　生地黃，　柴胡，　黃芩，　山梔，　天花粉，　防風，　牛蒡子，　連翹，　甘草節各一錢，　水二鍾，煎八分，食遠服。

㉜鼠黏子湯　治鬢疽初起，熱多寒少，頭眩作痛，口燥咽乾，渴常飲冷，二便祕澀，六脈沉實有力，煩悶疼痛者。

鼠黏子，　桔梗，　當歸，　甘草梢，　赤芍，　連翹，　元參，　地骨皮，　防風，　天花粉，　木通各一錢，　大黃炒二錢，　水二鍾，煎八分，食前服，查再煎服。

㉝加味逍遙散　治鬢疽七日以上，根盤深硬，色紫焮痛者。

白朮，　茯苓，　牡丹皮，　白芍藥，　柴胡，　陳皮，　當歸，　山梔，　貝母，　天花粉各八錢，　甘草生，　紅花，　羚羊角各五分，　水二鍾，淡竹葉二十片，煎八分，食後服。

㉞梔子清肝湯　治少陽經虛，肝火風熱上攻，遂成鬢疽，痛連頸項胷乳太陽等處，或寒熱晡甚，胷滿口苦舌乾。

桔梗，枳殼，甘草炙 防風，前胡 羌活 生地黃 黃芩 獨活 川芎 當歸 白芍藥 人參
皮，白茯苓。右薑三片，棗一枚，煎服，仍時時服蠟礬丸。

㊄麥錢散外科正宗下同 治瘡頭毛脫落，白斑如癬，瘡痂壘壘疊起，癢甚猶若蟲行。
小麥一升，炒枯黃色，乘熱入鉢內，入硫黃細末四兩，白砒細末一兩，攪勻，待冷取起，再入烟膠半斤，川椒
三兩，生礬，枯礬各二兩。右共碾細末，以葱湯洗沐瘡痂，潔淨，用麻油調搽，以氈帽戴之，隨後作疼發腫，忍之，
三日後，其痂漸漸而脫，愈之後不復作，其髮亦生，戒諸發物。

㊄諸瘡一掃光 治瘡髮脫作癢。
苦參，黃蘗各一斤，烟膠一升，明礬，枯礬，木鼈肉，蛇牀子，硫黃，樟冰，水銀，輕粉，點紅椒，
楓子肉各二兩，白砒五錢。右共為細末，每一錢加倒挂塵二分，燈窩宿油調搽，自愈。

㊄潤肌膏 治瘡乾枯白斑作癢，髮脫。
麻油四兩，當歸五錢，紫草一錢。右同熬藥枯，濾淨，將油再熬，加黃蠟五錢，化盡，傾入椀內，頓冷，搽擦患上，漸
愈矣。

(秦)圍藥 治上證毒勢散漫。

雄黃末二錢，白芨末一兩。右和勻，用蟹搗汁調敷，留孔，時用水潤之。

(秦)救苦拔毒膏 用敷前證。

雄蜒蚰一二條，以葱白二寸，同搗極爛，雄黃末，白芨末各一錢，和勻敷患處，留孔，乾用水潤之，何爲雄蜒蚰？背上有白紋者是也。對口瘡發鬢發疽之證亦治。

(秦)敗毒流氣飲 治證同上。

人參，乾葛，枳殼，桔梗，甘草炙，柴胡，細辛，薄荷，川芎，羌活，白芍藥 獨活，紫蘇，天花粉，防風，白芷，右薑三片，棗一枚，水煎，食後服。

(秦)內托流氣飲 治前證不消。

人參 木香，黃芪炙，厚朴，甘草炙 紫蘇，官桂，冬加夏減。檳榔，烏藥，枳殼，當歸，川芎 芍藥，白芷 桔梗 右薑三片，棗二枚，煎服。一方有細辛鼠黏防風，無木香官桂檳榔，治證同。或熱，加柴胡黃芩去官桂，或痛，加延胡索五靈脂乳香。或瀉痢，加附子人參白朮土炒澤瀉。胃氣不順加陳皮茯苓半夏山藥。嘔吐，加生薑藿香。

(秦)清心流氣飲 治發鬢毒。

茯苓，防風，甘草炙，柴胡 羌活 川芎，紫蘇，連翹，赤芍藥，人參，白芷，前胡，獨活，山梔，右水煎服。

(秦)敗毒流氣飲 治鬢疽。

桔梗，枳殼，甘草炙，白芷，川芎，生地黃，乾葛 麥冬，當歸，白芍藥，柴胡，天花粉，鼠

醫部彙考一百二十八

頭門七

單方

頭痛。八月朔日收取百花頭上露，磨墨點太陽穴，立止。點膏肓穴，治勞瘵，謂之天灸。時珍。

頭風腦痛。元精石末入羊膽中，陰乾，水調一字吹鼻中，立止。千金方。

頭痛欲死。硝石末，吹鼻內即愈。炮炙論。

偏頭風痛。硇砂末一分，水潤豉心一分，搗丸皂子大，綿包，露出一頭，隨左右納鼻中，立效。聖惠方。

頭痛頭風。如神丹光明硫黃硝石各一兩，細研，水丸芡子大，空心嚼一丸，茶下。普濟方。

腎虛頭痛。用硫黃一兩，胡粉爲末，飯丸梧子大，痛時，冷水服五丸，即止。

又方。用硫黃末食鹽等分，水調生麪糊丸梧子大，每服薄荷茶下五丸。

又方。用硫黃六錢，烏藥四錢爲末，蒸餅丸梧子大，每服三五丸，食後茶清下。

頭忽眩運，經夕不瘥，四體漸羸，飲食無味，好食黃土，用朮三斤，麴三斤，搗篩，酒和丸梧子大，每服用二十丸，日三服。忌菘菜桃李靑魚。外臺祕要。

偏正頭風[illegible]

[illegible]末，令患者口含溫水，隨左右痛，以左右鼻吸一字，有效。經驗良方。

一品丸，治氣熱上攻，頭目昏眩，及治偏正頭痛。大香附子杵去毛，水煮一時，[illegible]

一丸，水一盞，煎八分服，女人醋湯煎之。奇效良方。

偏正頭風。香附子炒一斤，烏頭炒一兩，甘草二兩，為末，煉蜜丸彈子大，每服一丸，葱茶嚼下。本事方。

氣鬱頭痛，用香附子炒四兩，川芎藭二兩，為末，每服二錢，臘茶清調下。常服除根明目。華佗中藏經加甘草一兩，石膏二錢半。澹寮方。

頭風睛痛。香附子一兩，藿香葉甘草各二錢，為末，每服二錢，沸湯入鹽調下。聖惠方。

頭風旋運，痰逆惡心懶食。眞零陵香藿香葉莎草根炒等分，為末，每服二錢，茶下，日三服。本事方。

頭風白屑。零陵香白芷等分，水煎汁，入雞子白攪勻，傅數十次，終身不生。聖惠方。

又方。水蘇煮汁，或燒灰淋汁沐之。普濟方。

頭項風強。八月後取荊芥穗作枕，及鋪牀下，立春日去之，則愈。千金方。

風熱頭痛。荊芥穗石膏等分，為末，每服二錢，茶調下。永類鈐方。

頭目諸疾，一切眼疾，血勞風氣頭痛，頭旋目眩。荊芥穗為末，每酒服三錢。龍樹論。

風熱頭痛，熱結上焦，致生風氣痰厥頭疼。用水蘇葉五兩，皂莢炙去皮子三兩，芫花醋炒焦一兩，為末，煉蜜丸梧子大，每食後服二十丸，荊芥湯下。聖惠方。

白菊花酒，治丈夫婦人久患頭風眩悶，頭髮乾落，胷中痰壅，每發即頭旋眼昏，不覺欲倒者，是其候也。先灸兩風池各二七壯，并服此酒及散，永瘥。其法春末夏初收白菊軟苗，陰乾擣末，空腹取一方寸匕，和無灰酒服之，日再服，漸加三方寸匕。若不飲酒者，但和羹粥汁服亦得。秋八月合花收暴乾，切取三大斤，以生絹袋盛，貯三大斗酒中，經七日服之，日三次，常令酒氣相續為佳。圖經。

腦風頭痛不可忍，遠志末，嗃鼻。宣明方。

少陽頭痛，太陽頭痛不拘偏正，小清空膏用片黃芩酒浸透，曬乾爲末，每服二錢，茶酒任下。東垣。

偏正頭風，防風白芷等分爲末，煉蜜丸彈子大，每嚼一丸，茶調下。普濟方。

太陽頭痛，羌活防風紅豆等分爲末，嗃鼻。玉機微義。

偏正頭風痛不可忍者，延胡索七枚，青黛二錢，牙皂二箇，去皮子爲末，水和丸，如杏仁大，每以水化一丸，灌入病人鼻內，隨左右口咬銅錢一箇，當有涎出成盆而愈。永類方。

凡人登車船煩悶頭痛欲吐者，宜用徐長卿石長生車前子車下土李根皮各等分搗碎，以方囊繫半合於衣帶及頭上，則免此患。肘後方。

頭痛欲裂，當歸二兩，酒一升，煎取六合，飲之，日再服。外臺祕要。

氣虛頭痛，川芎爲末，臘茶調服二錢，甚捷，曾有婦人產後頭痛，一服即愈。集簡方。

風熱頭痛，川芎一錢，茶葉二錢，水一鍾，煎五分，食前熱服。簡便方。

頭風化痰，川芎洗切曬乾爲末，煉蜜丸如小彈子大，不拘時嚼一丸，茶清下。經驗方。

偏頭風痛，京芎細剉，浸酒日飲之。斗門方。

風熱上衝頭目運眩，或胷中不利，川芎槐角子各一兩爲末，每服三錢，用茶清調下，胷中不利，以水煎服。保命集。

首風旋運，及偏正頭疼，多汗惡風，胷膈痰飲，川芎一斤，天麻四兩，爲末，煉蜜丸如彈子大，每嚼一丸，茶清下。宣明方。

頭面諸風，香白芷切，以蘿蔔汁浸透，日乾爲末，每服二錢，白湯下，或以嗃鼻。直指方。

偏正頭風，百藥不治，一服便可，天下第一方也，香白芷炒二兩五錢，川芎炒甘草炒川烏頭半生半熟各一兩，爲末，每服一錢，細茶薄荷湯調下。談埜翁試效方。

偏正頭痛用穀精草一兩爲末，以白麪糊調攤紙花上，貼痛處[illegible]

偏正頭痛。用穀精草末銅綠各一錢，硝石半分，隨左右㗜鼻。聖濟方。

濕熱眩運不可當者。酒炒大黃爲末，茶清服二錢，急則治其標也。丹溪纂要。

風氣頭痛不可忍者。乳香蓖麻仁等分，搗餅隨左右貼太陽穴，解髮出氣甚驗。

又方。用蓖麻油紙剪花，貼太陽亦效。

又方。蓖麻仁半兩，棗肉十五枚，去核搗塗紙上，捲筒插入鼻中，下清涕即止。德生堂方。

八種頭風。蓖麻子、剛子各四十九粒去殼，雀腦芎一大塊，搗如泥，糊丸彈子大，線穿挂風處，陰乾，用時，先將好末茶調成膏子塗盞內，後將炭火燒前藥，烟起以盞覆之，待烟盡以百沸葱湯點盞內茶藥服之，後以棉被裹頭臥汗出避風。袖珍方。

諸風頭痛。藜蘆一莖，研末，入麝香少許，吹鼻。

又方。藜蘆半兩，黃連三分，㗜鼻。聖惠方。

頭風頭痛。用臘月烏頭一升，炒令黃，末之，以絹袋盛，浸三斗酒中，逐日温服。

又方。用附子炮，石膏煅，等分爲末，入腦麝少許，每服五分，茶酒任下。

又方。用附子一枚，生去皮臍，菉豆一合，同入銚子內，煑豆熟爲度，去附子，食菉豆立瘥，每箇可煑五次，後爲末服之。

風毒頭痛，攻注頭目，痛不可忍。大附子一枚，炮去皮爲末，以生薑一兩，大黑豆一合，炒熟，用酒一盞煎七分，調附末一錢，温服。

又方。治二三十年頭風不愈者。用大川烏頭生去皮四兩，天南星炮一兩，爲末，每服二錢，細茶三錢，薄荷七葉，鹽梅一箇，水一盞，煎七分，臨臥温服。

風熱頭痛。菊花石膏川芎各三錢爲末，每服一錢半，茶調下。簡便方。

頭風久痛。蘄艾揉爲丸，時時嗅之，以黃水出爲度。青囊雜纂

頭風，面瘡癢出黃水，艾二兩，醋一升，砂鍋煎取汁，每薄紙上貼之，一日二次上。御藥院方。

氣攻頭痛。胡蘆巴炒三稜酒浸焙各半兩，乾薑炮二錢半爲末，薑湯或溫酒每服二錢。濟生方。

痰厥頭痛。牛蒡子炒旋覆花等分爲末，臘茶清服一錢，日二服。聖惠方。

頭痛連睛。牛蒡子石膏等分爲末，茶清調服。醫方摘要。

頭面忽腫，熱毒風氣內攻，或連手足赤腫，觸著痛者。牛蒡子根，一名蝙蝠刺，洗淨研爛，酒煎成膏，絹攤貼腫處，仍以熱酒服一二匙，腫消痛減。斗門方。

頭風掣痛不可禁者。牛蒡莖葉搗取濃汁二升，無灰酒一升，鹽花一匙，頭糖火煎稠成膏，以摩痛處，風毒自散，摩時須極力令熱乃效，冬月用根。篋中方。

頭風白屑。牛蒡葉搗汁，熬稠塗之，至明日用皂莢水洗去。聖惠方。

諸風頭運，蒼耳葉曬乾爲末，每服一錢，酒調下，日三服，若吐則以蜜丸梧子大，每服二十丸，十日全好矣。經驗方。

頭風熱痛。決明子炒研，茶調敷兩太陽穴，乾則易之，一夜即愈。醫方摘元

雷頭風腫，不省人事，地膚子同生薑研爛，衝酒熱服，取汗即愈。聖濟總錄

頭風白屑。王不留行香白芷等分爲末，乾糝一夜，篦去。聖惠方。

頭風疼痛。葶藶子爲末，以湯淋汁沐頭，三四度即愈。肘後方。

偏正頭痛。鱧腸草即旱蓮草，取汁滴鼻中。聖濟總錄

頭風作痛。用薔薇根二升，以酒二升，煮服，汗出止。千金方。

頭風旋運起倒無定[illegible]

女人血風頭痛，草烏頭梔子等分爲末，自然葱汁隨左右調塗太陽及額上，須臾汗出即止。

風痰眩運頭痛，氣鬱胷膈不利。白附子炮去皮臍半斤，石膏煆紅半斤，朱砂二兩二錢半，龍腦一錢，爲末，粟米飯丸小豆大，每服三十丸，食後茶酒任下。御藥院方。

偏正頭風。白附子白芷猪牙皂角去皮等分爲末，食後茶清服，仰臥少頃。本事方。

痰厥頭痛。白附子天南星半夏等分生研爲末，生薑自然汁浸蒸餅丸菉豆大，每服四十丸，食後薑湯下。濟生方，

風痰頭痛不可忍。天南星一兩，荊芥葉一兩，爲末，薑汁糊丸梧子大，每食後，薑湯下二十丸。

又方。上清丸用天南星茴香等分，生研末，鹽醋煮麪糊丸，如上法服。經效濟世方。

白禿頭瘡。芫花末猪脂和敷之，立效。集效方。

八般頭風，二次見效。半夏末入百草霜少許，作紙撚燒烟，就鼻內嗃之，口中含水，有涎，吐去再含。衞生寶鑑。

頭風久痛。莽草煎湯沐之，勿令入目。聖惠方。

温熱頭痛。黑牽牛七粒，砂仁一粒，研末，井華水調汁，仰灌鼻中，待涎出卽愈，聖濟總錄。

熱病頭痛，發熱進退。用大栝蔞一枚，去瓤細剉，置磁盌中，用熱湯一盞泡之，蓋定良久，去滓服。聖惠方。

痰熱頭風。懸栝蔞一箇，赤王瓜子七箇焙，牛蒡子焙四兩，爲末，每食後，茶或酒服三錢。忌動風發熱之物。頭痛發汗。

萆薢旋覆花虎頭骨酥炙等分爲散，欲發時以温酒服二錢，暖臥取汗立瘥。聖濟總錄下同，

頭風熱痛。山豆根末油調塗兩太陽。

頭上白屑。山豆根浸油，日塗之。

洗頭風痛。新通草瓦上燒存性，研末二錢，熱酒下。牙關緊者，斡口灌之。

目赤頭旋，眼花面腫，風熱上攻。用排風子焙甘草炙菊花焙各一兩，爲末，每服二錢，臥時温水下。

治頭痛連睛者。生烏頭一錢，白芷四錢，爲末，茶服一字，仍以末嗃鼻，效。

風寒頭痛，風寒客於頭中，清涕，項筋急硬，胸中寒痰，嘔吐清水。用大附子或大川烏頭二枚，去皮蒸過，川芎藭生薑各一兩，焙研，以茶湯調服一錢，或剉片，每用五錢，水煎服，隔三四日一服，或加防風一兩。

又方。治風寒流注，偏正頭痛年久不愈，最有神效。用大附子一箇，生切四片，以薑汁一盞浸炙，再浸再炙，汁盡乃止。高良薑等分爲末，每服一錢，臘茶清調下，忌熱物少時。三因必效方。

年久頭痛。川烏頭天南星等分爲末，葱汁調塗太陽穴。經驗方。

頭風痛，如斧劈難忍。川烏頭末，燒烟熏盌內，溫茶泡服之。集簡方。

痰厥頭痛如破，厥氣上衝，痰塞胸膈。炮附子三分，釜墨四錢，冷水調服方寸匕，當吐即愈。忌猪肉冷水。

腎厥頭痛。大附子一箇，炮熟去皮，生薑半兩，水一升半，煎分三服。

氣虛上壅，偏正頭痛不可忍者。大附子一枚，炮去皮臍，研末，葱汁麪糊丸菉豆大，每服十丸，茶清下。

蠍附丸，治氣虛頭痛，最合造化之妙。附子助陽扶虛，鍾乳補陽鎮墜，全蠍取其鑽透，葱涎取其通氣，湯使用椒以達下，鹽以引用，使虛氣下歸，對證用之，無不奏效。大附子一枚，剜心令空，入全蝎去毒五枚在內，以餘附末同鍾乳粉二錢半，白麪少許，水和作劑，包附煨熟，去皮研末，葱涎和丸梧子大，每椒鹽湯下五十丸。

腎氣上攻，頭項不能轉移，椒附丸主之。用大熟附子一枚爲末，每用二錢，以椒二十粒，用白麪填滿椒口，水一盞半，薑七片，煎七分，去椒入鹽，空心點服，椒氣下達，以引逆氣歸經也。本事方。

偏正頭風。草烏頭四兩，川芎藭四兩，蒼朮半斤，生薑四兩，連鬚生葱二把，搗爛，同入瓷瓶，封固埋土中，春五夏三秋五冬七日，取出曬乾，揀去葱薑，爲末，醋麪糊和丸梧子大，每服九丸，臨臥溫酒下，立效。經驗方。

[illegible]一字爲末，每服半錢，薄荷湯冷服，更隨左右嗃鼻。指南方。

偏正頭痛生蘿蔔汁一蜆殼仰臥隨左右注鼻中神效王荊公病頭痛有道人傳此方移時遂愈也以此治人，不可勝數。如宜方。

年久頭風。萊菔子生薑等分，搗取汁，入麝香少許，嗃入鼻中，立止。普濟方。

頭運吐逆胃冷生痰也用川乾薑炮二錢半甘草炒一錢二分水一鍾半煎減半服，累用有效。傳信適用方。

一切頭瘡雞腸草燒灰和鹽傅之。孟詵食療。

風痰頭痛苦瓠膜取汁以葦管灌入鼻中，其氣上衝腦門，須臾惡涎流下，其病立愈，除根，勿以昏運爲疑。乾者浸汁亦效。其子爲末吹入亦效。年久頭風亦愈。普濟方。

腦漏流膿。破瓢白雞冠花白螺螄殼各燒存性等分，血竭麝香各五分爲末，以好酒灑濕，熟艾連藥揉成餅，貼在頂門上，以熨斗熨之以愈爲度。

頭面風腫杏仁搗膏，雞子黃和杵塗帛上厚裹之，乾則又塗，不過七八次，愈也。心鏡。

痰厥頭痛如破者。烏梅肉三十箇，鹽三撮，酒三升，煮一升，頓服取吐，即愈。肘後方。

風虛頭痛欲破，杏仁去皮尖曬乾研末，以水九升研，濾汁煎如麻腐狀，取和羹粥食之。七日後，大汗出，諸風漸減。此法神妙，可深祕之。須慎風冷猪雞魚蒜酢。千金方下同。

風襲腦疼項強。穿土地作坑，煅赤，以水灑之令冷，鋪生桃葉於內，臥席上，以項著坑上蒸，至汗出，良久即瘥。

頭項強痛乃肝腎二臟受風也。用宣州木瓜二箇，取蓋去瓤，沒藥二兩，乳香二錢半，二味入木瓜內，縛定飯上蒸三四次，爛研成膏，每用三錢，又入生地黃汁半盞，無灰酒二盞暖化溫服。

白禿頭瘡。乾桃一兩，黑豆一合，爲末，臘豬脂調搽患上。

頭痛不止。楊梅爲末以少許嗃鼻取嚏，妙。

頭風腦痛。百靈藤十斤，水一石，煎汁三斗，入糯米三斗，作飯候冷，拌神麴炒末九兩，同入甕中，如常釀酒，經三五日，更炊糯米冷投之，待熟澄清，每溫飲一小盞，服後渾身汗出為效。聖惠方下同。

頭風白屑。羊蹄草根杵，同羊膽汁塗之，永除。

頭上白禿。獨根羊蹄，勿見婦女雞犬風日，以陳醋研如泥，生布擦赤傅之，日一次。肘後方。

頭瘡不瘥。菖蒲末油調傅之，日三夜二次。法天生意。

頭上惡瘡。以黃泥包豆豉煨熟，取出為末，以蓴菜油調傅之。保幼大全。

頭風白屑。瓦松曝乾，燒灰淋汁，熱洗，不過六七次。聖惠方。

頭面諸瘡。芝麻生嚼傅之。普濟方。

頭皮虛腫，薄如蒸餅，狀如裹水，以口嚼小麥麪傅之，良。梅師方。

頭風畏冷。蕎麥粉二升，水調作二餅，更互合頭上，微汗即愈。怪證奇方。

頭風風眼。蕎麥作錢大餅，貼眼四角，以米大艾炷灸之，即效如神。

頭風頭痛。大豆三升，炒熟至微烟出，入瓶中，以酒五升沃之，密封七日，溫服。千金方下同。

頭風疼痛。豉湯洗頭，避風取汗，瘥。

茯苓酒，治頭風虛眩，暖腰膝，主五勞七傷，用茯苓粉同麴米釀酒飲之。

黃卷散，治頭風濕痹，筋攣膝痛，胃中積熱，大便閉澀，用大豆黃卷炒一升，酥半兩，為末，食前溫水服一匙，日二服。普濟方。

菊花酒，治頭風，明耳目，去痿痹，消百病。用甘菊花煎汁，同麴米釀酒，或加地黃當歸枸杞諸藥，亦佳。

[illegible]一兩，去頭足，安蒜上，椀覆一夜，勿令

頭風白屑,榛木作[illegible]日一易新[illegible]

風痰頭痛不可忍。梔子末和蜜濃傅舌上,吐卽止。兵部手集。

頭風疼痛。白棘倒鉤四十九箇燒存性,丁香一箇麝香一皂子大爲末,隨左右嗃鼻。聖惠方。

風虛眩運。大頭鷹閉殺去毛煮食,以骨燒存性,酒服。便民食療。

頭風疼痛。蚱蟬二枚生研,入乳香朱砂細末各半分,丸小豆大,每用一丸,隨左右納鼻中,出黃水爲效。聖濟總錄。

頭風旋運。蟬殼一兩微炒爲末,非時酒下一錢,白湯亦可。聖惠方。

偏正頭痛,久不除者。晴明時將髮分開,用麝香五分,皂角末一錢,薄紙裹置患處,以布包炒鹽於上熨之,冷則易,如此數次,更不再發。簡便單方。

老人風眩,用白羊頭一具,如常治食之。

頭目虛運。車風一箇,卽鷹頭也,去毛焙,川芎一兩爲末,酒服三錢。選奇方。

太陽中暍,身熱頭痛,而脈微弱,此夏月傷冷水,水行皮中所致。瓜蔕二七箇,水一升,煮五合,頓服取吐。金匱要略。

風熱頭痛。地龍炒研,薑汁半夏餅赤茯苓等分爲末,一字至半錢,生薑荊芥湯下。普濟方。

頭風疼痛。龍珠丸,用五月五日,取蚯蚓和腦麝杵丸梧子大,每以一丸納鼻中,隨左右先塗薑汁在鼻,立愈。總錄。

偏正頭痛不可忍者。聖惠方龍香散,用地龍去土焙,乳香等分爲末,每以一字作紙撚燈上燒烟,以鼻嗅之。或每用一捻,於香爐上慢火燒之,以紙筒引烟入鼻熏之,口噙冷水,有涎吐去,仍以好茶一盞點呷,卽愈。

頭風白屑,作癢。狗頭骨燒灰,淋汁沐之。聖惠方。

頭風痺痛。用臘月烏雞屎一升,炒黃爲末,絹袋盛漬五升酒中,一七溫服令醉。千金方。

頭風白屑。新下烏雞子三枚,沸湯五升攪作三度,沐之甚良。集驗。

頭上禿瘡，三月三日收未開桃花陰乾，與桑椹赤者等分作末，以豬脂和，先取灰汁洗去痂，卽塗之。食療。

頭風作痛。楊梅爲末，每食後薄荷茶服二錢，或以消風散同煎服，或同搗末，以白梅肉和丸彈子大，每食後葱茶嚼下一丸。朱氏集驗。

頭上肥瘡。一百五日，寒食節，收桃花爲末，食後以水半盞調服方寸匕，日三，甚良。崔元亮海上方。

頭面癬瘡。生白果肉切斷，頻擦取效。邵氏經驗方。

頭上白痜。花椒末猪脂調傅，三五度便愈。

頭風作痛。吳茱萸煎濃湯，以新棉染頻拭髮根，良。千金翼方。

氣虛頭痛。用上春茶末調成膏，置瓦盞內覆轉，以巴豆四十粒作二次燒煙熏之，曬乾，乳細，每服一字，別入好茶末，食後煎服，立效。醫方大成。

濕家頭痛。瓜蔕末一字，嗃入鼻中，口含冷水，取出黃水，愈。活人書。

頭腦鳴響，狀如蟲蛀，名天白蟻。以茶子爲末，吹入鼻中，取效。醫方摘要。

偏頭痛。黃蠟三兩，鎔化，以紙闊二寸長五寸，在蠟上拖勻，蘄艾薄鋪於上，捲爲筒，左痛插右耳，右痛插左耳，中火燃之，烟氣透腦，痛卽止，至重不過二次。急救方。

偏正頭風，天陰風雨卽發。桂心末一兩，酒調，塗於額上及頂上。聖惠方。

氣厥頭痛，不拘老少及產後頭痛，天台烏藥川芎等分爲末，每服三錢，臘茶清調下，產後鐵錘燒紅，淬酒調下。濟生方。

頭目風熱上攻。用龍腦末半兩，南硼砂末一兩，頻嗃兩鼻。御藥院方。

[illegible]燒烟熏鼻，吐出痰涎卽愈。壽域方。

奇效良方，下同。

治頭痛方。水調決明子末，貼兩太陽穴。一方作枕，去頭風，明目。

治偏頭疼方。鬱金一顆，苦壺盧子一合，爲細末，用白絹子裹藥末一錢，於新汲水內浸過，滴向患處鼻中，得黃水出，即瘥。

篋中方治頭風及腦掣痛不可忍者，以此膏摩之，極效。方用牛蒡莖搗取濃汁二升，無灰酒一升，鹽花一匙，慢火熬令稠成膏，以摩痛處，其風毒自散，亦治時行頭痛。摩時須令極熱，乃得速效。冬月無苗，以根代之。

雷頭風方歌曰：雷頭風發聽斯言，豬糞將來不用錢，細搗羅爲極細末，溫酒調下便安然。

秘方貼頭風熱痛，用大黃、朴硝各等分爲末，井底泥和捏作餅，貼兩太陽穴。

又方：治頭目眩運，大黃、荊芥穗、防風各等分，水煎服，以利爲度。

又方：治失血過多，眩運不醒，芎藭、當歸酒浸等分，每服四錢，水煎溫服，甚者加附子。

卒頭痛如破，非冷非風，是胸膈有痰，厥氣上衝所致，名爲厥頭痛，吐之即差。單煮茗飲一二升，須臾吐，吐畢又飲，如此數過，須吐痰涎盡乃止，不損人，待渴即差。本草下同

偏正頭痛。人中白、地龍炒等分爲末，羊膽汁丸芥子大，每新汲水化一丸，注鼻中嗃之，名一滴金。普濟方。

偏正頭風，氣上攻不可忍，用全蠍二十一箇，地龍六條，土狗三箇，五倍子五錢，爲末，酒調攤貼太陽穴上。德生堂經驗方。

癩頭瘡。用黃連末傅之，累效。準繩。

眉稜骨痛屬風熱與痰，白芷、片芩酒炒等分爲末，每服二錢，茶清調下。丹溪纂要。

頭風掣疼，湖南押衙顏思退傳方，用蠟二斤，鹽半斤，香油一兩，相和於鏇鑼中，鎔令相入，捏作一兜鍪，勢可合腦大小，蓋至額，其痛立止也。經驗方。

頭風白屑，烏羊屎煎汁洗之。聖惠方。

雷頭風病，羊屎焙研，酒服二錢。普濟方。

頭上瘡癬，蜂房研末，臘猪脂和塗之，效。聖惠方。

頭身俱痛，煩悶者，用頭垢豆許，水服，囊盛蒸豆熨之。肘後方。

偏正頭風，不拘遠近，諸藥不效者，如神。用白芷芎藭各三錢，爲細末，以黃牛腦子調，二末入於瓷器內，加酒頓熟，乘熱食之，盡量一醉，醒則其病如失，甚驗。保壽堂方

頭上生瘡，海螵蛸白膠香各二錢，輕粉五分，爲末，先以油潤淨，乃搽末二三次，即愈。衞生易簡方。

八般頭風，黃魚鰾燒存性爲末，臨臥以葱酒調服　錢。

偏正頭風，幷夾頭風，連兩太陽穴痛。用白殭蠶爲末，葱茶調服方寸匕。聖惠方。

葉椿治頭風，用白殭蠶高良薑等分爲末，每服一錢，臨臥時茶服，日二服。

卒然頭痛，白殭蠶爲末，每用熟水調下二錢，立瘥。斗門方。

赤禿頭瘡出膿，晝開夜合，馬蹄燒灰，生油調塗，神效。聖惠方下同。

頭風白屑作癢，蠶沙燒灰淋汁洗之。

頭癢生瘡，白鴿屎五合，酢煎二三沸，杵爛傅之，日三上。

頭瘡白禿，鴿屎研末傅之，先以酢泔洗淨，亦可燒研摻之。

[illegible]參之，膿水卽乾，如乾者以淸油調塗。衞生易簡方。

熊腦髓作油，摩頭可去白屑。

腦縫開裂方，入大熱發頭熱者，令腦縫裂開，取黑虱三五百枚，擣碎敷之。

治頭上風屑極燥癢無時，此乃氣虛風邪侵於皮表而生。用藜蘆不拘多少爲末，先洗頭，須避風，候未至十分乾時，用末糝之。須用入髮至皮方得，緊縛之。兩日夜，次日卽不燥癢，如尚有些少，可再用一次立效。本事方。

頭上生瘡如癩：防風通聖散爲末，酒浸焙三次，食後白湯調服，日三。丹溪心法，下同。

癩頭瘡方，鹽湯溫洗淨，以一上散敷之，久不愈者神效。

癩頭瘡，宜服酒歸飲，外用雄黃水銀等分爲末，臘猪脂半生半熟調敷之。濕爛者，燕窩土黃蘗爲末，乾糝。入門。

白禿頭瘡，宜神應膏。醫鑒。

頭面瘡。密陀僧硫黃各一錢，輕粉少許，右爲末，猪脂調敷。丹溪心法，下同。

頭面瘡。以臘月馬脂油，塗擦極妙。

頭面瘡。松皮灰五錢，黃丹白膠香各二錢半，枯白礬大黃黃蘗各一錢二分。右爲末，熟油調敷。

大頭天行。殭蠶一兩，錦紋大黃二兩，薑汁丸彈子大，新汲泉水和生蜜調服，外用井底泥，調大黃芒硝末敷之。

頭重如山。用羌活根燒三錢，連翹三錢，紅豆錢半。右爲末，嗃鼻若爲飲，除濕藥則過，所誅罰無過，故於鼻取之，猶鳥在高巔之上，必射而取之也。東垣。

壯實人氣實有痰，或頭痛或眩運，大黃酒浸三次爲末，茶調服。丹溪心法。

頭瘡方，用好紫霄炭燒通紅，入水淬之，又燒又淬，以水熱爲度，取所淬之水，日日洗之，使熱毒宣發而愈。外以胡荽子，伏龍肝，懸龍尾，黃連，白礬爲末，調敷，又服酒炒通聖散，效。懸龍尾，屋梁塵也。

白禿臘梨。灰窨內燒過紅土墼四兩，百草霜一兩，雄黃一兩，膽礬六錢，楡皮三錢，輕粉一錢，爲末，猪膽汁調，剃頭後

治風頭眩，心肺浮熱，手足無力，筋骨煩疼，言語似澀，一身動搖，用烏驢頭一枚，揉洗如法，蒸令極熟，細切，更於豉汁內煑著五味調點，少酥食之效。奇效良方下同

偏正頭疼方歌曰：白芷經痛日曬香，草烏等分炒令黃，半錢細末葱茶點，此是頭疼決捷方。儒門事親下同

又方歌曰：老少頭風總一般，良薑細辛等殭蠶，白梅湯點三分許，纔發之時服便安。

頭痛不止。丁香一錢，白芷半兩，瓜蔕一兩，爲細末，每用半字吹入鼻中卽瘥。

頭風方。苦丁香川芎藜蘆各等分，右爲細末，噙水鼻內嗃之。

治頭風方。服荆瀝不限多少，取瘥止。千金方下同

又方：七月七日麻勃三斗，麻子一石，末相和蒸之，沸湯一石五斗三徧淋之，煑取一石，漬神麯二十斤，令發釀黍米兩石五斗，熟封三七日，服清一升，百日身中澀皮八風，胷膈五臟，骨髓伏風，百病悉去。

治卒中惡風頭痛方。搗生烏頭，以大酢和塗，放布上薄痛處，須臾痛止，日夜五六薄，逐痛處薄之，搗烏頭須去皮。

又方：鹽一升爲末，以麻油二升，煎一宿，令消盡，塗頭，石鹽尤良。

又方：芥子爲末，酢和傅頭一周時。

又方：蜀椒二升，以水煎取汁，沐髮良。

治頭項強不得顧視方。蒸好大豆一斗，令變色，內囊中枕之。

枕頭方。治頭風頭痛，百藥不效者。食茱萸葉細剉，灑酒拌勻，以絹袋盛之，於甑中蒸熟，乘熱分作二包，更換枕頭，以效爲度。

又熨法。治風頭痛，雖重綿厚帛，不能禦風寒者。艾葉揉如綿，用帛夾住，包頭上，用熨斗熨艾，使熱氣入內，良久卽愈。

……爲末，左邊痛嗅入右鼻，右邊痛嗅入左鼻，立效。斗門方下同

眉鍊頭瘡。用小麥燒存性爲末，油調傅。儒門事親

頭瘡生蛆，頭皮內時有蛆出，以刀刮破，擠絲瓜葉汁搽之，蛆出盡，絕根。小山怪證方。

小兒白禿瘡方，用吳茱萸鹽醃過，炒研，醋和塗之。活幼口議。

雞屎白禿。甜瓜蔓連蒂不拘多少，以水浸一夜，砂鍋熬取苦汁，去查再熬，如錫盛收，每剃去痂疕洗淨，以膏一盞加半夏末二錢，薑汁一匙，狗膽汁一枚，和勻塗之，不過三上。忌食動風之物。儒門事親

鬈毛毒瘡生頭中，初生如蒲桃，痛甚。黃蘗一兩，乳香二錢半，爲末，槐花煎水調作餅，貼於瘡口。普濟方。

頭癢生瘡，楸葉搗汁頻塗。聖惠方。

頭耳諸瘡，眉癬燕窩瘡。並用肥皂煆存性一錢，枯礬一分，研勻，香油調塗之。摘元方。

臘梨頭瘡。不拘大人小兒，用獨核肥皂去核，塡入沙糖，入巴豆二枚，紮定，鹽泥包，煆存性，入檳榔，輕粉五七分，研勻，香油調搽，先以灰汁洗過，溫水再洗，拭乾乃搽，一宿見效，不須再洗。普濟方。

白禿頭癬。熊白敷之。

細辛主風頭痛腦痛，治頭面風不可闕也。又治足少陰腎經，苦頭痛，煎服末服皆佳。

川芎治厥陰經頭痛在腦，偏頭痛，細剉酒浸服之，或煎服，或末服並佳。又主風邪入腦頭痛，治頭面風不可闕也。

防風主大風頭眩痛，又主頭面去來風，煎服末服皆佳，治上部風邪之仙藥也。湯液下同。

葛根主傷寒中風頭痛，煎服之效，乃陽明經頭痛藥也。

甘菊治風眩頭痛，取花爲末，酒調服一錢，日再服，或多取釀酒，或浸酒服之，又取嫩莖葉作羹，作菜食，亦良。白菊尤佳。

搽之，百發百中，神方也。土墼乃燒石灰窰中流結土查也，輕虛而色赭。積德堂方。

頭瘡白禿，取牛皮竈岸爲末，麻油調塗，或和輕粉少許。

白禿頭瘡，百草霜和猪脂塗之。又頭上諸瘡，以酢湯洗淨，百草霜入膩粉少許，生油調塗，立愈。證類本草。

治赤髮禿落，油磨銅錢末，塗之卽生。普濟方

頭上生蝨，銅青明礬末摻之。摘元方，下同。

頭上生蝨，水銀和蠟燭油揩之，一夜皆死。

頭上生蝨，銀朱浸酢，日日梳頭。

又方：包銀朱紙以盌覆燒之，茶清洗下，烟子擦之，包頭一夜，至旦蝨盡死。積德堂方。

白禿頭瘡，雄黃猪膽汁和塗之。聖濟錄

乾濕頭瘡，白礬半生半煆，酒調塗之。生生編。

白禿頭瘡，皂礬楝樹子燒研搽之。普濟方。

頭瘡白禿，貫衆白芷爲末，油調塗之。

又方：貫衆燒末，油調塗。

小兒禿瘡，白頭翁根搗傅，一宿作瘡，半月愈。肘後方。

白禿慘痛，陳香薷二兩，水一盞，煎汁三分，入胡粉猪脂半兩，和勻，日日塗之。子母祕錄。

白禿頭瘡，五月收漏蘆草，燒灰，猪膏和塗之。聖濟總錄。

白禿頭瘡，葶藶末塗之。聖惠方

醫部彙考一百二十九

頭門八

鍼灸

素問曰:熱病始於頭首者,刺項太陽而汗出止。

刺頭中腦戶入腦者死。

刺家不診聽病者言在頭頭疾痛爲藏鍼之刺,至骨病已上,無傷骨肉及皮,皮者道也。

黃帝問曰『余聞風者百病之始也,以鍼治之奈何?』岐伯對曰『風從外入,令人振寒,汗出,頭痛,身重,惡寒,治在風府,調其陰陽,不足則補,有餘則瀉。』

邪客於足太陽之絡,令人頭項肩痛,刺足小指爪甲上與肉交者各一痏,立已。不已,刺外踝下三痏,左取右,右取左,如食頃已。

靈樞曰『病在上者下取之,病在下者高取之,病在頭者取之足,病在腰者取之膕。』

手心主之別,名曰內關,去腕二寸,出於兩筋之間,循經以上,繫於心包絡,心系,實則心痛,虛則爲頭強,取之兩筋間也。

白芷，治陽明頭痛在額，煎服末服並佳。

麻黃，主風寒頭痛，去節煎服。本草。

藁本，治巔頂痛，腦齒痛，引諸藥至頂上，煎服末服並佳。丹溪心法。

半夏，主頭眩足太陰痰厥頭痛，非此不能除，煎服之。東垣。

蔓荊子，主風頭痛腦鳴，煎服之。本草。

蔓荊子，太陽經頭痛之要藥，能散風邪除頭昏目暗。丹溪心法。

山茱萸，主頭風腦骨痛，又治肝虛眩運，乃肝臟藥也，煎服之。本草下同。

羌活，治賊風頭痛眩運，乃太陽頭痛主藥也。又主風毒頭連齒痛，剉煎服之。

荊芥，治頭風，荊芥穗石膏煅等分爲末，每二錢以薑葱煎水調下，名荊芥散。

葱白連鬚者，治傷寒頭痛，煎服出汗即效，太陽經藥也。

菉豆，治頭風頭痛，作枕，枕之佳。

薄荷，治頭風，又治風熱頭痛，爲清上切要藥，煎服末服並佳。

石膏，治熱厥頭痛，陽明頭痛大效。石膏川芎白芷等分爲末，每三錢，茶清調下，名石膏散。

甲乙日自乘，無刺頭。
甲乙經曰：頭痛，目窻及天衝風池主之。
厥頭痛，孔最主之。
厥頭痛，面腫起，商丘主之。
頭腦中寒，鼻衄目泣出，神庭主之。
頭痛身熱，鼻窒，喘息不利，煩滿汗不出，曲差主之。
頭痛目眩，頸項強急，胷脅相引，不得傾側，本神主之。
頭項痛重，暫起僵仆，鼻窒䶊衄，喘息不得通，通天主之。
頭項惡風，汗不出，悽厥，惡寒，嘔吐，目系急，痛引頞，頭重項痛，玉枕主之。
頰淸不得視，口沫泣出，兩目眉頭痛，臨泣主之。
腦風頭痛，惡見風寒，䶊衄鼻窒，喘息不通，承靈主之。
頭痛身熱，引兩頷急，腦空主之。
頭重目瞑，悽厥寒熱，汗不出，陶道主之。
身熱頭痛，進退往來，神道主之。
頭痛如破，身熱如火，汗不出，瘈瘲，寒熱，汗不出，惡寒裏急，腰腹相引痛，命門主之。
頸項痛不可以俛仰，頭痛，振寒，瘈瘲，氣實則脅滿俠脊，有并氣熱，汗不出，腰背痛，大杼主之。
風眩頭痛，鼻不利，時嚏淸涕自出，風門主之
熱病頭痛身重，懸顱主之。

督脈之別，名曰長強，挾脊上項，散頭上下，當肩胛左右，別走太陽入貫膂，實則脊強，虛則頭重，高搖之，挾脊之有過者，取之所別也。

陽逆頭痛，胷滿不得息，取之人迎。

其足太陽有通項入於腦者，正屬目本，名曰眼系，頭目苦痛，取之在項中兩筋，間入腦。

熱病面青腦痛，手足躁，取之筋間，以第四鍼於四逆，筋躄目浸，索筋於肝，不得索之金，金者肺也。

熱病頭痛，顳顬目瘈，脈痛善衄，厥熱病也，取之以第三鍼，視有餘不足，寒熱痔。

厥頭痛，面若腫起而煩心，取之足陽明太陰。

厥頭痛，頭脈動，心悲善泣，視頭動脈反盛者，刺盡去血，後調足厥陰。

厥頭痛，貞貞頭重而痛，瀉頭上五行，行五，先取手少陰，後取足少陰。

厥頭痛，意善忘，按之不得，取頭面左右動脈，後取足太陰。

厥頭痛，項先痛，腰脊爲應，先取天柱，後取足太陽。

厥頭痛，頭痛甚，耳前後脈湧有熱，瀉出其血，後取足少陽。

眞頭痛，頭痛甚，腦盡痛，手足寒至節，死不治。

頭痛不可取於腧者，有所擊墮，惡血在於內，若肉傷痛未已，可則刺，不可遠取也。

頭痛不可刺者，大痹爲惡，日作者，可令少愈，不可已。

頭半寒痛，先取手少陽陽明，後取足少陽陽明。

厥挾脊而痛至頂，頭沉沉然，目𥇍𥇍然，腰脊強，取足太陽膕中血絡。

奇邪之所在，皆爲不足，故上氣不足，腦爲之不滿，耳爲之苦鳴，頭爲之苦傾，目爲之眩，補足外踝下留之。目眩頭傾，

頭眩目痛，頭半寒，玉枕主之。
腦風目瞑頭痛，風眩目痛，腦空主之。
頭痛引頸，竅陰主之。
風頭耳後痛，煩心及足不收失履，口喎僻，頭項搖瘈，牙車急，完骨主之。
眩頭痛重目如脫項似拔狂見鬼，目上反項直不可以顧，暴攣足不任，身痛欲折，天柱主之。
眩頭痛，刺絲竹空主之。
神庭，禁不可刺。
上關，禁不可刺深。深則令人耳無所聞。
顱息，刺不可多出血。
左角，刺不可久留。
人迎，刺過深殺人。
頭維，禁不可灸。
承光，禁不可灸。
腦戶，禁不可灸。
風府，禁不可灸。
瘖門，禁不可灸。
絲竹空，禁不可灸。
神庭，在髮際直鼻督脈足太陽陽明之會，禁不可刺，令人癲疾，目失精，灸三壯。

善噫頭痛身熱，頷厭主之。

熱病頭痛，引目外眥而急，煩滿，汗不出，引頷齒面赤皮痛，懸釐主之。

熱病偏頭痛，引目外眥，懸釐主之。

頭目瞳子痛，不可以視，挾項強急，不可以顧，陽白主之。

頭風痛，鼻鼽衄，眉頭痛，善噫，目如欲脫，汗出，寒熱，面赤，頰中痛，項椎不可左右顧，目系急，瘈瘲，攢竹主之。

頭眩病，身熱，汗不出，上脘主之。

頭痛振寒，清冷淵主之。

頭痛項背急，消濼主之。

風眩頭痛，少海主之。

熱病先頭重額痛，煩悶身熱，熱爭則腰痛不可以俛仰，胷滿，兩頷痛甚，善泄。饑不欲食，善噫，熱中足清，腹脹，食不化，善嘔泄，有膿血，若嘔無所出，先取三里，後取太白章門主之。

厥頭痛，面浮腫，煩心，狂見鬼，善笑不休，發於外有所大喜，喉痺不能言，豐隆主之。

頭重鼻衄，及瘈瘲，汗不出，煩心，足下熱，不欲近衣，項痛目翳，鼻及小便皆不利，至陰主之。

暴病頭痛，身熱痛，肌肉動，耳聾惡風，目眥爛赤，項不可以顧，髀樞痛，泄腸澼，束骨主之。

頭痛顏青者，顖會主之。

風眩引頷痛，上星主之。取上星者，先取譩譆，後取天牖風池。

頂上痛，風頭重，目如脫，不可左右顧，百會主之。

風眩目眩，顱上痛，後頂主之。

[illegible]腦中寒，重衣不熱，汗出頭中惡風，刺腦戶主之。

正營，在目窗後一寸，足少陽陽維之會，刺入三分，灸五壯。

承靈，在正營後一寸五分，足少陽陽維之會，刺入三分，灸五壯。

腦空，一名顳顬，在承靈後一寸五分，俠玉枕骨下陷者中，足少陽陽維之會，刺入四分，灸五壯。

天衝，在耳上如前三分，刺入三分，灸三壯。

率谷，在耳上，入髮際一寸五分，足太陽少陽之會，嚼而取之，刺入四分，灸三壯。

曲鬢，在耳上入髮際曲隅陷者中，鼓頷有空，足太陽少陽之會，刺入三分，灸三壯。

浮白，在耳後，入髮際一寸，足太陽少陽之會，刺入三分，灸二壯。

竅陰，在完骨上枕骨下，搖動應手，足太陽少陽之會，刺入四分，灸五壯。

完骨，在耳後入髮際四分，足太陽少陽之會，刺入二分，留七呼，灸七壯。

瘖門，一名舌横，一名舌厭，在後髮際宛宛中，入繫舌本，督脈陽維之會，仰頭取之，刺入四分，不可灸，灸之令人瘖。

天柱，在俠項後髮際大筋外廉陷者中，足太陽脈氣所發，刺入二分，留六呼，灸三壯。

風池，在顳顬後髮際陷者中，足少陽陽維之會，刺入三分，留三呼，灸三壯。

千金方曰：凡孔穴主對者，穴名在上，病狀在下。或一病有數十穴，或數病共一穴，皆臨時斟酌作法用之。其有須鍼者，即鍼刺以補瀉之，不宜鍼者，直宜灸之。然灸之大法，但其孔穴與鍼無忌，即下白鍼若温鍼訖，乃灸之，燔鍼白鍼，皆須妙解，知鍼知藥，固是良醫。

神庭水滿，主寒熱頭痛，喘渴目不可視。

頭維大陵，主頭痛如破，目痛如脫。

崑崙解谿，曲泉飛揚，前谷少澤，通里，主頭眩痛。

竅陰強間，主頭痛如錐刺，不可以動。

曲差，一名鼻衝，俠神庭兩旁各一寸五分，在髮際足太陽脈氣所發，正頭取之，刺入三分，灸五壯。

本神，在曲差兩旁各一寸五分，在髮際足少陽陽維之會，刺入三分，灸三壯。

頭維，在額角髮際，俠本神兩旁各一寸五分，足少陽陽維之會，刺入五分，禁不可灸。

上星，一穴在顱上直鼻中央，入髮際一寸陷者中，可容豆，督脈氣所發，刺入三分，留六呼，灸三壯。

顖會，在上星後一寸骨間陷者中，督脈氣所發，刺入四分，灸五壯。

前頂，在顖會後一寸五分骨間陷者中，督脈氣所發，刺入四分，灸五壯。

百會，一名三陽會，在前頂後一寸五分頂中央旋毛中，陷可容指，督脈足太陽之會，刺入三分，灸三壯。後頂，一名交衝，在百會後一寸五分枕骨上，督脈氣所發，刺入四分，灸五壯。

強間，一名大羽，在後頂後一寸五分，督脈氣所發，刺入三分，灸五壯。

腦戶，一名匝風，一名會額，在枕骨上強間後一寸五分，督脈足太陽之會，此別腦之會，不可灸，令人瘖。

風府，一名舌本，在項上入髮際一寸大筋內宛宛中，疾言其肉立起，言休其肉立下，督脈陽維之會，禁不可灸，灸之令人瘖，刺入四分，留三呼。

五處，在督脈旁，去上星一寸五分，足太陽脈氣所發，刺入三分，不可灸。

承光，在五處後二寸，足太陽脈氣所發，刺入三分，禁不可灸。

通天，一名天臼，在承光後一寸五分，足太陽脈氣所發，刺入三分，留七呼，灸三壯。

絡却，一名強陽，一名腦蓋，在通天後一寸三分，足太陽脈氣所發，刺入三分，留五呼，灸三壯。

玉枕，在絡郄後七分，俠腦戶旁一寸三分，起肉枕骨入髮際三寸，足太陽脈氣所發，刺入三分，留三呼，灸三壯。

臨泣，當目上眥直入髮際五分陷者中，足太陽少陽陽維之會，刺入三分，留七呼，灸五壯。

目窗，一名至榮，在臨泣後一寸，足少陽陽維之會，刺入三分，灸五壯。

氣出而方止。如已有膿水者不可灸，當刺之。淺者亦不可灸。經曰『陷者灸之。』如外微覺木硬而不痛者當急灸之是邪氣深陷也。淺者不可灸，愼之！

儒門事親曰大頭病以砭鍼刺腫處出血，卽效。

丹溪心法曰：頭風頭痛，鍼百會立愈。又灸顖會前頂上星百會。

醫學綱目曰陽迎頭痛腦滿不得息，取之人迎。陽迎卽陽逆也。又云：肝氣逆則頭痛，耳聾頰腫。取穴者，是瘀血腫滿處取之也。

偏正頭風，取絲竹空，沿皮向外，透率谷風池，橫鍼入寸半，透風府合谷半寸已上穴，未愈再取解谿三里中脘，各灸五十壯。

正頭風百會一分，灸七壯。上星二分，灸七壯。三稜鍼出血，亦得。合谷不愈，再取神庭，灸七壯。太陽在兩額角眉後紫脈上，三稜鍼出血亦得。

醉頭風內攢竹一穴印堂一分，灸五壯。攢竹一分，沿皮橫透魚腰三里亶中，灸風門沿皮向外一寸。

頭風面腫，項強不得回顧，天牖五分，留七呼，不宜補亦不宜灸。若灸之則面腫脹。合當取下穴譩譆六分，留三呼，瀉五吸。後取天牖風池卽瘥，此古流注之法。

頭風，後谿京骨。

頭痛嘔吐，神庭一分，印堂在兩眉中，沿皮透左攢竹，補三吸，轉埽元穴，退鍼沿皮，透右攢竹，補三吸。

風痰頭痛，豐隆五分，灸亦得。

腎厥頭痛，湧泉三分，彈鍼出血。

偏正頭痛，取阿是穴鍼之，卽愈。

腦戶通天腦空，主頭重痛。

消濼，主寒熱痹頭痛。

攢竹承光腎腧絲竹空瘈脈和窌，主風頭痛。

上星，主風頭眩顏青。

顖會，主風頭眩頭痛顏青。

天牖風門崑崙關元關衝，主風眩頭痛。

合谷五處，主風頭熱。

前頂後頂頷厭，主風眩偏頭痛。

玉枕，主頭半寒痛。

天柱陶道大杼孔最後谿，主頭痛。

目窗中渚完骨命門豐隆太白外丘通谷京骨臨泣小海承筋陽陵泉，主頭痛寒熱，汗出，不惡寒。

保命集曰：頭痛不可忍，鍼足厥陰太陽經原穴。

凡瘡瘍可灸刺者，須分經絡部分，血氣多少，俞穴遠近，若從背而出，當從太陽五穴，隨證選用，或刺或灸，泄其邪氣。凡太陽多血少氣，至陰通谷束骨崑崙委中，從鬢而出者，當從少陽五穴選用。凡少陽少血多氣，竅陰夾谿臨泣陽輔陽陵泉，從髭而出者，當從陽明五穴選用。凡陽明多血少氣，厲兌內庭陷谷衝陽解谿，從腦而出者，初覺腦痛不可忍，且欲生瘡也。腦者髓之海，當灸刺絕骨，以泄邪氣。腦者，舍也，故脈浮者，從太陽經依前選用，脈長者，從陽明經依前選用，脈弦者，從少陽經依前選用。論曰：諸經各有井滎俞經合，井主心下滿及瘡蒼色，滎主身熱及瘡赤色，俞主體重節痛瘡黃色，經主欬嗽寒熱瘡白色，合主氣逆而泄瘡黑色。隨經病而有此證者，或宜灸宜鍼，以泄邪氣。經曰：[illegible]熱，[illegible]之也。』內經曰：『夫癖氣之息者，宜以鍼開除之，氣勝血聚者，宜石而泄之。』王注

頭痛 顧臍念於患處推下至湧泉止

頭重目花，導引觀空坐定閉氣，以兩手心掩耳擊天鼓，次擦湧泉穴，次以手按膝，端坐呵氣九口，如法定神。

運功意定鉉雍舌頂上齶，俟液徐生，頻咽丹田，復想歸臍，雙睛運轉，而頭輕目無花矣。

頭運腦痛，及痰滯導引，單搭膝坐，二指點閉耳門及口眼鼻七竅之處，躬身微力前努，使眞氣上升，腦邪自散矣。

運功注臍念想頭上痛處，分兩邊運至心口，開下念臍輪斡旋通關，緊行至滯痰處，著意多運，週流遍腹，顧臍念。

神運頭眩，導引此證情慾所傷，氣衰血少，心火上攻，痰飲串肺，爲患日久，變成癆瘵，於肩井穴搯九九之數，擦亦如之，兼用後功自愈。

運功緊閉地戶，安神伏氣，按腦及耳，大運要倚坐，足屈勿交，神氣自迴，得液有津，咽下定神。

跌運導引於肩井穴，環跳穴，搯之九九，擦之九九，自然而愈。

運功急按耳門及腦門，仍遏顱門，定元神，若氣轉迴心，清爽愼遲發語，固命根。

眩運閉口定神伏氣，按腦門及耳戶口，大運之人，要屈足勿教伸直，恐氣難溫和，遂咽津，通大竅，津下竅自通，其神自存，霎時而省人事。

揭胎運，按顱門送氣下丹田，又有運不省人事者，以手遏於顱門。

臘梨瘡取湧泉之水，從脚肋而上致頭頂瘡處，洗之一月可除。又將面前撥下，以至脚指頭而出，每次行二十四遍，要本童子念三教先生四個字，若大人有面紅亦如此法。

醫案

墨莊漫錄曰：王文公安石爲相，日奏事殿中，忽覺偏頭痛不可忍，遽奏上請歸治疾，裕陵令且在中書假臥。已而小

雷頭風，取上顖百會風池。

頭重如石，取印堂一分，沿皮透攢竹，先左後右，彈鍼出血。

眩運，取神庭上星顖會前頂後頂腦空風池陽谷大都至陰金門申脈足三里。

眩運怕寒，春夏常著綿帽，暫去即發，取百會上星風池豐隆。

資生方曰：腎厥頭痛，灸關元百壯。

厥逆頭痛齒亦痛，灸曲鬢七壯。

腦痛腦旋腦瀉腦熱腦冷，皆灸顖會。

薛己醫案曰：李氏云：腦疽及頸項有疽，不可用隔蒜灸，恐引毒上攻，宜灸足三里穴五壯，氣海穴三七壯，仍服涼血化毒之藥，或以騎竹穴法灸之。凡頭項咽喉生疽，古法皆爲不治，若用此法，多有生者，如五香連翹漏蘆等湯，國老膏，萬金散，皆可選用。

註　前證屬膀胱經，或濕熱上壅，或陰火上炎，若因濕熱，則病氣有餘，元氣不足，當用黃連消毒散以除濕毒，用補中益氣湯以滋化源。若因陰火，則元氣病氣俱不足，當用補中益氣湯及六味地黃丸，以滋腎水。若腎水乾涸，中傳末證，急用加減八味丸，及補中益氣湯，以固根本，引火歸源。若色黯不潰，或潰而不斂，名曰腦鑠，不治。大凡焮腫痛甚，宜活命飲，隔蒜灸之，解散瘀血，拔引鬱毒，但艾炷宜小而少。若欲其成膿腐潰，生肌收斂，並用托裏爲主。

古今醫鑑曰：神庭穴在髮際前上五分，灸三壯，上星穴在髮際上一寸半，灸三壯，後頂百會風池，已上諸穴，隨灸一處可愈。

導引

是痛隨利減也。三劑之外，目豁首輕，燥澤結釋而愈。後生三子，

東垣十書曰：范天騋之內，有脾胃證，時顯煩躁，胷中不利，大便不通，而又爲寒氣怫鬱，悶亂大作，火不伸故也。因其有熱，服踈風丸，大便行，其病不減，恐其藥少，再服七八十丸，大便復見兩行，原證不瘳，增以吐逆，食不能停，痰唾稠粘，湧出不止，眼黑頭旋，惡心煩悶，氣短促上喘，無力以言，心神顛倒，目不敢開，如在風雲中，頭苦痛如裂，身重如山，四肢厥冷，不得安臥。余料前證是胃氣已損，復下兩次，則重虛其胃，而痰厥頭痛作矣。乃用黃蘗二分，酒洗乾薑三分，澤瀉白茯苓天麻黃芪人參蒼朮各五分，炒神麯白朮各一錢，麥蘗麯半夏橘皮各一錢五分，每服五錢，煎去查，熱服，食前一服而愈。此頭痛苦甚，謂之足太陰痰厥頭痛也。

元好問記曰：予素飲酒，於九月中患腦之下項之上出小瘡，後數日，腦項痲木，腫勢外焮，瘍醫遂處五香連翹湯，至八日不下，而云不可速療。十八日得膿出，用藥或砭刺，三月乃可平，四月如故。予記醫經云：『凡瘡見膿，九死一生，』果如醫言，則當有束手待斃之悔矣。乃請李明之診，且謂膏粱之變，不當投五香，事已無及，當先用火攻之策，然後用藥。以大艾炷如桃核許者攻之，至百壯，乃覺痛，次爲處方云：是足太陽膀胱之經，其病逆，當反治，脈中得弦緊，按之洪大而數，又且有力，必當伏其所主，而先其所因，其始則同，其終則異，可使破積，可使潰堅，可使氣和，可使必已，必先歲氣，無伐天和，以時言之，可收不可汗。經與病俱禁下，法當結者散之，鹹以耎之，然受寒邪而禁鹹，諸苦寒爲君爲用，甘寒爲佐，酒熱爲因，用爲使，以辛溫和氣血，大辛以解結爲臣，三辛三甘益元氣而和血脈，滲淡以導酒濕，扶持秋令以益氣瀉火，以入本經之藥和血，且爲引用，既以通經爲主，用君以黃芩黃連黃蘗生地黃知母酒製之，本經羌活獨活藁本防風防己當歸連翹以解結，黃芪人參甘草配諸苦寒者三之一，多則滋營氣補土也。生甘草瀉腎火，補下焦元氣，人參橘皮以補胃，蘇木當歸尾去惡血，生地黃補血，酒製防己除膀胱留熱，澤瀉助秋令去酒之濕熱，凡此諸藥，必得桔梗爲舟楫，乃不下沉，投劑之後，疽當不痛不拆，食進體健。予如言服之，投牀大鼾，日出

黃門持一小金杯藥少許賜之云：左痛卽灌右鼻，右卽反之，左右俱痛並灌之，卽時痛愈。明日入謝，上曰：禁中自太祖時有此數十方，不傳人間，此其一也。因幷賜此方。蘇軾自黃州歸過金陵，安石傳其方，用之如神。但目赤少時，頭痛卽愈。法用新蘿蔔取自然汁入生龍腦少許，調勻，昂頭使人滴入鼻竅。

輟耕錄曰：任子昭云：向寓都下時，鄰家兒患頭疼不可忍，有回回醫官用刀割開額上，取一小蟹，堅硬如石，尚能活動，頃焉方死，疼亦遄止。當求得蟹，至今藏之。夏雪蓑云：嘗於平江閶門見過客馬腹膨脹倒地，店中偶有老回回見之，於左腿內割取小塊出，不知何物也，其馬隨卽騎而去。信西域多奇術哉！

儒門事親曰：丹霞僧病頭痛，常居暗室，不敢見明，其頭熱痛，以布圜其頭上，置冰於其中，日易數次，熱不能已。諸醫莫識其證，求見戴人。戴人曰：『此三陽經蓄熱故也。』乃置炭火於煖室中，出汗涌吐，三法併行，七日方愈。僧顧從者曰：此神仙手也。

彭吳張叟，年六十餘歲，病熱厥頭痛，以其用涌藥時已一月間矣，加之以火，其人先利臟腑，年高身困，出門見日，而仆不知人。家人驚惶，欲揉撲之，戴人曰：『大不可擾。』續與西瓜涼水蜜雪，少頃而蘇。蓋病人年老涌泄，目脈易亂，身體內有炎火，外有太陽，是以跌仆，若是擾之便不救矣。惟安定神思，以涼水投之，待之以靜，靜便屬水，自然無事。若他醫必惑，足以知戴人之諳練。

一婦人年四十餘，病額角上耳上痛，嗚呼爲偏頭痛，如此五七年，每痛大便燥結如彈丸，兩目赤色，眩運昏澀，不能遠視，世之所謂頭風藥餅子風藥白龍丸芎犀丸之類，連進數服，其痛雖稍愈，則大便稍閉，兩目轉昏澀，其頭上鍼灸數千百矣，連年著灸，其兩目且將失明，由病而無子。一日問戴人，戴人診其兩手脈急數而有力，風熱之甚也。余識此四五十年，遍察病目者，不問男子婦人，患偏正頭痛，必大便澀滯結硬，此無他，頭痛或額角，是三焦相火之經及陽明燥金勝也。燥金勝乘肝，則肝氣鬱，肝氣鬱則氣血壅，氣血壅則上下不通，故燥結於裏，尋至失明，治以大承[illegible]一兩煎成，頓令溫分作三五服，連服盡，蕩滌腸中垢滯結燥積熱，下泄如湯二十餘行，

古今醫統曰：一婦人忽眩運不能動，[illegible]

一百粒卽愈。

醫學綱目曰：一子患七年搖頭，三年下血，百方無效，予思之，乃肝血液盛，外有風熱乘之，肝屬木，木盛而脾土爲木所剋，脾與肺是子母，俱爲肝所勝，而血遂漬於大便，故便血不止。遂處一方，但損肝祛風而益脾，只數服而後愈。十餘日血止而下白膿，遂得以安。用防風三兩，瓜蔞根，黃芪蜜炒，羌活，白芍藥各五錢，犀角屑，甘草各二錢半，蛇蛻炙赤，鉤藤鉤子，麻黃各一錢。右爲末，棗肉和丸梧子大，食後薄荷湯下五七十丸，只二服，頭搖卽止，便血隨愈，

館職學士張居易嗜酒散誕，不爲名利拘束，忽發熱，頭疼，俾翰林醫官治之，十日愈甚，諸學士共議召孫。孫至，脈之曰：『餘人皆曰傷寒，故作此疾也。張學士好酒多痰，食所傷也，今疾非傷寒，而右手脈甚數，左手脈平和，此必傷酒食而作頭痛，宜喫食藥五七丸。』俟之半日，進退決矣。孫遂用食藥，經食久膈漸寬，頭痛遂減，再進利膈藥遂獲安。大凡陽邪頭疼，經十日豈得不變發熱而狂亂？故知非傷寒，乃食病之過也。

一老婦人頭痛，歲久不已，因視其手足，有血絡皆紫黑，遂用三稜鍼盡刺出其血，如墨汁者數盞。後視其受病之經，灸刺之而得全愈。卽經所謂大痹爲惡，及頭痛久痹不去身，視其血絡，盡出其血是也。

一男子因憂思勞苦，發作眩運，眼暗耳鳴，面赤口乾，發熱氣喘，有汗不食，六脈洪數，用十全大補湯，去桂，加生地黃薑炒，黃連，麥門冬，五味子，陳皮酒炒，黃蘗知母而愈。

薛己醫案曰：閣老梁厚齋氣短有痰，小便赤濇，足跟作痛，尺脈浮大，按之則濇，此腎虛而痰飲也。用四物送六味丸，不月而康。仲景先生云：氣虛有飲，用腎氣丸補而逐之，誠開後學之矇瞶，濟無窮之夭枉。』腎氣丸卽六味丸也。

都憲孟有涯氣短痰運，服辛香之劑，痰盛遺尿，兩尺浮大，按之如無，余以爲腎家不能納氣歸源，香燥致甚耳。用八味丸料三劑而愈。

孫都憲形體豐厚，勞神喜怒，面帶陽色，口渴吐痰，或頭目眩運，或熱從腹起，左三脈洪而有力，右三脈洪而無力。余

乃瘥，以手捫瘡，腫減七八，至瘡痂都斂，十四日而已。世醫用技，豈無取效者！至於治效之外，乃能歷數體中，不言之祕，平生所見，唯明之一人而已。此方名黃連消毒飲。

柏參謀，名德，字仲實，年六十一歲，壬子年二月間，患頭痛不可忍，晝夜不得眠，郎中曹通甫邀予視之，其人云：近在燕京，初患頭昏悶微痛，醫作傷寒解之，汗出後，痛轉加，復汗解，病轉加而頭愈痛，遂歸。每遇郡邑，召醫用藥，一同到今，痛甚不得安臥，惡風寒而不喜飲食。診其六脈，弦細而微，氣短而促，語言而懶。內經云：『春氣者病在頭。』年高氣弱，清氣不能上升，頭面故昏悶，此病本無表邪，因發汗過多，清陽之氣愈虧損，不能上榮，亦不得外固，所以頭苦痛而惡風寒，氣短弱而不喜食，正宜用辛溫藥。內經云：『陽氣者，衛外而爲固也。』今年高氣弱，又加發汗，衛外之氣愈損，故以黃芪甘溫補衛實表爲君，人參甘溫當歸辛溫補血氣，白芍酸寒固衛氣而爲臣，白朮陳皮炙甘草苦甘溫養胃氣，生發陽氣，上實皮毛肥腠理爲佐，柴胡升麻苦平，引少陽陽明之氣上升，通百脈，灌溉週身者也。川芎蔓荊子細辛辛溫，體輕浮清利空竅爲使也。明年春，赴召之六盤山，曹郎中以古風見贈云：『東垣李明之，蚤以能醫鳴，易水得奧訣，爲竭黃金籯。一燈靜室窮內經，黃帝拊掌岐伯驚，日儲月積不易售，半世豈但三折肱，所長用藥有活法，舊方堆案白魚生，得不聞李延同居且同病，一下一汗俱得明早平。乃知古人一證有一方，後世以方合證此理殊未明。公心審是者俗子直以異己喧謗聲。先生飲恨臥黃壤，門生賴汝卓卓號中英，治人事業將與相，一旦在己權非輕，連年應召天策府，廉臺草木皆欣榮。好藏漆葉青粘散，莫使樊何獨擅名。』

丹溪心法曰：一老婦患赤白帶下年半，頭眩，坐之不得睡之則安，專治赤白帶，帶愈，其眩亦安。

一男子年七十九歲，頭目昏眩而重，手足無力，吐痰口口相續，左手脈散大而緩，右手脈緩而大，不及於左，重按皆無力，飲食略減而微渴，大便三四日一行，衆人皆與風藥，言至春深必死。予曰：此大虛證，當以補藥作大劑服之。衆怒而去。予教用人參當歸身黃芪芍藥白朮濃煎作湯，使下連蘗丸三十粒，如此者服一年半而精力如少壯時。連蘗丸冬加乾薑少許，餘三時皆以本法，連蘗皆薑汁炒爲細末，又以薑汁煮糊爲丸。

一人腦疽，十餘日面目腫閉，頭焮如斗，脈洪數，煩躁飲冷，此膀胱濕熱所致，用黃連消毒飲二劑，次飲槐角酒二椀頓退。以指按下腫則復起，此膿已成，於頸額肩頰各刺一孔，膿並出，口目始開，更以托裏藥加金銀花連翹三十餘貼愈

一人患腦疽，勢劇，脈實，用黃連消毒散，不應，以金銀藤二兩，水二鍾，煎一鍾，入酒半盞服之，勢去三四，再服漸退。又加黃蘗，知母，瓜蔞，當歸，甘草節數劑而潰，止加黃芪，川芎，白芷，桔梗數劑愈。

一人腦疽，其頭數多，痛不可忍，服消毒藥不應，更以金銀花服之，即鼾睡，覺而勢去半，再數劑而消。

杜碧淸亦名醫也。自病腦疽，療之不愈，丹溪往視之曰：『何不服防風通聖散？』曰：『已服數劑。』丹溪曰：『合以酒製之。』碧淸乃自悟，以爲不及。

一人頭面腫痛，服硝黃敗毒之劑愈甚。診之脈浮數，邪在表，尙未解，用荊芥敗毒散二劑，勢退大半，更以葛根牛蒡子湯四劑而瘥，此憑脈發表藥也。

頭面赤腫焮痛，服涼藥不應者，須砭鍼去血，再用本方必效。一人年三十，患肩毒，服人參敗毒散二劑，更服十宣散去參桂，加金銀花天花粉四劑而潰。因怒動肝火，風熱上壅，頭面靑腫焮痛，飲冷，荊防敗毒散加芩連薄荷二劑，不應，急砭鍼患處，去黑血盞許，仍以一劑，勢退大半，再服人參敗毒散四劑而愈。

泰和二年四月，民多疫癘，初覺憎寒，體熱，次傳頭目腫盛，目不能開，上喘，咽喉不利，舌乾口燥，俗云，大頭天行，親戚不通染之多殆。一人病此五六日，醫以承氣加藍根下之，稍緩，翌日其病如故，下之又緩，終莫能愈，漸至危篤。東垣曰：『身半以上天之氣也，身半以下地之氣也，此邪熱客於心肺之間，上攻頭目，腫盛，以承氣泄胃中之實熱，是誅罰無過，不知適其至所爲。』故遂制普濟消毒飲子。

一男子患腦疽，腫痛，脈數，以黃連消毒散二劑，少退，與仙方活命飲二劑而止。再以當歸芍藥川芎金銀花黃蘗知

謂足三陰虧損，用補中益氣，加麥門五味，及加減八味丸而愈。若人少有老態，不耐寒暑，不勝勞役，四時迭病，皆因少時血氣方長，而勞心虧損，或精血未滿，而御女過傷，故其見證，難以悉狀，此精氣不足，但滋化源，其病自痊。又若飲食勞役，七情失宜，以致諸證，亦當治以前法。設或六淫所侵，而致諸證，亦因眞氣內虛而外邪乘襲，尤當固胃氣爲主。蓋胃爲五臟之根本，故黃蘗知母，不宜輕用，恐復傷胃氣也。大凡雜證屬內因，乃形氣病氣俱不足，當補不當瀉，傷寒雖屬外因，亦宜分其表裏虛實，治當審之。

昌平守王天成頭運惡寒，形體倦怠，得食稍愈，勞而益甚，寸關脈浮大，此脾肺虛弱，用補中益氣湯，加蔓荆子而愈。後因勞役發熱惡寒，譫語不寐，得食稍安，用補中益氣湯而痊。

大尹祝支山因怒頭運，拗內筋攣，時或寒熱，日晡熱甚，此肝火筋攣氣虛頭運，用八珍加柴胡山梔牡丹皮二十餘劑而愈。

上舍顧桐石會飲於周上舍第，問余曰：『向孟有涯陳東谷俱爲無嗣納寵，已而得疾，皆頭運吐痰，並用蘇合香丸，惟有涯得生，何也？』余曰：『二證因腎虛不能納氣而爲頭運，不能制水而爲痰涎，東谷專主攻痰行氣，有涯專於益火補氣故耳。』後余應杭人之請，桐石房勞過度，亦患前證，或用清氣化痰愈甚。顧曰：『我病是腎虛，不能納氣歸源，治者不悟而殁，惜哉！』

先兄體貌豐偉，唾痰甚多，脈洪有力，殊不耐勞，遇風頭運欲仆，口舌破裂，或至赤爛，誤食薑蒜少許，口瘡益甚，服八味丸及補中益氣，加附子錢許，即愈。停藥月餘，諸證仍作，此命門虛火不歸源也。

一婦人患頭項俱腫，痛不可當，發熱作渴，喜冷，內服清熱，外敷寒涼，色黯不焮，胸中氣噎，此陽氣虛寒，彼泥素有痰火，不受溫補，余用參芪各五錢，薑桂各二錢，一劑頓腫起而潰，又用大補藥而愈。凡瘡疽腫高痛甚，煩渴飲冷，此病氣元氣俱有餘，宜用清熱消毒散，仙方活命飲爲主。若腫高痛甚，口乾飲熱，此病氣有餘，元氣不足，宜用托裏消毒[illegible]此病氣元氣俱不足，宜用六君補中二湯，壯其脾胃，則未成者消，已成

外曰潰，上曰從，下曰逆，發於上者得之速，發於下者得之緩，感於六腑者易治，感於五臟者則難治也。觀此則疽發於腦者，乃膀胱督脈陰氣不足，陽火熾甚而出也。豈可專泥於心火而不滋益陰氣耶？

一人素不慎起居飲食，焮赤腫痛，尺脈洪數，以黃連消毒散二劑，濕熱頓除，惟腫硬作痛，以仙方活命飲二劑，腫痛悉退，但瘡頭不消，投十宣去桂加金銀花藁本白朮茯苓陳皮，以托裏排膿，彼欲全消，自製黃連解毒散二服，反腫硬不作膿，始悟，仍用十宣散加白朮茯苓陳皮半夏，腫少退，仍去桂，又四劑而膿成，腫勢亦退。繼以八珍湯加黃芪五味子麥門冬，月餘膿潰而愈。夫苦寒之藥，雖治陰證，尤當分表裏虛實，次第時宜，豈可始末悉用之？然焮腫赤痛，尺脈數，按之則濡，乃膀胱經濕熱壅盛也。故用黃連消毒散以解毒除濕，頑腫硬作痛，乃氣血凝滯不行而作也。遂用仙方活命飲，以散結消毒破血也。其瘡頭不消，蓋因熱毒熏蒸，氣血凝滯而然也。宜用甘溫之劑，補益陽氣，托裏以腐潰之。況此證原屬督脈經，因虛火盛而出，若不審其因，專用苦寒之藥，胃氣已傷，何以腐化收斂，幾何不致於敗耶？凡瘡易消散，易腐潰，易收斂，皆氣血壯盛故也。

一婦年將七十，形實性急，好酒，腦疽纔五日，脈緊急又濇，急用大黃酒煨細切，酒拌炒為末，又酒拌人參炒，入薑煎，調一錢服，過兩時再與，得臥而上半身汗，睡覺病已失。此亦內托之意。蓋此治因性急，因好酒，兼因其脈而制此方，脈緊急且濇，由其性急，嗜酒以傷其血而然，故用大黃以洩酒熱，人參以養氣血也。

一婦腦左腫痛，左鼻出膿，年餘不愈，時或掉眩，如坐舟車。許叔微曰：『肝虛風邪襲之然也。』以川芎一兩，當歸三錢，羌活旋復花細辛防風蔓荊子石膏藁本荊芥穗半夏麯乾地黃甘草各半兩，每服一兩，一料而愈。按此條認作肝虛風邪襲之，而治以去風清熱養血祛痰之劑，因其掉眩痛偏於左也。經曰：『諸風掉眩，皆屬肝木。』又病偏左，乃肝膽所主，又曰：『風從上受之。』又曰：『無痰不成眩暈。』又曰：『肝藏血。』又曰：『風乃陽邪。』故方以風熱痰血而主治者理也。

母而潰，又以托裏藥而愈。

一男子腦疽，頭項俱腫，雖大潰，腫痛益甚，兼作瀉，煩躁不睡，飲食少思，其勢可畏。診其脈，毒尚在，與仙方活命飲二劑，腫痛退半，與二神丸及六君子湯，加五味子麥門冬酸棗仁四劑，諸證少退，飲食少進，睡亦少得。及與參苓白朮散數服，飲食頓進，又與十全大補湯加金銀花白芷桔梗，月餘而瘥。

一老人色赤腫痛，脈數而有力，與黃連消毒散二劑，少退，更與清心蓮子飲四劑而消。

一婦人膿熟不潰，脹痛欲嘔，飲食少思，急鍼之，與托裏藥而愈。

一婦人患之不甚痛，不作膿，以托裏消毒散，膿成鍼之，補以托裏藥，亦愈。

一老人膿清，兼作渴，脈軟而濇，予以爲氣血俱虛，用八珍湯加黃芪五味子。彼不信，乃服降火之劑，果反作嘔少食，始信服香砂六君子湯四劑，嘔止食進，仍投前湯，月餘而愈。

一男子未潰，兼作渴，尺脈大而無力，以四物湯加黃蘗知母麥門冬黃芪四劑而渴減，又與加減八味丸，渴止瘡潰，更用托裏藥，兼前丸而愈。

一男子腫痛脈數，以荊防敗毒散二劑而痛止，更以托裏消毒藥而消。

一男子焮腫疼痛，發熱飲冷，脈洪數，與涼膈散二劑而止，以金銀花散四劑而潰，更以托裏藥而愈。

一老婦稟實，潰而痛不止，脈實便祕，以清涼飲二劑而止，更以托裏消毒藥而愈。

一男子腫硬不作膿，惟瘡頭出水，痛甚，以仙方活命飲二劑，痛止而膿成，鍼之，更以托裏藥而愈。常治膿清補而不應及不痛，或木悶堅硬者，俱不治。

一男子膿將成，微痛兼渴，尺脈大而無力，此陰虛火動之證。彼謂心經熱毒，自服清涼降火藥，愈熾，復求治，乃以四物湯加黃蘗知母五味子麥門冬黃芪，及加減八味丸，渴止瘡潰，更以托裏藥兼前丸而愈。中藏經云：癰疽瘡腫之[illegible]發於喉舌者心之毒，皮毛者肺之毒，[illegible]

[illegible]宜，非加減八味丸不能治。

一人腦患疽，發熱口渴，醫用苦寒藥，膿水益多，發熱益甚，面目赤色，脣舌燥烈，小便淋痛，晝夜不寐，死在反掌，請予治之。乃以加減八味丸料加參芪歸朮麥冬甘草煎服之，熟睡半日，覺來諸證悉退，不數劑而瘡愈。予曰：『病雖愈，當固其本元。』彼不經意，且不守禁，次年患中風，後患背疽而歿。

一老人膿清兼作渴，脈軟而濇，予以爲氣血俱虛，用八珍湯加黃芪五味，彼不信，乃服降火之劑，果反作嘔少食，始信服香砂六君子湯四劑，嘔止食進，仍投前湯月餘而愈。

一人頭項俱痛，雖大潰，腫痛益甚，兼作瀉，煩躁不睡，飲食少思，其勢可畏。診其脈，毒尚在，與仙方活命飲二劑，腫痛退半，與二神丸及六君子湯加五味麥冬酸棗仁四劑，諸證少退，食頗進，睡少得，及與參苓白朮散數服，飲食頗進，又與十全大補湯加金銀花白芷桔梗，月餘瘥。

舉人潘光甫，年踰四十，患腦疽腫焮，診其脈沉靜，予謂此陽證陰脈，斷不起，已而果然。蓋瘡疽雖屬心火，尤當分表裏虛實，果元氣充實，內有實火者，寒劑或可責效，若寒涼過度，使胃寒脾弱，陽證變陰，或結而不潰，或潰而不斂，陰陽乖戾，水火交爭，死無日矣。

侍御朱南皐，患鬢疽腫痛發熱，日晡尤甚，此肝膽二經血虛火燥也。用四物湯加元參柴胡桔梗炙草治之而愈。又因勞役發熱，畏寒，作渴，自汗，用補中益氣湯，去柴升，加五味麥冬炮薑而瘥。

州守胡廷器，年七十，患前證，腫焮作痛，頭目俱脹，此腎水不足，肝膽火盛而血燥也。用六味丸料四劑，瘡頭出水而愈。後因調養失宜，仍腫痛，煩熱喘渴，脈洪大而虛，此脾胃之氣傷也。用補中益氣以補脾胃，用六味地黃丸以補腎肝而痊。

一男子患此焮腫作痛發熱，以小柴胡湯加連翹金銀花桔梗四劑而消。

一男子因怒後髮際腫痛發熱，以小柴胡湯加連翹金銀花天花粉桔梗四劑，根畔俱消，惟瘡頭作痛，以仙方活命

一老患此，色赤腫痛，脈數有力，與黃連消毒飲二劑，少退，更與清心蓮子飲，四劑而消。

一婦人冬間患此腫痛熱渴，余用清熱消毒藥潰之而愈。次年三月，其舌腫大，遍身發疔，如葡萄，不計其數，手足尤多，乃脾胃受毒也。先各刺出黑血，隨服奪命丹七粒，出臭汗，瘡熱益甚，便祕二日，與大黃芩連各三錢，升麻白芷山梔薄荷連翹各二錢，生甘草一錢，水煎三五沸服之，大小便出臭血甚多，下體稍退，乃磨入犀角汁再服，舌本及齒縫出臭血，諸毒乃消，更以犀角地黃湯而愈。

以上治案，皆足太陽經積熱，挾風挾濕挾虛者，其進退出入，可以用黃連消毒散之活法也。

陳錄判母年七十餘，於冬至後腦出疽，形可甌面大，衆瘍醫診視，俟瘡熟，以鍼出膿，因笞侍妾，瘡輒內陷，凹一韭葉許，面色青黃不澤，四肢逆冷，汗出身清，時復嘔吐，脈極沉細而遲，蓋緣衰老之年，嚴寒之時，病中苦楚，飲食淡薄，已滌肥濃之氣，獨存瘦悴之形，加之暴怒，精神愈損，故有此寒變也。病與時同，與瘍醫議，速製五香湯一劑，加丁香附子各五錢，劑盡，瘍復大發，隨證調治而愈。內經曰：『凡治病必察其下』，謂察時下之宜也。諸痛癢瘡瘍皆屬心火，言其常也。如瘡盛形羸，邪高痛下，始熱終寒，此反常也，固當察時下之宜而權治。故曰，經者常也，法者用也，醫者意也，隨所宜而治之，可收十全之功矣。按此條年老冬寒，理宜溫補，茲用五香湯加丁附以辛散，何也？蓋因其怒氣鬱結阻礙，陽氣不得營運，致阻凹陷，且脈極沉細而遲，其爲氣鬱可知，故用五香以開結，丁附以助陽，則鬱散陽復，疽乃大發，此亦因其性脈而爲治也。

錦衣葉夫人患腦疽，口乾舌燥，內服清熱，外敷寒涼，色黯不焮，胷中氣噎，證屬陽氣虛寒，彼疑素有痰火，不受溫補，予以參芪各五錢，薑桂各二錢，一劑頓然腫潰，又用大補藥而愈。

一人膿將成，微痛兼渴，尺脈大而無力，此陰虛火動之證，彼謂心經熱毒，自服清涼降火藥愈熾，復求治，乃以四物湯加黃蘗知母五味麥冬黃芪，及加減八味丸，渴止瘡潰，更以托裏藥兼前丸而愈。

[illegible]以加減八味丸與之，彼不信，自用滋陰等藥，七惡并至而歿。精要曰：患疽雖

大宗伯羅公耳後髮際患此，焮痛，脈數，以小柴胡湯加桔梗牛蒡子金銀花四劑而愈。

趙宜人年踰七十，患鬢疽已潰，焮腫痛甚，喜冷，脈實，大便祕澀。東垣云：「煩躁飲冷，身熱脈大，精神昏悶者，皆臟腑之實也。」遂以清涼飲一劑，腫痛悉退，更以托裏消毒藥三十餘劑而平。若謂年高潰後，投以補劑，實實之禍不免矣。

外科正宗曰：一男人腦疽十餘日，視其瘡勢頗甚，根連左右耳，項並腫，紅赤焮熱，脈浮而數，先用黃連消毒散二服，退其大勢，根脚稍定，後用托裏消毒散數服，不覺腐潰，但診脈浮無力，詢之患者年過五旬，久艱嗣息，房中又有妾人，多兼思慮，勞慾太過，損傷元氣故也。又瘡形勢大，止能起發，不能培養爲膿，更用十全大補湯加桔梗白芷，倍人參白朮各三錢，外用桑木灸法，早晚二次灸之，又塗紫霞膏，數日患者頭面俱腫，雙目合縫，形狀可畏，然後腐潰，並作膿出，日至數升，如此半月，因前藥不勝其事，內加煩躁不甯，五心煩熱，飲食漸少等證，此以膿水出多，氣血走泄，爲虛火假證之故，雖變不妨。隨用聖愈湯一服不應。又進一服，加熟附子二錢，方應，前證悉退。次以人參養榮湯加麥冬五味，參朮，常倍至三錢，調理月餘，後至腦骨腐肉連髮片片脫下，其狀猙獰不可觀瞻。凡相視者，無不點頭驚訝，又恐腐潰深大，補不及事，每日粥食中用人參三錢，凡餐分入同煮食之，以接補脾元，後方元氣漸醒，調理四月方愈。彼後一年，反生一子，以承後嗣。

一男子患鬢疽三日，焮腫寒熱，脈浮數，以荊防敗毒散一劑，表證悉退，腫痛仍作，已欲作膿，以托裏消毒散，膿潰，又以益氣養榮湯，加麥冬五味，斂而愈。

一男子患鬢疽五日，頂高根若錢大，形色紅活，此肝經濕熱爲患，用麻子大艾灸七壯，以梔子清肝湯二服，腫勢稍止，以蟾酥餅膏貼灸上，更以柴胡清肝湯加白芷黃芪天花粉，數服膿潰，腫消，半月收斂。

一男子渴疾三年，寒熱半月，自以爲瘧，鬢間忽生一小瘡，三四日外形如粟，瘡平堅硬，色暗不澤，又兼脈洪數而無力，此水竭火旺之證也。終難潰斂，辭不敢治，復請醫視爲易治，用針刺腫上去紫血鍾許，內服解毒藥，次日邊旁愈

飲二劑，痛止膿成，針之，更以托裏消毒藥而愈。

一男子頭面焮腫作痛，時仲冬脈弦緊，以托裏溫經湯，汗之而消。

一男子腫痛，寒熱拘急，脈浮數，以荊防敗毒散二劑，表證悉退，更以托裏消毒散潰之而安。

一男子膿熟不潰，脹痛，針之而止，更以托裏消毒散而愈。凡瘡膿熟不潰，屬氣血虛也，若不托裏，必致難瘥。

一男子作膿焮痛，發嘔少食，以仙方活命飲一劑而止，以六君子湯加當歸桔梗皂角刺，潰而愈。

一男子膿清不斂，以托裏散加五味子麥門冬而斂。

一老人腫痛發熱，膿清作渴，脈軟而濇，此血氣俱虛也，欲補之，彼見作渴發熱，乃服降火之劑，果作嘔少食，復求治，投六君子湯四劑，嘔止食進，仍用補藥月餘而愈。夫患者臟腑氣血上下各有虛實，况陰證似陽，陽證似陰，豈可以發熱作渴，而槩用寒涼之劑。常治患者正氣虛，邪氣實，以托裏為主，消毒佐之。正氣實，邪氣虛，以攻毒為主，托裏佐之。正氣虛，邪氣實，而專用攻毒，則先損胃氣，宜先用仙方活命飲，托裏消毒散，或用灸法，俟邪氣退，正氣復，更酌量治之。大抵正氣奪則虛，邪氣勝則實，蓋邪正不並立，一勝則一負，其虛不待損而自虛矣。若發背腦疽疔毒及患在四肢，必用灸法，拔引鬱毒，以行瘀滯，尤不可專於攻毒，診其脈而辨之，庶不有誤。

一男子腫焮痛甚，發寒熱，服十宣散愈熾，診之脈數而實，此表裏俱有邪也，以荊防敗毒散，加芩連大黃二劑少愈，更以荊防敗毒散四劑而消。大抵瘡瘍之證，腫焮痛甚，寒熱往來，或大便祕結，小便澀赤，心神憒悶，恍惚不甯，皆邪熱之實也，豈可補哉？東垣云：瘡疽之發，其受之有內外之別，治之有寒溫之異，受之外者，法當托裏，以溫劑，反用寒藥，則是皮毛始受之邪，引入骨髓，受之內者，法當疏利，以寒劑，反用溫劑托裏，則是骨髓之病，上徹皮毛，表裏通潰，共為一瘡，助邪為毒，苦楚百倍，輕則危殆，重則死矣。

一維揚俞黃門年踰三十，冬月鬢患毒腫焮煩躁，便祕脈實，此膽經風熱壅上而然也。馬氏云：『瘡瘍之證，熱壅而不

腫，醫者謂腫高屬陽易治，彼家懽悅。又三日，腮項俱腫，口噤不食，用針又刺腫上，日加昏憒。又復請視，予曰：『將死及矣，但此證未病先作渴，腎水已竭，外形如粟，裏可容谷，形色紫黑，氣敗血衰，脈洪無力，元氣內敗，如此干涉，豈有不死者。』彼家方信晚矣，共二十一日而歿。

一男子腫焮五六日，彼欲內消，外敷涼藥，內服大黃泄氣等劑，隨後焮腫雖退，乃生寒熱，惡心乾嘔，肩膊牽強，診之，脈數無力，此內虛毒氣入裏，涼藥之過也。東垣云：『瘡疽之發，受之有內外之別，治之有寒溫之異，受之外者，法當托裏以溫劑，反用寒藥攻利，損傷脾胃，多致內虛，故外毒乘虛入裏。受之內者，法當疏利以寒劑，反用溫劑托裏，初病則是骨髓之毒，誤用溫劑，使毒上徹皮毛，表裏通潰，共為一瘡，助邪為毒，苦楚百倍，輕則變重，重則死矣。』前證既出寒藥之過，以托裏健中湯二服，嘔吐全止，又以十全大補湯加白芷數服，而原瘡漸起，又以人參養榮湯，間服腐潰膿稠，兩月餘，瘡口收斂。

一婦人患此腫硬，寒熱口乾，焮痛，脈洪大有力，此表裏俱實也。以防風通聖散一劑，行二次，前證稍退。又一劑，大行數次，熱退渴止。惟原瘡腫硬，用銀針點破，插入蟾酥條，內服托裏消毒散，漸潰膿而安。

一男子患此三四日，頂高根活，且無表裏之證，此肝經濕熱為患，用針挑破瘡頂，以蟾酥餅蓋貼，內服加味逍遙散，加皂角針，數服，頭出微膿，根腫亦消。

景岳全書曰：先君壽峯公，少壯時，頗好酒，因致酒病，自四旬之外，遂絕戒不飲，後至七旬，因除夜之樂，飲一小杯，而次早眩運，不能起，先君素善吐法，有記在痰飲門，因吐去清痰，而眩運頓愈。原其所由，則一杯之酒，何遽為痰，不過以惡酒之臟，而忽被酒氣，則眞陰清氣，為之淆亂而然。吐去痰飲，酒氣可除，吐能升氣，清陽可復，此非治痰而實以治亂耳。故志此以見其義。

通俗